

1. Fondi B

Pyetja 1 V)2

Në sistemet vetacidifikues të fortë :

- A) pH=<1
- B) pH >2
- C) pH>1
- D) pH=1.5

PS)A

Pyetja 2 V)1

Kariesi insipient aproksimal zakonisht lokalizohet në :

- A) Pikën e kontaktit
- B) Vestibularisht pikës së kontaktit
- C) Lingualisht pikës së kontaktit
- D) Nën pikën e kontaktit në drejtim të gingivës

PS)D

Pyetja 3 V)2

Bizotimi i margove të kavitetit:

- A) Largon shtresën sipërfaqësore të smaltit të pasur me fluoride
- B) Rrit sipërfaqen e bondimit
- C) A+B
- D) Rrit sipërfaqen e bondimit

PS)C

Pyetja 4 V)1

Cili nga pohimet e mëposhtëme është i vërtetë:

- A) Në karriesin e arrestuar lezioni është në ngjyrë bezhë të hapur dhe i butë në sondim
- B) Në kariesin e arrestuar nuk është e pranishme skleroza tubulare
- C) Nëkarriesin e arrestuar lezioni është në ngjyrë kafe të errët dhe i fortë në sodim
- D) Në kariesin e arrestuar proçesi progreson shpejt

PS)C

Pyetja 5 V)1

Në një kavitet të klasës së parë cilët nga kompozitet e mëposhtëm do të preferoni:

- A) Kompozit mikrombushës
- B) Kompozit hibrid

- C) Kompozit nanombushës
 - D) Kompozit fluid
- PS)B

Pyetja 6 V)2

Si ndikon smear layer-i në adezionin e rezinave kompozite:

- A) Pozitivisht
 - B) Negativisht
 - C) Varet nga kaviteti
 - D) Nuk ndikon fare
- PS)B

Pyetja 7 V)2

Zbardhimi i dhëmbëve vital nuk mund të kryhet në :

- A) Dhëmbë me dhomë pulpare të madhe
 - B) Dhëmbë me sensitivitet të lartë
 - C) Dhëmbë me retraksion gingivar
 - D) Në të gjitha rastet e mësipërme
- PS)D

Pyetja 8 V)1

Cili nga inlejet e mëposhtëm shkaktojnë më shumë konsumim sipërfaqësor të dhëmbëve antagonist:

- A) Inlejet e porcelanit
 - B) Inlejet e kompozitit
 - C) Inlejet e arit
 - D) Të gjithë shkaktojnë të njëjtin konsumim
- PS)A

Pyetja 9 V)1

Metodat fizike të diagnostikimit japin të dhëna të rëndësishme në:

- A) Proçeset karioze
 - B) Pulpitet akute
 - C) Anomalitë e strukturës
 - D) Trauma
- PS)D

Pyetja 10 V)2

Fasetat nuk indikohen në :

- A) Frakturat e dhëmbëve në adoleshencë
 - B) Dhëmbë devital të dekoloruar
 - C) Errozione labiale të mëdha
 - D) Bruksizëm
- PS)D

Pyetja 11 V)2

Cili nga materialet e mëposhtë me realizon adezion jon shkëmbyes me indet e dhëmbit:

- A) Amalgami
 - B) Kompozitet
 - C) Glass ionomer cementet
 - D) Asnjë prej tyre
- PS)C

Pyetja 12 V)1

Cili nga materialet e mëposhtëm shkakton ngjyrosje të indeve të dhëmbit:

- A) Amalgami
 - B) Kompozitet
 - C) Kompomeret
 - D) Glass-ionomer cementet
- PS)A

Pyetja 13 V)1

Klasifikimi i kompoziteve bazohet në :

- A) Sistemet e rezinave
 - B) Madhësinë e grimcave mbushëse
 - C) Sistemet adezive
 - D) Asnjë prej opsioneve të mësipërme
- PS)B

Pyetja 14 V)1

Cili nga përbërësit e pështymës është përgjegjës për zbërthimin e karbohidrateve:

- A) Mucina
 - B) Ptialina
 - C) Urea
 - D) Lizozima
- PS)B

Pyetja 15 V)1

Humbja e strukture dhëmbore nga një proces kimik jobakterial quhet:

- A) Abrazion
- B) Atricion
- C) Erozion
- D) Abfraksion

PS)C

Pyetja 16 V)1

Cili është agjenti aktiv i pastave që përdoren për zbardhjen e dhëmbëve :

- A) Perhidroli
- B) Karbamid peroksidi
- C) Ujë i oksigjenuar
- D) Superoksol

PS)B

Pyetja 17 V)1

Fibrat e Tomsit janë zgjatime protoplazmatike të :

- A) Fibroblasteve
- B) Cementoblasteve
- C) Odontoblasteve
- D) Osteoblasteve

PS)C

Pyetja 18 V)1

Në preparimin për fasetë margoja incizale :

- A) Preparohet
- B) Nuk preparohet
- C) Vetëm bizotohet
- D) Vetëm rrumbullakoset

PS)A

Pyetja 19 V)2

Cili nga pohimet nuk është i vërtetë:

- A) Sasia e lartë e Laktobacileve është tregues i prodhimit të ulur të pështymës.
- B) Në hypofunksionin e gjendrave të pështymës demineralizimi dhe aktiviteti karioz ulet

- C) Në hyposekretimin e pështymës favorizohet mikroflora kariogjenike e pasur me laktobacile dhe streptokoke mutans
- D) Mungesa e pështymes çon në një zhvillim të shpejt të procesit karioz në zona atipike si në faqet linguale, në kuspide, margo incizivale etj
- PS)B

Pyetja 20 V)1

Cili prej bakterieve të mëposhtëme nuk luan rol në procesin karioz:

- A) Streptococcus mutans
- B) Staphylococcus aureus
- C) Lactobacillus acidiphillus
- D) Actinomyces
- PS)B

Pyetja 21 V)2

Te GIC(glass ionomer cementet) rezin modifikuar komponenti rezin siguron:

- A) Adezionin me smaltin dhe dentinën
- B) Radioopacitetin
- C) Biokompatibilitetin
- D) Uljen e sensitivitetit ndaj ujit
- PS)D

Pyetja 22 V)1

Cili nga pohimet është i vërtetë:

- A) Adamantoblastet sekretojnë lëndën organike të dentinës
- B) Adamantoblastet sekretojnë lëndën organike të smaltit
- C) Adamantoblastet luajnë rol të rëndësishëm në mineralizimin e smaltit dhe dentinës
- D) Adamantoblastet janë elementët qelizor në strukturën e smaltit matur
- PS)B

Pyetja 23 V)1

Përcaktimi i ngjyrës kryhet kur dhëmbi është:

- A) I thatë
- B) I lagur nga pështyma
- C) I lagur nga pështyma dhe në dritën e reflektorit
- D) I lagur nga pështyma dhe në ndricim natyral
- PS)D

Pyetja 24 V)1

Kariesi circular është frekuent në :

- A) Fëmijërinë e hershme
 - B) Adoleshencë
 - C) Adultë
 - D) Moshat e vjetra
- PS)D

Pyetja 25 V)2

Kanalzat dentinare janë të pranishme në:

- A) Dentinën sekondare
 - B) Dentine primare
 - C) Dentine terciare
 - D) a+b+c
- PS)B

Pyetja 26 V)3

Sa është vlera e monomerit rezinoz HEMA në likidin e glass ionmer cementeve:

- A) 5-7%
 - B) 30-40%
 - C) 18-20%
 - D) 60-70%
- PS)C

Pyetja 27 V)2

Preparatet që përdoren për trajtimin e sensitivitetit që shfaqet nga Zbardhimi i dhëmbëve përmbajnë kryesisht:

- A) Fluorur Kallaji
 - B) Oksid Alumini
 - C) Nitrati Kaliumi
 - D) Bikarbonate
- PS)C

Pyetja 28 V)2

Hipoplazia karakterizohet nga:

- A) Zmalti paraqitet në sasi jo normale dhe fortësi normale
- B) Zmalti paraqitet në sasi normale dhe fortësi jo normale
- C) Zmalti paraqitet në sasi normale dhe fortësi normale

D) Zmalti paraqitet ne fortësi jo normale
PS)A

Pyetja 29 V)2

Hipomineralizimi karakterizohet nga:

A) Zmalti paraqitet në sasi jo normale dhe fortësi normale
B) Zmalti paraqitet në sasi normale dhe fortësi jo normale
C) Zmalti paraqitet në sasi normale dhe fortësi normale
D) Zmalti paraqitet ne sasi jo normale
PS)B

Pyetja 30 V)1

Origjina e përgjithshme e defekteve te zmallit mund të jetë nga:

A) Infeksione të kaluara gjatë fëmijërisë
B) Kequshqyerje
C) Avitaminozat
D) Të gjitha janë të vërteta
PS)D

Pyetja 31 V)1

Streptokoku mutans kolonizon zgavren e kojës rreth moshes:

A) 1-3 vjeç
B) 3-6 vjec
C) 6-7 vjec
D) Mbi 18 vjeç
PS)A

Pyetja 32 V)2

Sa është sasia e pastës së dhëmbëve që duhet të përdorë një fëmijë i moshës parashkollore në furçë?

A) Aspak
B) Sa nje kokërr bizele
C) Sa një adult
D) Gjurmë
PS)B

Pyetja 33 V)1

Promocioni shëndetësor dhe masat parandaluese për shfaqjen e një sëmundje janë pjesë e:

- A) Prevencioni primar
- B) Prevencioni sekondar
- C) Prevencioni terciar
- D) Prevencioni selektiv

PS)A

Pyetja 34 V)1

Shërbimet që ofrohen kur patologjia është shfaqur për të parandaluar progresin janë:

- A) Prevencioni selektiv
- B) Prevencioni primar
- C) Prevencioni sekondar
- D) Prevencioni terciar

PS)C

Pyetja 35 V)1

Shërbimet që ofrohen kur patologjia ka avancuar duke shkaktuar humbje ose dëmtim përfundimtar të indit (psh kirurgjia) janë:

- A) Prevencioni selektiv
- B) Prevencioni primar
- C) Prevencioni sekondar
- D) Prevencioni terciar

PS)D

Pyetja 36 V)2

Një fëmijë të moshës 12 vjeçare i cili mban aparat ortodontik dhe jeton në njëkomunitet ku niveli i fluorit në ujin e pijshëm është më pak se 0.3ppm , përse i përket rrezikshmërise nga kariesi do të klasifikohet në:

- A) Grupin me rrezikshmëri të ulët
- B) Grupin me rrezikshmëri të mesme
- C) Grupin me rrezikshmëri të lartë
- D) Opsioni A dhe B është i vërtet

PS)C

Pyetja 37 V)1

Silantet kundërrindikohen të aplikohen në fëmijë kur kemi:

- A) Karies të fisurës
- B) Hipoplazi lineare
- C) Karies cervikal

D) Difekt kuneiform

PS)A

Pyetja 38 V)1

Silantët në denticionin e përkohshëm aplikohen në këtë moshë:

A) 1-2 vjeç

B) 2-3 vjeç

C) 3-6 vjeç

D) 7-8 vjeç

PS)C

Pyetja 39 V)2

Gingivitis gravidar është me origjinë:

A) Virusale

B) Bakteriale

C) Mykotike

D) Hormonale

PS)D

Pyetja 40 V)2

Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë?

A) Plaka gjendet vetëm në fisurat e dhëmbëve.

B) Heqja e plakës bakteriale kërkon ndërhyrjen profesionale të mjekut stomatolog.

C) Përdorimi i përditshëm i furçës dhe fillit dentar kryen heqjen totale të pllakës dentare në të pesta sipërfaqet e dhëmbëve.

D) Gjatë shtatëzanisë në perjudhën 3-5 muaj kryerja e procedurave dentare është e kundërlinduar.

PS)B

Pyetja 41 V)2

Mukozitis është një komplikacion që vjen nga:

A) Kimioterapia dhe radioterapia

B) Traumat e indeve të buta

C) Trajtimi i zgjatur me antibiotik

D) Të treja janë të vërteta

PS)A

Pyetja 42 V)1

Mosha në të cilën këshillohet të egzaminohet për herë të parë fëmija tek dentist është:

- A) Në moshën 3 muajsh
- B) Në moshën 12 muajsh ose kur eruptojnë dhembët e parë
- C) Në moshën 24 muajsh ose kur kanë eruptuar shumica e dhëmbëve
- D) Në moshën 36 muajsh ose kur kanë eruptuar të gjithë dhëmbët

PS)B

Pyetja 43 V)2

Cili nga ingredientet në pastë ka veti antibakteriale të shprehura?

- A) Triklosani
- B) Sodium Lauryl Sulfat
- C) Xilitoli
- D) Fluori

PS)A

Pyetja 44 V)1

Shkaku kryesor i kancerit të gojës në moshën e tretë është:

- A) Protezat defekte
- B) Infiamacioni i mukozës së gojës
- C) Diabeti
- D) Konsumi i alkoolit dhe duhanit

PS)D

Pyetja 45 V)3

Doza e Fluorit në pastat dhembore për përdorim të përditshëm mbi moshën 6 vjeç është rreth:

- A) 250 ppm
- B) 500 ppm
- C) 1000 ppm
- D) 2500 ppm

PS)C

Pyetja 46 V)2

Shpëlarësit e zgjasin efektin e tyre në zgavren e gojës deri në:

- A) 1 orë
- B) 4 orë
- C) 6 orë
- D) 12 orë

PS)D

Pyetja 47 V)3

Suplementet e fluorit tek femijet qe jetojne ne Shqiperi duhet te fillojne:

- A) Direkt pas lindjes
- B) Ne moshen 6 muajshe
- C) Rreth moshes 3 vjeç
- D) Rreth moshes 6 vjeç

PS)B

Pyetja 48 V)2

Doza e Fluorit ne pastat dhembore per femije 3-6 vjeç duhet te jete:

- A) 500ppm
- B) 1000 ppm
- C) 2500 ppm
- D) 1450 ppm

PS)A

Pyetja 49 V)3

Doza e fluorit per nje femije te moshes mbi 6 vjeç i cili jeton ne nje komunitet ku niveli i fluorit ne ujin e pijshem eshte < 0,3 ppm eshte:

- A) 0,5 mg ne dite
- B) 1mg ne dite
- C) 0,25 mg ne dite
- D) 1 mg ne jave

PS)B

Pyetja 50 V)3

Cili nga indekset e meposhtme perdoret per matjen e experiences karioze ne denticionin permanent:

- A) DT
- B) DMFT
- C) CPITN
- D) Dft

PS)B

Pyetja 51 V)3

Në rast se niveli i fluorit në ujin e pijshëm është 0.7 ppm doza e suplementeve të fluorit për grupmoshën 3- 6 vjeç është:

- A) 0.25mg në ditë
- B) 0.5 mg në ditë
- C) 1 mg në ditë
- D) 0 mg në ditë

PS)D

Pyetja 52 V)1

Cilat nga shenjat e mëposhtme nuk është karakteristikë për toksicitetin nga Fluori?

- A) Glosodini
- B) Diarre
- C) Dhimbje abdominale
- D) Të vjella

PS)A

Pyetja 53 V)2

Vitaliteti i dhëmbit përcaktohet :

- A) Me ekzaminimin radiologjik
- B) Me aparatën elektrodiagnostik
- C) Nga ngjyra e dhëmbit
- D) Me testin e perkusionit

PS)B

Pyetja 54 V)3

Cila është shenja më e hershme radiologjike e patologjisë periapikale me origjinë pulpare?

- A) Shkatërrimi kockor
- B) Densitet kockor i shprehur
- C) Zgjerim i hapësirës periodontale
- D) Shkatërrim i lamina durës dhe kockës

PS)C

Pyetja 55 V)3

Fluori i marrë në perjudhën prenatale vepron:

- A) Nuk ka evidence për veprimin në reduktimin e kariesit tek dhëmbët e përkohshëm
- B) Ka veprim të theksuar parandalues për kariesin në dhëmbët e përhershëm
- C) Ka veprim të theksuar parandalues për kariesin në dhëmbët e përkohshëm

D) Ka verpim të theksuar parandalues për kariesin në dhëmbët e përhershëm dhe të përkohshëm
PS)A

Pyetja 56 V)2

Në cilin rast shfaqet vonesë në erupimin e dhëmbëve të përkohshëm dhe permanent?

- A) Mungesë vit A
 - B) Mungesë vit B
 - C) Mungesë vit C
 - D) Mungesë vit D
- PS)D

Pyetja 57 V)2

Pastat e dhëmbëve që kanë në përbërje pirpofosfat ndikojnë në:

- A) Parandalimin e gurëve
 - B) Zbardhjen e dhëmbëve
 - C) Anti sensitive
 - D) Asnjë nuk është e vërtetë
- PS)A

Pyetja 58 V)2

Pastat e dhëmbëve që kanë veti anti sensitive kanë në përbërje:

- A) Peroksid hidrogjeni
 - B) Karbamid
 - C) Pirofosfat
 - D) Nitrati Kaliumi
- PS)D

Pyetja 59 V)2

Transiluminimi nuk shërben për të diagnostikuar:

- A) Fraktura koronare
 - B) Fraktura radikulare
 - C) Plasaritjet Koronare
 - D) Kariesin dentar
- PS)B

Pyetja 60 V)2

Cilat nga produktet e mëposhtme fluorike ka dozë më të lartë fluori?

- A) Llaku i fluorit (varnishet)
- B) Xheli i fluorit
- C) Pasta e dhëmbëve
- D) Sol fluorike

PS)A

Pyetja 61 V)2

Cili është indikacioni për një egzaminim radiologjik okluzal?

- A) Egzaminimin e kariesit dentar
- B) Ndryshimet periapikale
- C) Për të parë pozicionin buko-lingual të kaninit të retinuar
- D) Kanalin mandibular

PS)C

Pyetja 62 V)2

Egzaminim radiologjik më i përshtatshëm për vlersimin e nivelit tekockës alveolare në patologjinë periodontale është:

- A) Periapikal
- B) Bitewing
- C) Okluzal
- D) Të gjitha të vërteta

PS)B

Pyetja 63 V)2

Cila është shenja radiologjike e ankilozës dhembore në radiologji?

- A) Trashje e hapësirës periodontale
- B) Sqarim në hapësirën periapikale
- C) Shkatërrim i lamina durës
- D) Zhdukje të hapësirës periodontale dhe lamina durës

PS)D

Pyetja 64 V)2

Tubulat dentinare :

- A) Kanë formë cilindrike
- B) Diametri është më i vogël në drejtim të lidhjes zmallt-dentin
- C) Numri i tyre shtohet në drejtim të lidhjes zmallt dentin
- D) Janë të pranishëm edhe në zmallt

PS)B

Pyetja 65 V)2

Kaviteti tunel përgatitet në klasën:

- A) I
- B) III
- C) IV
- D) II

PS)D

Pyetja 66 V)2

Dekolorimi në dhëmbët jo vital vjen kryesisht nga:

- A) Dentina Sekondare
- B) Produktet e hemolizës, gjakut
- C) Irrigantët endodontike
- D) Gutaperka

PS)B

Pyetja 67 V)3

Cili është komplikacioni i mundshëm i zbardhimit në dhëmbë jo vital?

- A) Zevendesimi i mbushjeve
- B) Demineralizimi
- C) Rezorbimi intern
- D) Rezorbimi extern

PS)C

Pyetja 68 V)3

Ne zbardhjen e dhëmbëve në klinikë efekti real zbardhues mund të vlersohet:

- A) Menjëherë
- B) Pas 4-5 javësh
- C) Pas 2 ditësh
- D) Pas 1-2 Javësh

PS)D

Pyetja 69 V)2

Cili nga përqëndrimet e mëposhtme të Peroksidit të Hidrogjenit nuk përdoret në zbardhimin e dhëmbëve?

- A) 30%

- B) 35%
 - C) 38%
 - D) 50%
- PS)D

Pyetja 70 V)3

Zbardhja nuk përbën kundërindikacion në:

- A) Në Amelogenezis imperfekta
 - B) Njollat nga tetraciklina
 - C) Periudhën e shtatëzanisë
 - D) Në alergji të njohur nga agjenti zbardhues
- PS)B

Pyetja 71 V)3

Në dhëmbët të cilët janë të ngjyrosur nga tetraciklina ose fluoroza, zbardhimi i dhëmbëve mund të zgjasë deri në:

- A) 1 ditë
 - B) 1-2 javë
 - C) 1 muaj
 - D) 2-12 muaj
- PS)D

Pyetja 72 V)3

Trajtimet restorative me kompozita në dhëmbët e zbardhur duhet të kryhen:

- A) Disa ditë para zbardhjes së dhëmbëve
 - B) Direkt pas zbardhjes së dhëmbëve
 - C) 3 dite pas zbardhjes së dhëmbëve
 - D) 2 javë pas zbardhjes
- PS)D

Pyetja 73 V)3

Cili nga faktorët nuk ndikon në adezionin dentar (bonding) ?

- A) Smear layer
 - B) Përbërja e dentinës dhe zmaltit
 - C) Vetia lagëse e adezivit
 - D) Temperature e ambjentit
- PS)D

Pyetja 74 V)3

Cili nga faktorët e mëposhtëm mund të shkaktoj sensitivitet post mbushjes?

- A) Tharja totale e dentinës
 - B) Dentina me lagështi normale
 - C) Smear layer
 - D) Aplikimi i bonding
- PS)A

Pyetja 75 V)3

Rezina adezive ose Bondi ka ne perberje te tij:

- A) EDTA
 - B) Bis GMA dhe HEMA
 - C) Acid fosforik
 - D) Acid ortofosforik
- PS)B

Pyetja 76 V)3

Cili nga kriteret e mëposhtëme dëmton procesin e adezionit të dentinës dhe zmaltit.

- A) Dhëmbi i izoluar nga pështyma dhe gjaku
 - B) Aplikimi i acidit dhe shplarja në kohë të barabartë
 - C) Dentina dhe zmalti duhet të thahen mirë
 - D) Polimerizimi i plotë i sistemit adeziv
- PS)C

Pyetja 77 V)3

Në një mbulim direkt të pulpës së ekspozuar (mjekim biologjik), mbi shtresën terapeutike në kontakt me pulpën rekomandohet të vendosim një shtresë:

- A) Cement karboksilat
 - B) Llaku
 - C) Zink Fosfat Cement
 - D) Cement glasionomer
- PS)D

Pyetja 78 V)3

Trashësia e shtresës veçuese "Liner" (CaOH) duhet të jetë deri në:

- A) 3 mm
- B) 0.5 mm
- C) 2 mm

D) 1.5 mm

PS)B

Pyetja 79 V)3

Cila nga thëniet e mëposhtme nuk është qëllimi i përdorimit të materialeve për Bazë Kavitetit:

A) Zëvendësim i dentinës së humbur ose hequr

B) Stimulimi i urës dentinare

C) Mbrojtje termike nën mbushjet metalike

D) Bllokon dhëmbëzimet në punimet restorative indirekte

PS)B

Pyetja 80 V)3

Faktori kryesor etiologjik në nekrozën e pulpës është :

A) infeksioni bakterial

B) përgjigja anti-imflamatore e organizmit

C) A dhe B

D) asnjera

PS)C

Pyetja 81 V)3

Periodontiti apikal asimptomatik zbulohet zakonisht:

A) gjate vizites me sonde eksplorative

B) gjatë kontrolleve radiologjike rutinë

C) nga anamneza

D) asnjera

PS)B

Pyetja 82 V)3

Cila nga keto nuk është e vertete :

A) rryma elektrike gjate elektrotetit vepron menjëherë,

B) reaksionet fizike dhe kimike gjate elektrotetit janë të kthyeshme

C) ngacmimi gjate elektrotetit nuk mund të dozohet me saktësi

D) ngacmimi gjate elektrotetit mund të përsëritet pa dëmtuar indet

PS)C

Pyetja 83 V)3

Për cilat nga këto arsye e referojmë një trajtim endodontik te një koleg specialist:

- A) Një lezion që nuk shërohet në kohë
- B) Rasti studiohet dhe vlerësohet i vështirë
- C) thyerje të instrumenteve
- D) të gjitha të mësipërmet

PS)D

Pyetja 84 V)3

Cilat nga keto kritere vlerësohen për të përcaktuar gjendjen e pulpes gjate procedures se mbulimit indirekt dhe direkt te pulpes :

- A) mungesë të ndryshimeve radiologjike,
- B) mungesë të dhimbjes spontane,
- C) nuk ka dhimbje në perkusion,
- D) tre te mesipermet

PS)D

Pyetja 85 V)3

Hyrja e kavitetit endodontik në molarët maksilarë lokalizohet;

- A) në pjesën meziale të faqes okluzale
- B) ne pjesen distale te faqes okluzale
- C) ne qender te faqes okluzale
- D) nuk percaktohet

PS)A

Pyetja 86 V)3

Perforacioni apikal gjate trajtimeve endodontike ne premolaret mandibulare shkaktohet ;

- A) nga inklinimi distal i premolarit mandibular.
- B) nga mosgjetja e kthesave bukale gjatë eksplorimit të kanalit
- C) hyrja ne kanal nga ana bukale
- D) A dhe C

PS)B

Pyetja 87 V)3

Perforacioni i furkacionit në molarët mandibularë ndodh:

- A) ne dhembet e inklinuar mezialisht
- B) kur nuk orientohemi me saktësi mbi thellësinë e dhomës pulpare
- C) nga heqja jo e plote e tavanit te dhomes pulpare
- D) nga mbihapja e kavitetit endodontik

PS)B

Pyetja 88 V)3

Nje kanal mund te mbetet i patrajtuar per shkak te :

- A) kalcifikimit
- B) lokalizimit jo normal
- C) hapjes inadequate
- D) te gjitha te mesipermet

PS)D

Pyetja 89 V)3

Nje kanal i katert zakonisht gjendet ne:

- A) rrenjen meziobukale te molarit te pare maksilar
- B) rrenjen meziale te premolarit te pare maksilar
- C) rrenjen palatinale te molarit te pare maksilar
- D) rrenjen distobukale te molarit te pare maksilar

PS)A

Pyetja 90 V)2

Diametri i tubulave dentinare prane pulpes eshte afersisht :

- A) 0.8 μm
- B) 3.8 μm
- C) 2.4 μm
- D) 3.4 μm

PS)D

Pyetja 91 V)2

Cilat nga keto qeliza te pulpes jane multifunksiionale:

- A) mastocitet
- B) odontoblastet
- C) qelizat inaktive mezenkimale
- D) fibrocitet

PS)C

Pyetja 92 V)2

Cili nga keto faktore ka ndikimin kryesor ne rezultatin e nje mbulimi direkt te pulpes:

- A) mosha e pacientit
- B) permasat e ekspozimit

- C) diagnoza paraprake
 - D) vendndodhja e ekspozimit
- PS)C

Pyetja 93 V)1

Cili nga keto dhembe e ka gjatesine mesatare 22 mm:

- A) molari i pare maksilar
 - B) incizivi lateral maksilar
 - C) molari i dyte maksilar
 - D) incizivi central mandibular
- PS)B

Pyetja 94 V)3

Ne cilen zone perhapet dhimbja ne pulpitet totale te premolareve maksilare:

- A) temporale
 - B) nazale
 - C) infraorbitale
 - D) ne drejtim te mjekres
- PS)C

Pyetja 95 V)2

Cila është diagnoza kur dhëmbi përgjigjet negativisht në testin elektrik dhe termik:

- A) hiperemi pulpare
 - B) nekrozë pulpare
 - C) karies profound
 - D) pulpit akut total
- PS)B

Pyetja 96 V)2

Cilet nga keto elemente nxisin pergjigjen immune ne proceset periapikale kronike :

- A) makrofaget
 - B) limfocitet
 - C) makrofaget dhe limfocitet
 - D) eritrocitet
- PS)C

Pyetja 97 V)3

Cili nga keta faktore nuk ka lidhje me ndryshimet e pulpes me kalimin e moshes:

- A) mineralizimi intrapulpar
 - B) kalcifikimet difuze pergjate vazave te gjakut
 - C) ndryshime arteriosklerotike
 - D) shtim i numrit te qelizave pulpare
- PS)D

Pyetja 98 V)3

Karakteret e dhimbjes ne pulpite varet nga :

- A) lloji i shkaktarit
 - B) numri i mikrobeve
 - C) lokalizimi i dhembit
 - D) A dhe B
- PS)D

Pyetja 99 V)3

Abscesi apikal akut diferencohet nga periodontiti apikal akut permes:

- A) testit pulpar
 - B) ekzaminimet radiologjik
 - C) prezenca e edemes
 - D) shkalla e levizshmerise
- PS)C

Pyetja 100 V)3

Kur pacienti referon dhimbje te forta gjate prekjes se dhembit testi perkusionit :

- A) nuk duhet bere
 - B) duhet goditur me fundin e nje instrumenti
 - C) duhet bere vetem ne faqen bukale te dhembit
 - D) duhet bere duke presuar me gishta
- PS)D

Pyetja 101 V)3

Testi anestezise eshte shume efektiv per lokalizimin e dhimbjes:

- A) ne dhembe specifike
 - B) ne mandibul ose maksile
 - C) ne cilen ane te vijes mediane
 - D) per dhembet posteriore
- PS)B

Pyetja 102 V)3

Fistula që drenon në faqe përmes lekures më shpesh vjen nga:

- A) një patologji jo-odontogjene
 - B) një absces periodontal
 - C) një patologji periradikulare(endodontike)
 - D) dalje me vështirësi të dhembalës së tretë mandibulare
- PS)C

Pyetja 103 V)3

Cila është zgjidhja më e mirë për diagnostikimin e dhimbjes me natyrë odontogjene :

- A) ekzaminimi radiologjik
 - B) perkusioni
 - C) ekzaminimi klinik
 - D) një ekzaminim step-by step i pasuar dhe me testet
- PS)D

Pyetja 104 V)2

Kaviteti testues :

- A) është testi i parë diagnostikues
 - B) përdoret kur gjithë testet e tjera nuk japin rezultat
 - C) duhet realizuar nën anestezë
 - D) përdoret kur pacienti ka dhimbje në perkusion
- PS)B

Pyetja 105 V)3

Cila nga substancat e mëposhtme nxirrë hiperalgjezë në fibrat lokale nervore:

- A) prostaglandina dhe serotonina
 - B) enzimët lizosomale
 - C) peptidet nga calcitonina
 - D) substanca P
- PS)A

Pyetja 106 V)3

Historia mjekësore komplete është thelbësore kur trajtojmë një pacient me emergjencë dentare:

- A) për të identifikuar ata pacientë që kanë kundërindikacion për trajtime endodontike
- B) për të identifikuar ata pacientë që kanë nevojë për modifikime në kursin e trajtimit

- C) për të mbrojtur stafin nga sëmundje të transmetueshme përmes gjakut që mund të ketë pacienti
- D) për mbrojtje mediko-ligjore dhe për të përcaktuar nëse gjendja aktuale ka impakt në prognozen e trajtimit endodontik
- PS)B

Pyetja 107 V)2

Incizioni dhe drenimi në një edemë të fortë :

- A) duhen shtyrë deri sa edema të bëhet fluktuante
- B) reduktojnë dhimbjen e shkaktuar nga edema
- C) ndihmojnë për të marrë material për kulturë histologjike
- D) nuk janë të indikuara
- PS)B

Pyetja 108 V)2

Trajtimi emergjent në dhimbjen e fortë therrëse tek molari i parë maksilarë është:

- A) pulpotomia
- B) pulpektomia parciale
- C) pulpektomia e plotë
- D) trajtimi me analgjezikë dhe antibiotikë
- PS)C

Pyetja 109 V)3

Sinuziti maksilar akut shpesh:

- A) shoqërohet me dhimbje në një dhemb
- B) shoqërohet me dhimbje në rregjionin orbital dhe në dhembet maksilare distale
- C) shoqërohet me dhimbje nga të ftohtat
- D) shoqërohet me edeme në pjesën posteriore të vestibulum maksile
- PS)B

Pyetja 110 V)3

Rezekcioni apikal indikohet në deshtimet endodontike kur:

- A) dentisti zbulon një kanal të patrajtuar
- B) ka mikrorrjedhje apikale
- C) ka një vide në kanal dhe një koronë në gjendje të mirë
- D) asnjëra
- PS)C

Pyetja 111 V)3

Metoda me e mire per te kontrolluar dhimbjen pas perpunimit te kanalit eshte:

- A) marrja e nje analgjeziku pak para procedures
- B) marrja e nje analgjeziku para dhe gjate procedures
- C) marrja e nje analgjeziku ne fund te procedures
- D) marrja e nje analgjeziku nese fillon dhimbja

PS)A

Pyetja 112 V)3

Dentina qe duhet hequr per te siguruar akses ne vije te drejte ne kanal in mezo-bukal ne molaret mandibulare:

- A) eshte e lokalizuar mezialisht ne drejtim proksimal
- B) eshte e lokalizuar distalisht drejt furkacionit
- C) eshte e lokalizuar ne drejtim facial
- D) eshte e lokalizuar ne drejtim lingual

PS)A

Pyetja 113 V)3

Cila eshte siperfaqja me e predispozuar per perforacion ne nje inciziv mandibular:

- A) labiale
- B) linguale
- C) meziale
- D) distale

PS)A

Pyetja 114 V)2

Perforacioni ne dhembet maksilare anteriore ndosh me shpesh ne :

- A) anen faciale te rrenjes
- B) anen palatinale te rrenjes
- C) rastet e perdorimit te frezes Gates-Glidden gjate pregatitjes se linjave te drejta
- D) fazen e heqjes se brireve pulpare me freze mikromotori

PS)A

Pyetja 115 V)1

Sistemi limfatik ne pulpen dentare:

- A) trasmeton limfocitet ne rregjionet e inflamuar
- B) nuk eshte i nevojshem per shkak te rrjetes kapilare te qarkullimit te gjakut

- C) nuk mund te demonstrohet morfologjikisht per shkak se ngjajne me venulat
 - D) ndikon ne drenimin e fluideve indore
- PS)D

Pyetja 116 V)2

Granuloma nga ana histologjike perben :

- A) nje infeksion
 - B) fazen e pare te formimit te nje kisti
 - C) nje faze sherimi
 - D) nje pergjigje imune
- PS)D

Pyetja 117 V)2

Restaurimi koronar final pas nje trajtimi endodontik duhet vendosur :

- A) brenda 30 diteve
 - B) brenda 3 muajve
 - C) brenda 6 muajve
 - D) pas nje viti
- PS)A

Pyetja 118 V)2

Cila nga keto eshte e vertete :

- A) Hipokloriti i Natriumit qe perdoret per irrigim eshte solucion me pH 12 dhe toksik
- B) Hipokloriti i Natriumit ka veprim shkrirës per dentinen
- C) Hipokloriti i Natriumit qe perdoret per irrigim eshte solucion me % te larte dhe cliron chlorine
- D) Hipokloriti i Natriumit ka tension siperfaqësor te larte dhe lehteson penetrimin e tij ne sistemin e kanalit

PS)A

Pyetja 119 V)3

Acidimi i dentines para vendosjes se materialeve restauruese:

- A) mbron pulpen nga invazioni bakterial
- B) favorizon penetrimin bakterial ne pulpe
- C) demton proceset odontoblastike ne tubula
- D) ul pergjigjen pulpare ndaj materialeve restauruese

PS)B

Pyetja 120 V)3

Kush nga personat nuk është i predispozuar për cikatrice:

- A) Gratështatzanë
 - B) Persona me lekurë të yndyrshme
 - C) Persona me predispozitë gjenetike
 - D) Rraca e bardhë
- PS)D

Pyetja 121 V)3

Kush nga shprehjet nuk është e vërtetë në traumat pediatrike:

- A) Dëmtimet e shpeshta të trurit
 - B) Konsolidim patologjik i shpeshtë
 - C) Frakturat nën 5 vjeç takohen rrallë
 - D) Çngjyrosje dhe hypoplazi e dhëmbëve permanentë
- PS)B

Pyetja 122 V)3

Kush nga shprehjet nuk është e vërtetë në traumat në moshat e treta:

- A) Kërkojnë fiksion bimaxillar për një kohë më të gjatë
 - B) Kanë dislokim të madh të fragmenteve
 - C) Shërohen me vonesë
 - D) Përdoret kryesisht mjekimi kirurgjikal
- PS)B

Pyetja 123 V)3

Labium duplex takohet më shumë:

- A) Në buzën e poshtme
 - B) Në buzën e sipërme ana e brendshme
 - C) Në këndin e buzës
 - D) Në pjesën e jashtme të buzës së sipërme
- PS)B

Pyetja 124 V)3

Kush nga skizat e nuk qëndron:

- A) Skiza faciale mediane
- B) Makrostomia
- C) Skiza e Sinomartit
- D) Melioskizis

PS)C

Pyetja 125 V)3

Kush nga klasifikimet për skizat labio-palatine nuk ekziston:

- A) Klasifikimi sipas Davis
- B) Klasifikimi sipas Veau
- C) Klasifikimi sipas Tenyson
- D) Klasifikimi sipas Fogh

PS)C

Pyetja 126 V)3

Faringoplastika për korrigjimin e inkontinencës velo-faringeale përdoret në moshën:

- A) 2-3 vjeç
- B) 5-7 vjeç
- C) 9-10 vjeç
- D) 12-13 vjeç

PS)C

Pyetja 127 V)3

Kush nga shprehjet nuk është e vërtetë:

- A) Teknika Tenyson përdoret në korrigjimin e defekteve unilaterale të buzës
- B) Teknika Millard përdoret në korrigjimin e defekteve unilaterale të buzës
- C) Teknika Veau dhe Black përdoret në korrigjimin e defekteve bilaterale të buzës
- D) Teknika Killner përdoret në defektet e pjesshme bilaterale të buzës

PS)D

Pyetja 128 V)3

Kush nga shprehjet është e vërtetë për përdorimin e grafteve kockore alveolar pas defekteve të lindura të buzës dhe qiellzës:

- A) Përdorimi i grafteve në moshën 5-7 vjeç
- B) Përdorimi i tyre 3-5 vjeç
- C) Përdorimi i tyre 9-11 vjeç
- D) Përdorimi i tyre 17-20 vjeç

PS)C

Pyetja 129 V)3

Kush nga shprehjet nuk është e vërtetë në lidhje me fistulat palatine:

- A) Këto takohen në pjesët laterale të qiellzës
 - B) Janë bilaterale
 - C) Janë unilaterale
 - D) Takohen në vijën mediane të qiellzës
- PS)D

Pyetja 130 V)3

Grafti kockor për riparimin e defekteve alveolare pas korrigjimit të defekteve të lindura të buzës dhe të qiellzës nuk ka si qëllim:

- A) Përmirësimin e formës së procesit alveolar
 - B) Mbështetje të naresit dhe të hundës
 - C) Krijimin e bazës për vënie implantesh
 - D) Mbylljen e fistulës oro-sinuzale
- PS)D

Pyetja 131 V)3

Kush nga shkaqet nuk merr pjesë në anomalitë e nofullave:

- A) Hydrocefalia
 - B) Tortikoli
 - C) Heqja e syrit
 - D) Heqja e veshit
- PS)D

Pyetja 132 V)3

Kush nga shprehjet nuk qëndron në një të semurë që operohet me kirurgji ortognatike gjatë operacionit:

- A) Pozicioni me kokën më lart se trupi
 - B) Kateter urinar kur operacioni zgjat mbi katër orë
 - C) Problemet psikike të të sëmurit
 - D) Akcesi vaskular
- PS)C

Pyetja 133 V)3

Kush nga llojet e overjetit nuk ekziston:

- A) Ideal
 - B) Minimal
 - C) I rritur
 - D) I kundërt
- PS)B

Pyetja 134 V)3

Kush nga llojet e overbite nuk ekziston:

- A) Ideal
- B) I thellë
- C) I hapur
- D) Anormal

PS)D

Pyetja 135 V)3

Kush nga autorët nuk ka lidhje me kirurgjinë ortognatike:

- A) Wasmund
- B) Obwegeser
- C) Epker
- D) Lehman

PS)D

Pyetja 136 V)3

Kush nga komplikacionet e osteotomive maksillare nuk ekziston:

- A) Dëmtim i duktusit lakrimal
- B) Insuficencë velofaringeale
- C) Devitalizim i dhembëve
- D) Rezorbim i procesit artikular të ATM

PS)D

Pyetja 137 V)3

Kirurgjia ortognatike bimaksilare nuk përdoret në:

- A) Genioplastike
- B) Hypoplazi maksilare
- C) Hiperplazi kondiliene
- D) Progeni

PS)A

Pyetja 138 V)3

Kush nga shprehjet flet për makroglosi:

- A) Nofulla me përmasa të vogla
- B) Tonsile hipertrofike

- C) Palatum i sheshtë
 - D) Diastemë në mandibul dhe në maksilë
- PS)D

Pyetja 139 V)3

Kush nuk futet në kirurgjinë faciale estetike:

- A) Rinoplastika
 - B) Keiloplastika
 - C) Dukto plastika e duktus stenoni
 - D) Osteotomitë e nofullave
- PS)C

Pyetja 140 V)3

Ngërdheshja e fytyrës është e:

- A) Antraksit
 - B) Nomes
 - C) Tetanozit
 - D) Granulomes Wegenerit
- PS)C

Pyetja 141 V)3

Kush nga shenjat nuk është karakteristike e sindromit Apert:

- A) Alopecia
 - B) Syndaktilia
 - C) Kardiopati kongenitale
 - D) Ren polikistik
- PS)A

Pyetja 142 V)3

Kush nga shenjat nuk është karakteristike e sindromit Melkersson-Rosenthal:

- A) Edemë recidivante e fytyrës
 - B) Ankiloglosi
 - C) Paralizë faciale periodike
 - D) Lingua plikata
- PS)B

Pyetja 143 V)3

Kush nga shenjat nuk është karakteristike e sindromit Pierre Robin:

- A) Kista multiple në nofulla
- B) Glosoptozë
- C) Mikrognati
- D) Defekt palatumi

PS)A

Pyetja 144 V)3

Kush nga ekzaminimet nuk ka vlerë për të përcaktuar diagnozën e anomalive të nofullave:

- A) Analiza cefalometrike
- B) R0-grafi te ndryshme
- C) IRM
- D) Skaneri

PS)C

Pyetja 145 V)3

Kush është më e saktë për përcaktimin e diagnosës së tumoreve beninje të nofullave:

- A) Panoramexi
- B) Skaneri
- C) IRM
- D) Biopsia

PS)D

Pyetja 146 V)3

Ndjekja post operative e të sëmurëve të operuar me kancer nuk ka si qëllim:

- A) Vënien e diagnosës se recidivës
- B) Trajtimin e recidivës
- C) Trajtimin e komplikacioneve në stadet e hershme
- D) Estetikën e pacientit

PS)D

Pyetja 147 V)3

Kush nga shprehjet nuk ka vlerë për rënien e % së osteomyelitit në kohën e sotme:

- A) Aktiviteti fizik
- B) Rritja e nivelit të ushqyerjes
- C) Kujdesi për gojën dhe dhëmbët
- D) Rritja e nivelit të edukatës shëndetësore

PS)A

Pyetja 148 V)3

Kush nga ekzaminimet nuk ka vlerë në përcaktimin e diagnozës së osteomielitit:

- A) Jod radioaktiv skaneri
- B) Imazhi radionuklear
- C) Technetium skaneri
- D) Gallium skaneri

PS)A

Pyetja 149 V)3

Kush nga vecoritë e mëposhtëme nuk i përket ameloblastomës:

- A) Recidivon
- B) Frakturë patologjike
- C) Mund të malinjizojë
- D) Ngjan me një dhëmb të përmbajtur në Ro'grafi

PS)D

Pyetja 150 V)3

Dignoza diferenciale e ameloblastomës nuk bëhet me :

- A) Osteoblastoklastomën
- B) Tumoret malinj të nofullës
- C) Fibromën intrakockore
- D) Osteomën

PS)D

Pyetja 151 V)3

Kush nga klasifikimet e mëposhtëme nuk është i saktë për epulidet:

- A) Fibromatoz
- B) Angiomatoz
- C) Angiosarkomatoz
- D) Gjigandocelular

PS)C

Pyetja 152 V)3

Kush nga tumoret e mëposhtë me joodontogjen të nofullave nuk është i saktë:

- A) Tumori i murmë
- B) Tumori i bardhë
- C) Kerubizmi

D) Fibroma intrakockore
PS)B

Pyetja 153 V)3

Kush nga format klinike të granulomës euzinofile nuk është e saktë:

A) Forma e lokalizuar
B) Forma e gjeneralizuar
C) Forma kominutive
D) Forma difuze
PS)C

Pyetja 154 V)3

Kush nga sindromat e mëposhtëme nuk është vaskular :

A) Kassabah-Merit
B) Pilsner
C) Rendu - Osler
D) Sturge-Weber
PS)B

Pyetja 155 V)3

Kush nga gjendjet e mëposhtëme nuk është lezion prekanceroz

A) Leukoplakia
B) Leukoedema
C) Eritroplakia
D) Lichen planus
PS)B

Pyetja 156 V)3

Kornum kutaneum mund te cojë në:

A) Ca bazocelulare
B) Ca spinocelulare
C) Melanomë
D) Sarkome
PS)A

Pyetja 157 V)3

Kush nga format e mëposhtëme nuk i takon aftës recidivante :

- A) Minore
 - B) Kuneiforme
 - C) Majore
 - D) Herpetiforme
- PS)B

Pyetja 158 V)3

Kush nga ulçerat e mëposhtëme nuk takohet në gojë:

- A) Gastrointestinalle
 - B) Jatrogjene
 - C) Neoplazike
 - D) Otojene
- PS)D

Pyetja 159 V)3

Kush nga format klinike të kancerit oral nuk egziston :

- A) Forma miksomatoze
 - B) Forma nodulare
 - C) Forma ulcerative
 - D) Forma vegjetative
- PS)A

Pyetja 160 V)3

Kush nga preparatet e mëposhtëme nuk përdoret në kimioterapi:

- A) Vinkristina
 - B) Metotreksati
 - C) Fosforamidi
 - D) Fluoracili
- PS)C

Pyetja 161 V)3

Diagnoza diferenciale e ulçerës karcinomatoze nuk bëhet me :

- A) Ulçerën dekubitale
 - B) Ulçerën nga antraksi
 - C) Ulcerën tuberkulare
 - D) Ulçerën sifilitike
- PS)B

Pyetja 162 V)3

Kanceri i lëkurës së fytyrës nuk shkaktohet nga :

- A) Rrezatimi djellor
 - B) Dermatozat kronike
 - C) Përdorimi i duhanit
 - D) Gjëndjet prekanceroze
- PS)C

Pyetja 163 V)3

Kush nga shenjat e mëposhtëme nuk është karakteristikë për tumoret malinj të nofullave:

- A) Luksim i dhëmbëve
 - B) Foetor ex-oris
 - C) Simptoma Vincenti
 - D) Otorhea
- PS)D

Pyetja 164 V)3

Kush nga simptomat e mëposhtëme nuk është karakteristikë për kancerin e maksilës:

- A) Dhimbje të tipit neuralgjik
 - B) Rinoragji
 - C) Egzoftalmus
 - D) Enoftalmus
- PS)D

Pyetja 165 V)3

Kush nga patologjitë e mëposhtëme nuk bën pjesë në malformacionet e rralla:

- A) Makrostomia
 - B) Labium duplex
 - C) Keilostkizis simplex
 - D) Fistulat labiale
- PS)C

Pyetja 166 V)3

Kush nga sindromet e mëposhtëme nuk shoqërohet me skiza:

- A) Pierre-Robin
- B) Meckel
- C) Melkerson-Rosendal
- D) Franchesketi

PS)C

Pyetja 167 V)3

Kush nga teknikat e mëposhtëme nuk përdoret në trajtimin e defekteve të lindura të buzës:

- A) ABBE
- B) Tenyson
- C) Millard
- D) Veau

PS)A

Pyetja 168 V)3

Kush nga teknikat e mëposhtëme nuk përdoret për korrigjimin e palatoskizis:

- A) Langenbeck
- B) Furlow
- C) Karapanziç
- D) Vardil-Killner

PS)C

Pyetja 169 V)3

Kush nga anomalitë e mëposhtëme nuk bën pjesë në ato të sensit vertikal:

- A) Mordex aperta
- B) Mordex mixt
- C) Mordex profundum
- D) Intruzio dentis

PS)B

Pyetja 170 V)3

Kush nga osteotomitë e mëposhtëme nuk përdoret në Mandibul :

- A) Osteotomi oblike ramus ascendent
- B) Osteotomi në formën e "Z" në ramus horizontalis mandibule
- C) Osteotomi në formën e "L" në ramus horizontalis mandibule
- D) Osteotomi në formë drejtkëndëshi në ramus horizontalis mandibule

PS)D

Pyetja 171 V)2

Kush nga osteotomitë nuk përdoret në nofullën e sipërme :

- A) Le Fort I

- B) Le Fort II
 - C) Wasmund
 - D) Kole
- PS)D

Pyetja 172 V)2

Kush nga lembot e mëposhtëme nuk egziston :

- A) Random
 - B) Mc Gregor
 - C) Le Fort
 - D) Bakamian
- PS)C

Pyetja 173 V)2

Kush nga plastikat e mëposhtëme nuk egziston :

- A) Homoplastikë
 - B) Heteroplastikë
 - C) Aloplastikë
 - D) Sklopoplastike
- PS)D

Pyetja 174 V)2

Skin grafti nuk përdoret për zëvendësimin e :

- A) Indit kockor
 - B) Lëkurës
 - C) Mukozës
 - D) Gjuhës
- PS)A

Pyetja 175 V)3

Kush nga shenjat e mëposhtëme nuk është karakteristikë e sindromit Apert:

- A) Hypoplazi maksilare
 - B) Skizë palatinale
 - C) Syndaktili
 - D) Alopeci
- PS)D

Pyetja 176 V)3

Kush nga shenjat e mëposhtëme është karakteristikë e sindromet Frey:

- A) Bula djerse
- B) Dhimbje koke
- C) Të vjella
- D) Otoragji

PS)A

Pyetja 177 V)3

Kush nga shenjat e mëposhtëme nuk është karakteristikë e sindromit Maffuci:

- A) Skize palatine
- B) Endokondroma
- C) Hemangioma
- D) Flebolite

PS)A

Pyetja 178 V)3

Kush nga shenjat e mëposhtëme nuk është karakteristikë e sindromit Piere-Robin:

- A) Mikrognati
- B) Glosoptozë
- C) Defekt qiellze
- D) Hemangioma multiple

PS)D

Pyetja 179 V)3

Kush nga shenjat e mëposhtëme nuk është karakteristikë e sindromit Francesketi:

- A) Difekt qiellze
- B) Anomali nofullash
- C) Anomali në gishta
- D) Anomali në veshë

PS)C

Pyetja 180 V)3

Kush nuk është karakteristikë e sindromi Treacher-Collins:

- A) Hypoplazi mandibulare
- B) Glosoptozë
- C) Defekt në sy
- D) Ren polikistik

PS)D

Pyetja 181 V)3

Kush nga veçoritë e mëposhtëme nuk është karakteristikë për osteomyelitin në fëmijë:

- A) Shfaqet ne 9 mujorin e parë të lindjes
- B) Prek kryesisht maksilën
- C) Prek kryesisht mandibulën
- D) Diagnoza e hershme është e rëndësishme për të evituar komplikacionet dhe mortalitetin

PS)C

Pyetja 182 V)3

Kush nga shkaktarët e mëposhtëm nuk akuzohet për osteomyelitin në fëmijë:

- A) Mastiti
- B) Rruga hematogjene
- C) Dhëmbët
- D) Sakusi lakrimal i infektuar

PS)C

Pyetja 183 V)3

Kush nga shenjat e mëposhtëme nuk është karakteristikë për osteomyelitin e nofullave në fëmijë:

- A) Të vjella
- B) Debulesë
- C) Otagji
- D) Epilepsi

PS)C

Pyetja 184 V)3

Kush nga shenjat e mëposhtëme lokale nuk është karakteristikë në osteomyelitin e nofullave në fëmijë:

- A) Edemë faciale
- B) Celulit periorbital
- C) Poliperiodontit
- D) Rrjedhje pusi ne vestibulum ose palatum

PS)C

Pyetja 185 V)3

Kush nga komplikacionet e osteomyelitit infantile ne nofulla nuk egziston:

- A) Verbimi
 - B) Meningiti
 - C) Otit
 - D) Abcesi cerebral
- PS)C

Pyetja 186 V)3

Radioterapia nuk jep:

- A) Hypovaskularizim të indeve
 - B) Hypocelularitet
 - C) Hypoksi
 - D) Hiperaktivitet
- PS)D

Pyetja 187 V)3

Më shpesh nga osteoradionekroza preket :

- A) Maksila
 - B) Mandibula
 - C) Kocka hyoide
 - D) Klavikula
- PS)B

Pyetja 188 V)3

Arsyet e osteoradionekrozës nuk janë:

- A) Doza e madhe
 - B) Higjena e keqe
 - C) Ekstraksione para radiacionit
 - D) Ekstraksione pas radiacionit
- PS)C

Pyetja 189 V)3

Kush nga deformimet e mëposhtëme nuk është kongenital:

- A) Defektete e buzës dhe tëqijllzës
 - B) Disostozat kraniofaciale
 - C) Fascia adenoide
 - D) Mikrosomia hemifaciale
- PS)C

Pyetja 190 V)3

Kush nga deformimet e mëposhtëme nuk lidhet me zhvillimin:

- A) Traumat
 - B) Osteomyeliti
 - C) Malnutricioni
 - D) Disostozat kraniofaciale
- PS)D

Pyetja 191 V)3

Kush nga të sëmurët e mëposhtëm nuk përbën faktor risku mjekësor . I sëmurë me:

- A) Anomali dentare
 - B) Defektet kongenital të zemrës
 - C) Deformime të shtyllës
 - D) Asthma
- PS)A

Pyetja 192 V)3

Kush nga shenjat e mëposhtëme nuk është përcaktuese për disfunktionin e A.T.M:

- A) Marrje mendësh
 - B) Të vjella
 - C) Spazma muskulare
 - D) Dhimbje koke persistente
- PS)B

Pyetja 193 V)3

Kush nga zonat topografike të faqes nuk egziston :

- A) Zona suborbitale
 - B) Zona preaurikulare
 - C) Zona submandibulare
 - D) Zona orale dhe buko-mandibulare
- PS)C

Pyetja 194 V)2

Kush nga etiologjitë e mëposhtëme nuk është e saktë për malokluzionin :

- A) Etiologjia dentare
- B) Etiologjia skeletike
- C) Etiologjia sindromike

D) Etiologjia hematogjene
PS)D

Pyetja 195 V)2

Një shkatërrim të madh dhe të menjëhershëm emocional pacientit i sjellin:

A) Defektet traumatike
B) Defektet e lindura
C) Defektet sindromike
D) Defektet jatrogjene
PS)A

Pyetja 196 V)3

Traumat dento-maxillo-faciale takohen më shumë :

A) Në fëmijë
B) Në meshkujt e ri
C) Në të rritur
D) Në të moshuar
PS)B

Pyetja 197 V)3

Kush nga funksionet e mëposhtëme nuk i takon hundës:

A) Funksioni estetik
B) Filtrimi i ajrit
C) Të folurit
D) Lëngështim dhe ngrohje e ajrit
PS)C

Pyetja 198 V)3

Kush nga ndërhyrjet e mëposhtë me nuk shkakton deformim të hundës:

A) Operacioni Caldwell
B) Rinoplastika
C) Septorinoplastika
D) Kirurgjia ortognatike
PS)A

Pyetja 199 V)3

Kush nga donorët kartilagjinoz të mëposhtëm nuk egziston:

- A) Kosto-kondral
 - B) Kreshta iliake
 - C) Septum nazal
 - D) Konka aurikulare
- PS)B

Pyetja 200 V)3

Kush nga problemet e mëposhtëme ne materialet alo-plastike nuk egziston :

- A) Flakja
 - B) Migracioni
 - C) Vaskularizimi
 - D) Infeksioni
- PS)C

Pyetja 201 V)3

Kush nga problemet e mëposhtëme në graftet kockore nuk egziston :

- A) Flakja
 - B) Migracioni
 - C) Vaskularizimi
 - D) Infeksioni
- PS)B

Pyetja 202 V)3

Kush nga specialistët e mëposhtëm nuk luan rol të madh në venien e diagnozes për tumoret beninj apo malinj të regjionit O.M.F:

- A) Kirurgu O.M.F
 - B) Imazheristi
 - C) Anatomo-patologu
 - D) Anestezist-reaminatori
- PS)D

Pyetja 203 V)1

Ameloblastoma takohet më shumë në:

- A) Maxillë
 - B) Mandibul
 - C) Kockat zygomatike
 - D) Kockat orbitale
- PS)B

Pyetja 204 V)1

Kush është faktori kryesor i kancerit oral :

- A) Alkoli
 - B) Duhani
 - C) Droga
 - D) Faktorët ambjental
- PS)B

Pyetja 205 V)1

Nje ulcer në gojë që nuk mund të shërohet nuk duhet ndjekur me :

- A) Egzaminim objektiv intra dhe ekstraoral
 - B) Biopsi
 - C) Follow-up
 - D) Gargara dezinfektante
- PS)D

Pyetja 206 V)1

Kush nga fenomente e mëposhtëme flet për prognozë të keqe të kancerit oral :

- A) Limfonoduli metastatik
 - B) Forma e ulçerës
 - C) Ngjyra e ulçerës
 - D) Gjakosja e ulçerës
- PS)A

Pyetja 207 V)1

Në trajtimin kirurgjikal të kancerit oral më shumë rëndesi ka :

- A) Heqja në kufij të shëndoshë
 - B) Verifikimi i margove kirurgjikale të ekscizionit
 - C) Heqja në thellësi
 - D) Heqja në gjërësi
- PS)B

Pyetja 208 V)3

Kush nga origjinat e mëposhtëme akuzohet më rrallë për metastazat mandibulare :

- A) Ca e veshkave
- B) Prostata
- C) Truri

D) Gjoksi
PS)C

Pyetja 209 V)3

Kush nga teknikat e mëposhtëme nuk përdoret për trajtimin kirurgjikal të mandibulës së përfshirë nga kanceri :

A) Simfizektomi radikale
B) Rezekcioni parcial
C) Mandibulektomi pa dezartikulim
D) Lingulektomi
PS)D

Pyetja 210 V)3

Kush nga funksionet e mëposhtëme nuk i takon mandibulës :

A) Njomja e ushqimit
B) Përthypja
C) Gëlltitja
D) Të folurit
PS)A

Pyetja 211 V)2

Kush nga funksionet e mëposhtëme nuk i takon mandibulës :

A) Estetik
B) Ngrohja e ajrit
C) Personaliteti
D) Ana psiko-sociale
PS)B

Pyetja 212 V)2

Kush nga qëllimet e mëposhtëme nuk përfshihet ne follow-up:

A) Vënia e diagnoses (recidiva)
B) Trajtimi i recidivës
C) Aktiviteti fizik i të sëmurit
D) Trajtimi i komplikacioneve
PS)C

Pyetja 213 V)2

Kush nga veprimet e mëposhtëme nuk duhet të egzistojë gjatë trajtimit kirurgjikal të një të sëmurit me kancer:

- A) Të respektohet dinjiteti i të sëmurit
 - B) Të sigurohet konforti i të sëmurit
 - C) Të rritet mbijetesja e të sëmurit
 - D) Të sigurohet krenaria e kirurgut
- PS)D

Pyetja 214 V)3

Kush nga faktoret e mëposhtëm nuk luan rol në uljen e përqindjes së ostomyelitis :

- A) Nekrektomia
 - B) Rritja e nivelit të ushqyerjes
 - C) Kujdesi i mire për gojën dhe dhëmbët
 - D) Rritja e nivelit të edukates shëndetësore
- PS)A

Pyetja 215 V)2

Në diferencimin e një osteomyelitis me një tumor malinj, kush është më e rëndësishme:

- A) Klinika
 - B) Tërheqja e procesit pas antibiotiko-terapisë
 - C) Anamneza
 - D) Ro' grafia
- PS)B

Pyetja 216 V)1

Kush nga arsyet e mëposhtëme nuk qëndron për prekjen më të rrallë të maxillës nga ostomyelitis:

- A) Vaskularizimi më i mire
 - B) Ka një kockë kortikale më të hollë
 - C) Prania e dhëmbëve sinuzal
 - D) Infeksioni shpërndahet në kavitetet fqinje
- PS)C

Pyetja 217 V)2

Kush nga egzaminimet e mëposhtëme nuk ka vlere në përcaktimin e osteomyelitis :

- A) CT
- B) IRM
- C) Technecium-Skaneri

D) Ro'grafi me lëndë kontraste
PS)D

Pyetja 218 V)2

Kush nga thëniet e mëposhtëme nuk është karakteristikë e osteomyelitit kronik :

A) Temperatura ondulante
B) Fistula
C) Trizmusi
D) Frakturë patologjike
PS)A

Pyetja 219 V)1

Diagnoza e saktë në kirurgjinë OMF ka rëndësi për:

A) Mënyrën e mjekimit
B) Përdorimin e të dhënave për statistikë
C) Përgjegjësinë mjeko ligjore të personelit ndihmës
D) Aspektin social
PS)A

Pyetja 220 V)1

Reagim alergjik ndaj anestetikëve lokalë do të thotë:

A) Rritje e presionit arterial
B) Rritje e temperaturës
C) Humbje e ndjenjave
D) Prurit dhe skuqje të lëkurës
PS)D

Pyetja 221 V)1

Në trajtimin e shokut anafilaktik përdoret :

A) Lidokaina
B) Kofeina
C) Amoxicilina
D) Adrenalina
PS)D

Pyetja 222 V)1

Përqëndrimi më i përdorshëm i anestetikëve lokale në kirurgjinë OMF është :

- A) 12%
 - B) 5%
 - C) 2%
 - D) 0.55%
- PS)C

Pyetja 223 V)1

Anestezia e nervit alveolar inferior aplikohet në ndërhyrjet tek :

- A) Molarët e poshtëm
 - B) Kaninët e poshtëm
 - C) Molarët e sipërm
 - D) Incizivët e poshtëm
- PS)A

Pyetja 224 V)1

Perforacioni i sinusit maksilar ndodh gjatë :

- A) Heqjes së dhëmbëve frontalë
 - B) Heqjes së molarëve të sipërm
 - C) Heqjes së molarëve të poshtëm
 - D) Proceseve infeksioze të mukozës orale
- PS)B

Pyetja 225 V)1

Trajtimi i alveolitit bëhet me :

- A) Vetëm me antibiotikë
 - B) Vetëm me analgjezike
 - C) Vetëm me kyretazh
 - D) Te gjitha së bashku
- PS)D

Pyetja 226 V)1

Reimplantimi aplikohet në:

- A) Dhëmbet e traumatizuar (ekspulsio dentis)
 - B) Dhëmbet e infektuar
 - C) Dhëmbet e qumështit të rezorbuar
 - D) Dhëmbet e transpozicionuar
- PS)A

Pyetja 227 V)1

Në kirurgjinë preprotetike përfshihet :

- A) Thellimi i sulkuseve
- B) Reimplantim i dhëmbëve
- C) Transplanti kutan
- D) Asnje e vërtete

PS)A

Pyetja 228 V)1

Cila nga frakturat e mëposhtme të mandibulës mund të japë parestezi të buzës së poshtme?

- A) Kondilare
- B) Koronoide
- C) E simfizës
- D) Pre-angulare

PS)D

Pyetja 229 V)1

Shenja patognomike e një shkoputjeje cranio-faciale është:

- A) Prishja e okluzionit dentar
- B) Levizshmëri e masivitet facial
- C) Edema faciale
- D) Ekimoza subkonjunktivale

PS)B

Pyetja 230 V)1

Cilët nga dhëmbët e përmendur, më poshtë shpesh mund të jenë shkaktarë të sinuzitit maksilar odontogjen?

- A) Molarët e parë
- B) Dhëmballët e pjekurisë
- C) Premolarët e parë
- D) Kanini

PS)A

Pyetja 231 V)1

Një ulcer e mukozës bucale duhet konsideruar malinje derisa të konfirmohet nga biopsia nese:

- A) Jep dhimbje spontane
- B) Ka ngjyrë të bardhë
- C) Ka ngjyrë të verdhë

D) Ka bazë të fortë
PS)D

Pyetja 232 V)1

Cila nga shënjat e mëposhtme na orienton pa dyshim drejt diagnozës së sialolitiazës submandibulare?

A) Rrjedhje purulente nga duktus Whartoni
B) Edeme dhe dhimbje gjatë ushqyerjes
C) Edeme sub-anguar
D) Edeme dyshemesë së gojës
PS)B

Pyetja 233 V)1

Nje sinuzit maksilar kronik odontogjen është:

A) Hemorragjik
B) Unilateral
C) Bilateral
D) I trajtueshëm vetëm me medikamente
PS)B

Pyetja 234 V)1

Nje tumefaksion parotid mund të jetë:

A) Kist i sinusit cervikal
B) Neurinome e nervit vagus
C) Kalkul e duktusit Wharton
D) Adenopati
PS)D

Pyetja 235 V)1

Otagjia mund të shkaktohet nga:

A) Kist radikular nga molari i I
B) Probleme të ATM
C) Kancer i dyshemesë së gojës dhe radix lingue
D) Kista e duktusit tyro-glos
PS)C

Pyetja 236 V)1

Cila nga shenjat e mëposhtme favorizojnë origjinën odontogjene të një sinuziti maksilar?

- A) Evolucionari spontan drejt etmoidit
 - B) Skuqje e mukozës nazale
 - C) Karakteri bilateral
 - D) Karakteri unilateral
- PS)D

Pyetja 237 V)1

Parakontakti në zonën e molarëve është shenjë klinike e cilës frakturë?

- A) Paramediane
 - B) Koronoide
 - C) Zygomatike
 - D) Ramus ascendens
- PS)D

Pyetja 238 V)1

Lokalizimi më tipik i ameloblastomës është:

- A) Regioni premolar poshtë
 - B) Regioni mental
 - C) Regioni angular
 - D) Regioni frontal sipër
- PS)C

Pyetja 239 V)1

Cilat nga kistat e mëposhtme janë me origjinë dentare?

- A) Folikular
 - B) Globulo-maksilar
 - C) Aneurizmal
 - D) Kisti i Stafnes
- PS)A

Pyetja 240 V)1

Cilat nga kistat e mëposhtme kanë lidhje me kockën hyoide?

- A) I duktusit thyrogloss
 - B) Brankial
 - C) Ameloblastoma kistike
 - D) Kisti i erupsionit
- PS)A

Pyetja 241 V)1

Në cilat prej kistave të mëposhtme nuk mund të kemi të ruajtur vitalitetin e dhëmbëve?

- A) Periapikal
 - B) Lateral
 - C) Incizival
 - D) Folikular
- PS)A

Pyetja 242 V)1

Osteomieliti akut odontogjen mund të trajtohet me antibioterapi për një periudhe kohore prej:

- A) 5-7 ditore
 - B) 2 javore
 - C) 30 ditore
 - D) 6 mujore
- PS)B

Pyetja 243 V)1

Pacientët e prekur nga cila prej patologjive të mëposhtme, janë më të prirur për të zhvilluar osteomyelit të nofullave?

- A) Infarkti akut i myokardit
 - B) Alzheimer
 - C) Glomerulonefriti akut
 - D) Diabeti
- PS)D

Pyetja 244 V)1

Trepanimi i dhëmbit shërben si rrugë e mirë drenimi në rastin e abscesit:

- A) Paradental
 - B) Apikal
 - C) Subperiostal
 - D) Submukoz
- PS)B

Pyetja 245 V)1

Cili nga dhëmbët e mëposhtëm jep më shpesh absces palatinal?

- A) Incizivi central

- B) Kanini
 - C) Incizivi lateral
 - D) Premolari i dytë
- PS)C

Pyetja 246 V)1

Cili nga infeksionet e mëposhtme ka simptomatologji më të shprehur?

- A) Abscesi submukozal
 - B) Parulis
 - C) Abscesi palatinal
 - D) Celuliti bukal
- PS)D

Pyetja 247 V)2

Cila nga patologjitë e mëposhtme të gjëndrave të pështymës ka më shpesh origjinë traumatike?

- A) Adenoma
 - B) Sialolitiaza
 - C) Mukocele
 - D) Sialodohiti
- PS)C

Pyetja 248 V)1

Ne ekipin multidiscipliner te trajtimit te anomalive te nofullave nuk ben pjese :

- A) Mjeku stomatolog
 - B) Ortodonti
 - C) Kirurgu OMF
 - D) Hematologu
- PS)D

Pyetja 249 V)2

Nje ekip multidiscipliner me i gjere kerkohet ne :

- A) Anomalite dentomaksilare
 - B) Anomalite post defekteve te lindura te buzës dhe te qiellzes
 - C) Anomalite dentare
 - D) Anomalite maksilare
- PS)B

Pyetja 250 V)1

Kush nga shkaqet e mëposhtëme nuk luan rol ne shfaqjen e anomalive dento-faciale

- A) Trashigimia
- B) Problemet pre natale
- C) Hemoglobina
- D) Traumat

PS)C

Pyetja 251 V)1

Kush nga shkaqet e mëposhtëme nuk luan rol ne shfaqjen e anomalive dento-faciale

- A) Trashigimia
- B) Problemet pre natale
- C) Traumat
- D) Stina

PS)D

Pyetja 252 V)2

Kush nga faktoret e mëposhtëm nuk ndikon ne rritjen faciale

- A) Septumi nazal
- B) Sinkondroza parietale
- C) Sinkondroza sfeno-oksipitale
- D) Sinkondroza sfeno-etmoidale

PS)B

Pyetja 253 V)2

Fytyra si rregull zhvillohet duke u rritur :

- A) Poshte perpara
- B) Poshte mbrapa
- C) Duke u zgjeruar mbrapa
- D) Nga siper poshte

PS)A

Pyetja 254 V)2

Kush nga sindromat e mëposhtëm nuk shoqerohet me anomali dento-faciale :

- A) Mukrosomia hemifaciale
- B) Sindromi Treacher Collins
- C) Sindromi Costen
- D) Sindromi i fetopatise alkoolike

PS)C

Pyetja 255 V)2

Kush nga faktoret e mëposhtëm nuk ndikon ne shfaqjen e anomalive te nofullave :

- A) Pozicioni i gjuhes
- B) Pozicioni i buzeve
- C) Frymemarrja me goje
- D) Hipersalivacioni

PS)D

Pyetja 256 V)2

Kush nga faktoret e mëposhtëm nuk ndikon ne shfaqjen e anomalive te nofullave :

- A) Pozicioni i gjuhes
- B) Papilat valate te gjuhes
- C) Pozicioni i buzeve
- D) Frymemarrja me goje

PS)B

Pyetja 257 V)2

Te semuret per nje trajtim te suksesshem te anomalive te nofullave nuk kane nevojë per :

- A) Ortodonci
- B) Kirurgji
- C) Endodonti
- D) Semilogji

PS)D

Pyetja 258 V)2

Ne planin e trajtimit te anomalive te nofullave nuk përfshihet:

- A) Plani ortodontik
- B) Plani kirurgjikal
- C) Plani ortofonik
- D) Plani terapeutik

PS)C

Pyetja 259 V)2

Ne qellimin e ortodoncise pre operatore nuk përfshihet :

- A) Dekompensimi i dhëmbëve

- B) Rrjeshtimi korrekt ne harkaden dentare
 - C) Theksimi i anomalise
 - D) Zvogelimi i anomalise
- PS)D

Pyetja 260 V)2

Kush nga levizjet e mëposhtëme te maksiles nuk kryhet ne Le Fort I osteotomine:

- A) Vertikale
 - B) Rotatore
 - C) Anteroposteriore
 - D) Trekendore
- PS)D

Pyetja 261 V)1

Kush nga fazat e mëposhtëme nuk është pjese e distraksion osteogjenezes :

- A) Latenca
 - B) Konsolidimi
 - C) Rimodelimi
 - D) Autorrotullimi
- PS)D

Pyetja 262 V)2

Teknika Sarpe përdoret ne :

- A) Hiperplazi maksilare
 - B) Hypoplazi maksilare
 - C) Hiperplazi madibulare
 - D) Ankilozen e ATM
- PS)B

Pyetja 263 V)1

Kush nga keto procedura nuk përdoret ne kirurgjine estetike:

- A) Blefaroplastika
 - B) Rhytidektomi
 - C) Toksina botulinum
 - D) Lifti i uvules
- PS)D

Pyetja 264 V)1

Kush nga procedurat e mëposhtëme nuk ben pjese ne kirurgjine estetike faciale:

- A) Lifti i vetulles
- B) Restaurimi i flokeve
- C) Sinus lifti
- D) Otoplastika

PS)C

Pyetja 265 V)2

Kush nga procedurat e mëposhtëme nuk ben pjese ne kirurgjine estetike faciale:

- A) Zmadhimi faqes
- B) Zmadhimi i buzeve
- C) Zmadhimi i mjekres
- D) Zmadhimi i procesit alveolar

PS)D

Pyetja 266 V)2

Kush nga procedurat jo kirurgjikale nuk përdoret ne estetiken faciale:

- A) Toksina botulinum
- B) Poliglikocid acidi
- C) Dhjami
- D) Acidi hialuronik

PS)B

Pyetja 267 V)2

Kush nga preparatet e mëposhtëme nuk përdoret ne mbushjet e lekures:

- A) Hidroksiapatiti
- B) Polimetilmetakrilati
- C) Vaj silikon
- D) Polietilmetakrilati

PS)D

Pyetja 268 V)2

Kush nga gerryersit kimik te mëposhtëm nuk përdoret ne fytyre :

- A) Acidi salicilik
- B) Acidi glikolik
- C) Acidi trikolacetik
- D) Acidi triklorvinil

PS)D

Pyetja 269 V)2

Me mire defektet e lindura te buzes dhe te qiellzes i trajton:

- A) Nje kirurg me formim baze stomatologjik
- B) Nje kirurg me formim baze mjeksor
- C) Nje kirurg me formim baze kranial
- D) Nje kirurg me formim baze plastik

PS)A

Pyetja 270 V)2

Kush nga faktoret ambjental te mëposhtëm nuk ndikon ne shfaqjen e defekteve te lindura te buzes dhe te qiellzes:

- A) Medikamentet
- B) Hypoksia
- C) Stresi
- D) Hipereksia

PS)D

Pyetja 271 V)2

Problemet e vesheve ne femijet me defekte te lindura jane me te shprehura ne :

- A) Keiloskizin inkomplet
- B) Keilognatoskizin
- C) Uvula bifida
- D) Keilognatopalatoskizin

PS)D

Pyetja 272 V)2

Miringotomia ben drenimin e :

- A) Veshit te mesem
- B) Hundes
- C) Syrit
- D) Palatumit

PS)A

Pyetja 273 V)2

Kush nga problemet e mëposhtëme nuk është karakteristike e defekteve te lindura te buzes dhe te qiellzes :

- A) Hipernazaliteti
 - B) Hyponazaliteti
 - C) Malformimet dentare
 - D) Probleme te degjimit
- PS)B

Pyetja 274 V)2

Kush nga komponentet e mëposhtëm nuk merr pjese ne te folur:

- A) Palatum mole
 - B) Muret e faringut
 - C) Duktusi nazo lakrimal
 - D) Gjuha
- PS)C

Pyetja 275 V)2

Kush nga momentet e mëposhtëme nuk ka rendesi ne keiloplastike:

- A) Maskimi i cikatrices
 - B) Riorjentimi i muskulit orbikularis oris
 - C) Korigjimi i naresit
 - D) Riorjentimi i muskulit bukal
- PS)D

Pyetja 276 V)1

Palatoplastika është mire te realizohet me :

- A) Nje operacion
 - B) Dy operacione
 - C) Tre operacione
 - D) Kater operacione
- PS)A

Pyetja 277 V)1

Kush nga problemet e mëposhtëme nuk mbetet pas keiloplastikes:

- A) Kalimi i lengut nga goja ne hunde
 - B) Rrjedhja e sekrecioneve nazale ne goje
 - C) Defekt ne te folur
 - D) Defekt ne degjim
- PS)D

Pyetja 278 V)1

Koha me e mire per graft te procesit alveolar ne defektet e lindura te buzës dhe te qiellzës është:

- A) 2-3 vjeç
- B) 6-10 vjeç
- C) 12-14 vjeç
- D) 14-16 vjeç

PS)B

Pyetja 279 V)1

Kush nga problemet shoqeruese te mëposhtëme nuk ka rendesi ne rikonstrukcionin me graft kockor te nofullave :

- A) Moshë
- B) Gjinia
- C) Statusi psikologjik
- D) Gjendja shendetesore

PS)B

Pyetja 280 V)1

Kush nga etapat e mëposhtëme nuk ka rendesi ne suksesin e rikonstrukcionin me graft kockor te nofullave :

- A) Sigurimi i nje shtrati te mjaftueshem
- B) Imobilizimi i graftit
- C) Sigurimi i indeve nga infeksioni
- D) Përdorimi i perfuzioneve

PS)D

Pyetja 281 V)2

Kush nga klasifikimet e mëposhtëme te dhimbjes oro-faciale nuk është i vërtete:

- A) Dhimbja somatike
- B) Dhimbja neuropatike
- C) Dhimbja psikologjike
- D) Dhimbja kardiogjenike

PS)D

Pyetja 282 V)2

Kush nga simptomat e mëposhtëme nuk është pjese e neuralgjise trigeminale:

- A) Dhimbje e forte dhe e shkurter

- B) Me shumë dhimbje unilaterale
 - C) Dhimbje iriadiuese
 - D) Me shumë dhimbje bilaterale
- PS)D

Pyetja 283 V)2

Kush nga preparatet e mëposhtëme nuk përdoret në trajtimin e neuralgjise trigeminale:

- A) Tegretoli
 - B) Topamaksi
 - C) Klonopina
 - D) Fluoracili
- PS)D

Pyetja 284 V)2

Kush nga preparatet e mëposhtëme nuk përdoret në trajtimin e neuralgjise trigeminale :

- A) Amitriptilina
 - B) Imipramina
 - C) Loparamidi
 - D) Doxepina
- PS)C

Pyetja 285 V)2

Me ke nga dhimbjet e mëposhtëme nuk bëhet diagnoze diferenciale e neuralgjise trigeminale:

- A) Odontalgjia atipike
 - B) Neuralgjia post herpetike
 - C) Sindromin e djegjes së gojës
 - D) Sindromin e djegjes së membranës së timpanit
- PS)D

Pyetja 286 V)2

Kush nga shkaqet e mëposhtëme nuk akuzohet në crregullimet e ATM:

- A) Osteoartriti
 - B) Neoplasia
 - C) Infeksioni
 - D) Ozena
- PS)D

Pyetja 287 V)2

Kush nga simptomat e mëposhtëme nuk është pjese 3 crregullimeve te ATM:

- A) Kercitja
- B) Simptomi Eagle
- C) Kufizim i hapjes se gojes
- D) Malokluzioni

PS)B

Pyetja 288 V)2

Kush nga egzaminimet e mëposhtëme nuk ndihmon ne egzaminimin e ATM:

- A) Artrografia me lende kontraste
- B) IRM
- C) Iridium 192
- D) CT

PS)C

Pyetja 289 V)2

Ne rezonance magnetike mund te percaktohet:

- A) Zhvendosje anteriore e diskut me reduktim
- B) Zhvendosja anteriore e kapsules me reduktim
- C) Zhvendosje anteriore e kapsules pa reduktim
- D) Zhvendosje posterior e osteofiteve

PS)A

Pyetja 290 V)2

Ne rezonance magnetike mund te percaktohet:

- A) Zhvendosja anteriore e kapsules me reduktim
- B) Zhvendosje anteriore e kapsules pa reduktim
- C) Zhvendosje posterior e osteofiteve
- D) Zhvendosje anteriore e diskut pa reduktim

PS)D

Pyetja 291 V)1

Osteoartroza shoqerohet me :

- A) Demtime te medha te diskut
- B) Luksacion te ATM
- C) Kontuzion te ATM
- D) Dislokim te ATM

PS)A

Pyetja 292 V)1

Osteofitet janë karakteristike e :

- A) Luksacionit të ATM
- B) Osteoartrozës
- C) Luksacionit diskal
- D) Luksacionit ligamentar

PS)B

Pyetja 293 V)2

Kush nga shkaqet e mëposhtëme nuk akuzohet në shkaktimin e osteoartrozës

- A) Hipoksia
- B) Infiamacioni neurogjenik
- C) Trauma direkte mekanike
- D) Hipereksia

PS)D

Pyetja 294 V)1

Cilët nga solucionet e mëposhtëme përdoret gjatë përgatitjes së kockës për vendosjen e implantit dentar.

- A) sol. ujë i distiluar
- B) sol. Salinë 0,90%
- C) sol. Peroksid hidrogjeni 3%
- D) sol. Salinë 0.70%

PS)B

Pyetja 295 V)1

Shërimi i plagës pas ekstraksionit të dhëmbit bëhet:

- A) per primum
- B) per secundum
- C) per tercium
- D) B dhe C

PS)B

Pyetja 296 V)2

Angina Ludwig e qafës është një formë:

- A) abcesi

- B) celuliti
 - C) malformacioni
 - D) sindromi
- PS)B

Pyetja 297 V)1

Menaxhimi i hemoragjisë pas ekstraksionit nuk arrihet me anë të:

- A) komprimimit
 - B) suturimit
 - C) antibiotiko terapisë
 - D) adimistrimit të vitaminës K
- PS)C

Pyetja 298 V)1

Cilat nga materialet e mëposhtëme është më efektive për mbushjen retrograde gjatë rezeksioneve apikale:

- A) MTA
 - B) amalgam
 - C) cement glasionomerë
 - D) kompozit
- PS)A

Pyetja 299 V)2

Përdorimi i kortikosteroidëve perioperativë në kirurgjinë orale dhe maxillo faciale ndihmon në:

- A) reduktimin e dhimbjes
 - B) reduktimin e hemoragjisë
 - C) reduktimin e infeksionit
 - D) reduktimin e edemës
- PS)D

Pyetja 300 V)2

Nëse dy prinderit janë normal dhe kanë një femijë me difekt të lindur te buzës cila është mundësia që dhe fëmija tjetër pasardhës te ketë këtë defekt:

- A) 25%
 - B) 12,5%
 - C) 4,5%
 - D) 50%
- PS)C

Pyetja 301 V)1

Cila nga këto alternativa nuk është indikacion për heqjen e një dhembit të impaktuar:

- A) perikoronarit
- B) dëshira e pacientit
- C) arsye ortodontike
- D) kist folikularë

PS)B

Pyetja 302 V)2

Simptomat si kserostomi, kseroftalmi dhe poliartrit janë manifestime të:

- A) sindromit Sjogren
- B) sindromit Frey
- C) sindromit Eagle
- D) sindromit Maffucci

PS)A

Pyetja 303 V)2

Cila nga këto preparate nuk përdoret në menazhimi të reaksionit alergjik me shenja të menjëhershme :

- A) benadryl
- B) epinefrinë
- C) klorfeniraminë
- D) baktrimë

PS)D

Pyetja 304 V)1

Përcaktimi i dozës maksimale të anestetikut lokal që do t'i jepet një pacienti varet nga:

- A) mosha
- B) seksi
- C) pesha trupore
- D) profesioni

PS)C

Pyetja 305 V)1

Diagnoza klinike për sialolitiazën nuk përcaktohet nga:

- A) biopsi aspirative

- B) sialoendoskopi
 - C) echo
 - D) sialografi
- PS)A

Pyetja 306 V)1

Mukocela është:

- A) kist i nofullave
 - B) kist i gjëndrave aksesore të peshtymës
 - C) tumor
 - D) malformacion
- PS)B

Pyetja 307 V)2

Cili nga tumoret e gjëndrave të pështymës është më malinj:

- A) karcinoma epidermoide
 - B) karcinoma adenoide kistike
 - C) tumori Warthin
 - D) adenoma pleomorfe
- PS)A

Pyetja 308 V)1

Ndërhyrja kirurgjikale për korigjimin e palatumit në pacientet me defekte të qiellzes bëhet:

- A) menjëherë pas lindjes
 - B) 3muajsh
 - C) 3-6muajsh
 - D) 12 -18 muajsh
- PS)D

Pyetja 309 V)2

Histocitoza X njihet ndryshe si:

- A) granuloma eozinofile
 - B) kerubizem
 - C) lupus eritematoz
 - D) herpes simpleks
- PS)A

Pyetja 310 V)1

Cila nga gjëndjet e mëposhtëme është gjendje prekanceroze:

- A) limfangioma
- B) teratoma
- C) fibroma
- D) liken-ruber-planus

PS)D

Pyetja 311 V)1

Le Fort II përdoret për të klasifikuar një frakturë në :

- A) katin e mesëm të fytyrës
- B) mandibulë
- C) katin e poshtëm të fytyrës
- D) klavikul

PS)A

Pyetja 312 V)1

Cila nga larjet e duarve të kirurgut nuk është e sakte:

- A) larja sociale
- B) larja aseptike
- C) larja kirurgjikale
- D) larja septike

PS)D

Pyetja 313 V)2

Cila nga alternativat e mëposhteme është një komplikacion pas ekstraksionit:

- A) fraktura e tuberit maxillar
- B) futja e rrenjës në sinus
- C) ekimozis
- D) emfizema subkutane ose submukozale

PS)C

Pyetja 314 V)1

Cili nga keto lloj abscese mund të kompromentoj rruget e frymëmarrjes:

- A) sublingual
- B) temporal
- C) bukal
- D) i foses canine

PS)A

Pyetja 315 V)1

Ne cilen nga llojet e anestezive të mëposhtëme mund te demtohet bulbus oculi:

- A) anestezinë mandibulare
- B) anestezinë incizivale
- C) anestezinë tuberale
- D) anestezinë infraorbitale

PS)D

Pyetja 316 V)1

Anestezia Bershe dhe Dubov është një teknikë:

- A) ekstraorale
- B) intraorale
- C) infiltrative
- D) intraligamentare

PS)A

Pyetja 317 V)1

Duktus Warton është kanal i gjëndrës :

- A) parotis
- B) submandibular
- C) sublinguale
- D) asnjeres

PS)B

Pyetja 318 V)1

Cili nga këto nerva nuk anestezohet nëpërmejt teknikes Gow-Gates:

- A) nervi mylohyoid
- B) nervi bukal
- C) nervi alveolar inferior
- D) nervi alveolar superior

PS)D

Pyetja 319 V)1

Komplikacion hemodinamik i anestezisë lokale është:

- A) hipersensibiliteti nga anestetiku
- B) lipotimi dhe sinkop

- C) intoksikacion
 - D) ankthi
- PS)B

Pyetja 320 V)1

Cili nga këto mikrobe është shkaktari kryesor i infeksioneve odontogjene:

- A) streptokoku
 - B) stafilokoku
 - C) fusobakterium
 - D) pneumokoku
- PS)A

Pyetja 321 V)2

Ne cilën fazë të inflamacionit aplikohet mjekimi kirurgjikal sipas parimit "Ubi pus ibi evacua":

- A) fazën seroze
 - B) fazën qelizore
 - C) fazën reparative
 - D) AdheC
- PS)B

Pyetja 322 V)1

Cila format e mëposhteme të infeksionit karakterizohet nga kufinj te qartë:

- A) celuliti
 - B) flegmoni
 - C) abcesi
 - D) AdheB
- PS)C

Pyetja 323 V)1

Abcesi zigomatik nuk shkaktohet nga:

- A) infeksioni i molarëve maksilar
 - B) osteomieliti i kockës zigomatike
 - C) trauma ne rregjionin zigomatik
 - D) infeksioni i gjendrës sublinguale
- PS)D

Pyetja 324 V)1

Zona më e favorshme për vendosjen e implanteve dentare është:

- A) zona posteriore e maxillës
 - B) zona midis dy forameve mentale
 - C) zona e tuber maxille
 - D) zona distale e mandibulës pa dhëmbë
- PS)B

Pyetja 325 V)2

Cila nga fistulat e meposhtëme quhet fistul jopatologjike:

- A) fistula pas cheilo palatoplastikës
 - B) fistula pas ekstraksionit
 - C) trakeostomia
 - D) fistula pas diseksionit të qafës
- PS)C

Pyetja 326 V)1

Infeksion nekrotiko purulent i shumë folikuj qimesh dhe gjendrave yndyrore quhet:

- A) karbunkuli
 - B) forunkuli
 - C) limfadenit
 - D) aktinomykoz
- PS)A

Pyetja 327 V)1

Cili nga densitetet e meposhtëme kockore është më i favorshëm për vendosjen e implantit dentar:

- A) D1
 - B) D2
 - C) D3
 - D) D4
- PS)A

Pyetja 328 V)1

Cila nga anestezitë e mëposhtëme nuk është anestezia rregjionale:

- A) anestezia palatinale
 - B) anestezia intraligamentare
 - C) anestezia mandibulare
 - D) anestezia tubulare
- PS)B

Pyetja 329 V)2

Arsye për insuksesin e anestezisë lokale nuk është:

- A) sol anestetikë
- B) pacienti
- C) teknika
- D) përqendrimi i adrenalines

PS)D

Pyetja 330 V)1

Shkaku kryesor i submaksilitit është:

- A) periodontiti i molareve
- B) perikoronariti
- C) kalkula salivare
- D) periodontiti i premolareve

PS)C

Pyetja 331 V)1

Ateroma është:

- A) kist i gjëndrrave sebace
- B) kist epidermal
- C) kist dermoid
- D) kist i xhepave brakial

PS)A

Pyetja 332 V)1

Cila nga këto gjendje prekanceroze paraqet rrishtun më të lartë për malinjizim:

- A) leukoplaki
- B) liken-ruber-planus
- C) eritroplaki
- D) kandidoze kronike hiperplazike

PS)C

Pyetja 333 V)1

Cila nga llojet e osteotomive të mëposhtëme nuk ben modifikim te raporteve okluzale:

- A) Le Fort I
- B) Le Fort II

- C) Le Fort III
 - D) Genioplastika
- PS)D

Pyetja 334 V)1

Cila nga anestezitë regjionale përdoret për ekstraksionin e premolarit të parë maksillarë të djathtë:

- A) anestezia tuburale
 - B) anestezia incizivale
 - C) anestezia infraorbitale
 - D) anestezia mentale
- PS)C

Pyetja 335 V)2

Cila nga llojet e kirurgjive të mëposhtëme nuk është kirurgji preprotetike:

- A) alveolo-plastika
 - B) korigjimi i ekzostozave
 - C) korigjimi i toruseve
 - D) genioplastika
- PS)D

Pyetja 336 V)1

Liken -ruber- planus është:

- A) gjendje prekanceroze
 - B) malformacion vaskulare
 - C) tumor kockor
 - D) anomali nofullash
- PS)A

Pyetja 337 V)2

Ne cilin nga këto syndrome të mëposhtëme pacientet kanë vështirësi në frymemarrje që në lindje:

- A) sindromi Eagle
 - B) sindromi Sjogren
 - C) sindroma Pierre-Robin
 - D) sindromi Kosten
- PS)C

Pyetja 338 V)1

Karcinomat janë tumore malinje me origjinë:

- A) epiteliale
- B) indë kockore
- C) indë kërçor
- D) indë lidhor

PS)A

Pyetja 339 V)1

Në cilin nga rastet e mëposhtëme kemi të bëjmë me një kundërrindikacion absolut për vendosjen e implantit dentarë:

- A) të sëmurë me insuficiençe renale
- B) pacientë me sëmundje periodontale
- C) pacientë pa dhëmbë
- D) përdorues duhani

PS)A

Pyetja 340 V)1

Sindromi aurikulo-temporal njihet ndryshe si:

- A) sindromi Frey
- B) sindromi Maffucci
- C) sindromi Kosten
- D) sindromi Apert

PS)A

Pyetja 341 V)2

Cila nga patologjitë e mëposhtëme nuk është një patologji inflamatorë e A.T.M.-së:

- A) osteoartroza primare
- B) artriti reumatoid
- C) artriti reumatoid juvenil
- D) spondiliti ankilozant

PS)A

Pyetja 342 V)2

Kur një dhëmb ka indikacion për heqje:

- A) ndodhet në vijën e fractures
- B) pacienti ka dëshirë që ta heqë
- C) është i kariuar

D) ka frakturë të apeksit
PS)A

Pyetja 343 V)1

Pas sa kohësh vëhet re në radiografi formimi i kockës së re në alveolën pas ekstraksionit.

A) 6-8 javë
B) pas 2 javësh
C) pas 1 muaj
D) pas 10 ditësh
PS)A

Pyetja 344 V)2

Një tumor i klasifikuar si T2N1M0 përfshin:

A) Lezion 1-3cm pa infiltrim në thellesi, një limfonodul të lëvizshëm pa metastazë në distance.
B) Lezion më 4cm, një limfonodul të palpueshëm dhe me metastazë në distance
C) Lezion me pak se 1cm, pa limfonodulë dhe pa metastazë në distance
D) Lezion më 3cm i infiltruar, me limfonodulë bilateral të lëvizshëm dhe pa metastazë në distance
PS)A

Pyetja 345 V)1

Roli i adrenalines në solucionin anestetik:

A) vazokonstriktor
B) vasodilatator
C) hollues
D) ul kohën e qëndrimit të anestetikut në inde
PS)A

Pyetja 346 V)2

Nëse një pacient me indikacion për ekstraksion dentar referon për alergji nga lidokaina si vepërohet:

A) nuk kryhet interveni
B) administrohet tetrakaina
C) administrohet mepivakaina
D) administrohet lidokainë pa adrenalinë
PS)B

Pyetja 347 V)2

Nese nje ampule 2% sol lidokaine pa adrenaline permban 40mg lidokaine te paster,sa është numri maksimal i ampulave qe mund ti administrohet nje njeriu me peshe 80 kg kur doza maksimale e lejuar e anestetikut është 5mg/kg peshe.

- A) 5 ampula
- B) 7ampula
- C) 10 ampula
- D) 12ampula

PS)C

Pyetja 348 V)1

Cila nga anesteziat e mëposhtëme nuk kap nervin lingual:

- A) anestezia mandibulare
- B) anestezia Gow Gates
- C) anestezia mandibulare ekstraorale
- D) anestezia mentale

PS)D

Pyetja 349 V)2

Nje pacienti qe referon per nje angine pectoris te qendrueshme pas konsultes me kardiologun nuk duhet ti jepet:

- A) anestetike locale me adrenaline mbi 1:100000
- B) nitroglicerine
- C) anksiolitike
- D) O₂

PS)A

Pyetja 350 V)1

Sialodohiti është nje:

- A) semundje infective virale
- B) inflamacion i duktusit te gjendres se peshtymes me karakter kronik
- C) kalcinoz salivare
- D) asnjera

PS)B

Pyetja 351 V)1

Cila nga patologjitë e mëposhtëme nuk vjen si pasoje e nje traumë te ATMse:

- A) kontuzioni
 - B) luksacioni
 - C) artriti reumatoid
 - D) ankiloza
- PS)C

Pyetja 352 V)1

Cila nga keto sindroma shoqerohet me afte recidivante ne goje:

- A) Sindromi Apert
 - B) Sindromi Sjogren
 - C) Sindromi Kosten
 - D) Sindromi Behcet
- PS)D

Pyetja 353 V)1

Sindromi Maffuci karakterizohet nga:

- A) hemangioma kavernoze ne koke dhe qafe
 - B) zgjatje e procesit stiloid
 - C) hiperhidroze
 - D) kserostomi
- PS)A

Pyetja 354 V)1

Shkaku kryesor i submaksilitit është:

- A) Periodontiti i molareve
 - B) Perikoronariti
 - C) Kalkula salivare
 - D) Periodontit i premolarëve
- PS)C

Pyetja 355 V)2

Sialoadenitet kronike prekin më shpesh:

- A) Gjëndrën submandibulare
 - B) Gjëndrën parotis
 - C) Gjëndrën sublinguale
 - D) Gjëndrat aksesore
- PS)B

Pyetja 356 V)2

Kush nga patologjitë e mëposhtme mund të ketë krepitacion në prekje:

- A) Mukocelja
- B) Ranula
- C) Kistat e nofullave
- D) Kista koli media

PS)C

Pyetja 357 V)1

Hemangioma intrakockore mund të trajtohet me:

- A) Ro-terapi
- B) Vitamino-terapi
- C) Jod-lipol
- D) Lipoidol

PS)A

Pyetja 358 V)3

T1N1M0 sipas sistemit TNM përfshin:

- A) Stadin e parë
- B) Stadin e dytë
- C) Stadin e tretë
- D) Stadin e katërt

PS)C

Pyetja 359 V)3

T2N2M0 sipas sistemit TNM përfshin:

- A) Stadin e parë
- B) Stadin e dytë
- C) Stadin e tretë
- D) Stadin e katërt

PS)D

Pyetja 360 V)3

Sarkomat e nofullave metastazojnë më shumë:

- A) Me rrugë limfatike
- B) Me rrugë hematogjene
- C) Perkontinuitatem
- D) Nëpërmjet lëngut cerebrospinal

PS)B

Pyetja 361 V)3

Në luksacionin unilateral të ATM nofulla spostohet:

- A) Në anën e shëndoshë
- B) Në anën e semurë
- C) Në drejtim medial
- D) Në drejtim lateral

PS)A

Pyetja 362 V)3

Ombredami jep klasifikim të frakturave në:

- A) Mandibul
- B) Os frontale
- C) Maksilë
- D) Os temporal

PS)C

Pyetja 363 V)2

Vulnus Combustum është plagë nga :

- A) Traumat
- B) Armët e zjarrit
- C) Djegia
- D) Kafshimi nga gjarpëri

PS)C

Pyetja 364 V)2

Vulnus Sclopetarum është plagë nga:

- A) Armët e zjarrit
- B) Kafshimi nga qeni
- C) Djegia
- D) Jatrogjene

PS)A

Pyetja 365 V)3

Tesuto-terapia përdoret në mjekimin e:

- A) Proceseve infeksioze

- B) Dhimbjeve neuralgjike
 - C) Traumave
 - D) Trajtimin e kalkulave salivare
- PS)B

Pyetja 366 V)2

Kalkulat salivare duken në Ro"grafi kur janë:

- A) Rontgenotransparent
 - B) Rontgenopak
 - C) Radiologjik
 - D) Imazherik
- PS)B

Pyetja 367 V)3

Cistadenolimfoma prek më shumë:

- A) Gjëdrën e pështymës submandibulare
 - B) Gjëdrën e pështymës sublinguale
 - C) Gjëndrat aksesore të pështymës
 - D) Gjëdrën parotis
- PS)D

Pyetja 368 V)2

Sarkoidoza është një sëmundje:

- A) Sistemike
 - B) Traumatike
 - C) Tumorable
 - D) E zhvillimit
- PS)A

Pyetja 369 V)3

Kush nga shkaqet e mëposhtëme nuk akuzohet për shkaktimin e ankilozes intrakapsulare :

- A) Cikatricat
 - B) Histeria
 - C) Traumat
 - D) Infeksioni
- PS)B

Pyetja 370 V)3

Kush nga shkaqet e mëposhtëme nuk akuzohet për ankilozen ekstrakapsulare:

- A) Hiperplazia e procesit koronoid
- B) Trauma e harkut zygomatik
- C) Infeksionet përreth muskulit temporal
- D) Infeksionet përreth muskulit SCM

PS)D

Pyetja 371 V)3

Artrocenteza ka të bëjë me :

- A) Lavazhin e ATM
- B) Prerjen e diskut
- C) Prerjen e kapsulës
- D) Të gjitha sëbashku

PS)A

Pyetja 372 V)2

Artroskopia realizohet me :

- A) Solucion fiziologjik
- B) Lende kontraste
- C) Teknecium 99
- D) Iridium 192

PS)A

Pyetja 373 V)2

Distraksion osteogjeneza përdoret në :

- A) Kyçet e shkurtera
- B) Kyçet e gjata
- C) Kyçet e gjera
- D) Kyçet e ngushta

PS)A

Pyetja 374 V)2

Kush nga egzaminimet e mëposhtëme nuk përfshihet në vlerësimin pre-operator të semurit:

- A) Egzaminimi fizik
- B) Vlerësimi i hemoragjise
- C) Konsulta pre-anestetike
- D) Egzaminimi i gjakut

PS)B

Pyetja 375 V)2

Pergjegjes per dhenien e anestezeise gjenerale është :

- A) Anestetisti
 - B) Anesteziologjisiti
 - C) Estetisti
 - D) Ndhimes anestezisti
- PS)B

Pyetja 376 V)2

Kush nga detyrat e mëposhtëme te asistentit nuk ka rendesi :

- A) Njohja e teknikes operatore
 - B) Te ndihmoje primarin
 - C) Te aspiroje
 - D) Te inspiroje
- PS)D

Pyetja 377 V)2

Kateter urinar ne operacionet OMF vendoset kur operacioni zgjat me shumë se :

- A) 4 ore
 - B) 3 ore
 - C) 2 ore
 - D) 1 ore
- PS)A

Pyetja 378 V)2

Pozicioni me i pershtatshem ne operacionet OMF është :

- A) Supine
 - B) Suprine
 - C) Cervikal
 - D) Abdomine
- PS)A

Pyetja 379 V)2

Vendosja e tokezimit te pacientit është e nevojshme kur përdoret

- A) Frezimi i kockes

- B) Sharrimi i kockes
 - C) Elektrobisturia
 - D) Matja e presionit arterial
- PS)C

Pyetja 380 V)2

Per te mbrojtur syte gjate operacionit perdoret:

- A) Hapja e syve
 - B) Mbyllja e syve
 - C) Pluhur jodoformi
 - D) Alkool 70 grade
- PS)B

Pyetja 381 V)2

Kush nga pergjegjesite e mëposhtëme post operatore nuk ka vlere:

- A) Porosite per pacientin
 - B) Porosite per familjaret
 - C) Porosite per mjekun e familjes
 - D) Porosite per gjumin
- PS)D

Pyetja 382 V)2

Problem me shumë per rruget ajrore kane pacientet e mëposhtëm me :

- A) Angine Ludwig
 - B) Angine pektoris
 - C) Angine dentare
 - D) Angine tonsilare
- PS)A

Pyetja 383 V)2

Shkak i te vjellave post operatore nuk është :

- A) Përdorimi i disa drogave
 - B) Kalimi i ajrit ne stomak
 - C) Kalimi i gjakut ne stomak
 - D) Kalimi i gjakut mushkuri
- PS)D

Pyetja 384 V)2

Per trajtimin e te vjellave post operatore jepen medikamentet e mëposhtëm:

- A) Antitumorale
- B) Antiemetike
- C) Antihelmetik
- D) Antidepressant

PS)B

Pyetja 385 V)2

Kur pacienti është me fiksion bimaxilar pas anestezisë gjenerale në gadishmeri tek koka lihet një:

- A) Portage
- B) Osteotomi
- C) Gershere teli
- D) Gershere suturash

PS)C

Pyetja 386 V)2

Ngritje e temperaturës konsiderohen shifrat e mëposhtëme:

- A) 37 gradë Celsius
- B) 37.2 gradë Celsius
- C) 38 gradë Celsius
- D) 38.5 gradë Celsius

PS)B

Pyetja 387 V)2

Temperatura 2-3 ditë pas operacionit nuk vjen nga:

- A) Infektimi i plagës
- B) Koleksioni i pusit
- C) Lëkurë e skuqur nga vigoni
- D) Marrja e shumë perfuzioneve

PS)D

Pyetja 388 V)2

Atelektaza shkaktohet nga :

- A) Mosmbushja mirë e mushkurisë
- B) Mosmbushja mirë e zemrës
- C) Mosmbushja mirë e shtratisë vazal
- D) Moseliminimi i mirë nga veshkat

PS)A

Pyetja 389 V)2

Lengjet pas operacionit nuk mund te ulen nga :

- A) Vjellja
- B) Urinimi
- C) Presioni arterial
- D) Frymemarrja

PS)C

Pyetja 390 V)2

Kush nga elementet e mëposhtëm nuk është pjese perberese e solucionit Ringer:

- A) Na
- B) Cl
- C) Fl
- D) K

PS)C

Pyetja 391 V)2

Kush nga lendet e mëposhtëme nuk është komponent i gjakut:

- A) Eritropoetina
- B) Platelet
- C) Plazem
- D) Mase eritrocitare

PS)A

Pyetja 392 V)2

Kush është me i përdorshem sot per transfusion gjaku:

- A) Transfuzioni i gjakut
- B) Autotransfuzioni i gjakut
- C) Homotransfuzioni i gjakut
- D) Heterotransfuzioni i gjakut

PS)B

Pyetja 393 V)2

Nje pacient e toleron mire humbjen akute te gjakut kur hematokriti është ne shifrat:

- A) 25-30%

- B) 20-25%
 - C) 15-20 %
 - D) 13-15%
- PS)A

Pyetja 394 V)2

Anestezia gjenerale ka egzistuar:

- A) Pas anestezise lokale
 - B) Ne te njejten kohe me anestezine lokale
 - C) Para anestezise lokale
 - D) 5 vjet pas anestezise lokale
- PS)C

Pyetja 395 V)2

Shiringa me fishek qelqi është shpikur ne vitin :

- A) 1940
 - B) 1947
 - C) 1955
 - D) 1960
- PS)B

Pyetja 396 V)2

Kush nga aget e mëposhtëme nuk përdoret ne kirurgjine orale:

- A) I' e rrethit
 - B) " e rrethit
 - C) L' e rrethit
 - D) E drejte
- PS)D

Pyetja 397 V)2

Kush nga suturat e mëposhtëme nuk është absorbable:

- A) Vikryl
 - B) Dekson
 - C) Ketgud
 - D) Silk
- PS)D

Pyetja 398 V)2

Kush nga materialet e mëposhtëme është rezorbabel:

- A) Najlon
 - B) Koton
 - C) Poliester
 - D) Kolagen
- PS)D

Pyetja 399 V)2

Agia me portage kapet ne :

- A) Fund te saj
 - B) L' e fundit
 - C) Ne mes
 - D) Afer majes
- PS)B

Pyetja 400 V)2

Cpimi i ages me siperfaqen indore duhet te jete :

- A) Oblik
 - B) Perpendikular
 - C) 45 grade
 - D) Longitudinal
- PS)B

Pyetja 401 V)2

Agia ne lembot intraorale ne fillim kalohet :

- A) Ne pjesen e lire te lembos
 - B) Ne pjesen fikse te lembos
 - C) Ne maje te lembos
 - D) Ne fund te lembos
- PS)A

Pyetja 402 V)2

Nyja e sutures duhet te vendoset:

- A) Ne mes te linjes se incizionit
 - B) Anash linjes se incizionit
 - C) Ne maje te linjes se incizionit
 - D) Ne fund te linjes se incizionit
- PS)B

Pyetja 403 V)2

Normalisht suturat e nderprera duhet vendosen larg njera tjetres ne distancen:

- A) 6-7 mm
- B) 3-4 mm
- C) 1-2 mm
- D) Mbi 7 mm

PS)B

Pyetja 404 V)2

Kush nga format e lembove intraorale te mëposhtëme nuk egziston:

- A) Lembo zarf
- B) Lembo trekendesh
- C) Lembo trapez
- D) Lembo drejtkendesh

PS)D

Pyetja 405 V)2

Incizioni nuk duhet bere ne :

- A) Qender te papiles intedentare
- B) Ligamentin cirkular
- C) 3-4 mm larg ligamentit cirkular
- D) 4-5 mm larg kavitetit kockor

PS)A

Pyetja 406 V)2

Kush nga suturat e mëposhtëme është e saktë:

- A) Suture dyshek vertikal
- B) Suture dyshek oblik
- C) Suture dyshek longitudinal
- D) Suture dyshek rotative

PS)A

Pyetja 407 V)2

Kush nga renditjet e mëposhtëme nuk është e vërtete per dhëmbët e impaktuar

- A) Molari i trete mandibular
- B) Kaninet maksilar

- C) Molaret e trete maksilare
 - D) Premolaret mandibular
- PS)D

Pyetja 408 V)2

Kush nga shkaqet e mëposhtëme te impaksionit nuk është i vërtetë:

- A) Pozicioni jo i rregullt i dhembit
 - B) Densiteti i kockes
 - C) Persistenca e dhëmbëve te qumeshtit
 - D) Tonsiliti kronik
- PS)D

Pyetja 409 V)2

Kush nga shkaqet e mëposhtëme nuk është i vërtetë në impaksionin dentar:

- A) Progeria
 - B) Defekti i qiellzes
 - C) Oksycefalia
 - D) Porfiria
- PS)D

Pyetja 410 V)2

Kush nga klasifikimet e mëposhtëme te frakturave nuk egziston :

- A) Frakturë e thjeshtë
 - B) Frakturë e përbërë
 - C) Frakturë patologjike
 - D) Frakturë fiziologjike
- PS)D

Pyetja 411 V)2

Ekimoza në anën bucale apo linguale tregon për :

- A) Frakturë te ramus horizontalis mandibule
 - B) Frakturë te vijës mediane
 - C) Frakturë angulare
 - D) Frakturë post angulare
- PS)A

Pyetja 412 V)2

Kush nga teknikat e mëposhtëme nuk është pjesë e mjekimit ortopedik:

- A) Fiksim sipas IVI
 - B) Fiksim Limberg
 - C) Shina me ose pa grepa
 - D) Shtifte
- PS)D

Pyetja 413 V)2

Kush nga teknikat e mëposhtëme nuk është pjese e mjekimit kirurgjikal:

- A) Osteosinteza me minipllaka
 - B) Osteosinteza me tel
 - C) Shtifte
 - D) Fiksimi sipas Limberg
- PS)D

Pyetja 414 V)2

Kush nga pllakat e mëposhtëme nuk përdoret për mjekim kirurgjikal të frakturave të nofullave :

- A) Kompresive
 - B) Minipllaka
 - C) Mikropllaka
 - D) Odontojatrike
- PS)D

Pyetja 415 V)2

Kush nga shenjat e mëposhtëme për frakturën unilaterale kondiliene nuk është e vërtete:

- A) Edeme përreth ATM
 - B) Dhimbje në ATM
 - C) Otagji
 - D) Otore
- PS)D

Pyetja 416 V)2

Shenja e Batles është karakteristike për :

- A) Frakturën e bazës së kafkës
 - B) Frakturën e ramus horizontalis mandibule
 - C) Frakturën Le Fort I
 - D) Frakturën e palatumit
- PS)A

Pyetja 417 V)2

Trajtimi konservativ i frakturave te nofullave nuk përfshin:

- A) Mbajtjen ne observacion
 - B) Diete te lengshme
 - C) Fiksim intermaksilar per nje periudhe te shkurter
 - D) Aplikimin e gjilperes Kirshner
- PS)D

Pyetja 418 V)2

Kush nga incizionet e mëposhtëme nuk përdoret ne mjekimin kirurgjikal te traumave OMF:

- A) Pre aurikular
 - B) Submandibular
 - C) Bikoronal
 - D) Bukal
- PS)D

Pyetja 419 V)2

Frakturat e kockes zygomatike nuk kane nevojë per trajtim:

- A) Kur thyhet nje proces
 - B) Kur thyhen dy procese
 - C) Kur thyhen tre procese
 - D) Kur thyhen 4 procese
- PS)A

Pyetja 420 V)2

Cngjyrimi i dhëmbëve ne trauma eshte shenje e :

- A) Traumes dento-alveolare
 - B) Frakturese se ramus ascendent mandibule
 - C) Frakturese se procesit articular mandibular
 - D) Frakturese se procesit koronoid
- PS)A

Pyetja 421 V)1

Kush nga opsionet e meposhteme nuk qendron per Trizmusin :

- A) Eshte me origjine infeksioze
- B) Eshte me origjine kardiogjenike
- C) Eshte me origjine traumatike

D) Eshte me origjine centrale
PS)B

Pyetja 422 V)3

Sindroma auto-mutrante per ulcerat oro-faciale eshte karakteristike e nje te semuri:

A) Nervor
B) Azmatik
C) Neuropsiqik
D) Me reumatizem
PS)C

Pyetja 423 V)2

Në kafshimin e hapur jo skeletik nuk ndikon:

A) Thithja e gishtit
B) Kafshimi i gjuhës
C) Adenoidet
D) Nxjerrja përpara e gjuhës
PS)C

Pyetja 424 V)1

Kush nga pohimet e mëposhtëme është i vertetë për distraksion osteogjenezën:

A) Zgjerohet vetëm kocka
B) Zgjerohet kocka dhe indet e buta
C) Zgjerohen vetëm indet e buta
D) Zgjerohen muskujt përtypës të vërtetë
PS)B

Pyetja 425 V)1

Kush nga funksionet e mëposhëme të sistemit mastikator nuk qëndron :

A) Nuhatja
B) Përtypja
C) Të folurit
D) Gëlltitja
PS)A

Pyetja 426 V)1

Kush nga formacionet e mëposhtëme nuk merr pjesë në sistemin mastikator:

- A) Kocka
 - B) Ligamentet
 - C) Dhëmbët
 - D) Lëkura
- PS)D

Pyetja 427 V)1

Kush nga shkaqet e mëposhtëme të asimetrisë faciale nuk konsiderohet shkak lokal:

- A) Traumat
 - B) Veset
 - C) Mikrosomia hemifaciale
 - D) Dëmtimi i zonave të rritjes
- PS)C

Pyetja 428 V)2

Asimetria faciale bëhet më e shprehur kur :

- A) Pacienti qan
 - B) Pacienti qesh
 - C) Pacienti mbyll dhëmbët
 - D) Pacienti hap gojën
- PS)B

Pyetja 429 V)2

Për vendosjen e diagnozës së hiperplazisë kondilare mandibulare nuk na ndihmon :

- A) CT 3D
 - B) Shintigrafia
 - C) Iridium 192
 - D) Histopatologjia
- PS)C

Pyetja 430 V)3

Kush nga egzaminimet e mëposhtme në OMF përdor lëndë kontraste:

- A) Sialografia
 - B) Fistulografia
 - C) Artrografia
 - D) Shintigrafia
- PS)D

Pyetja 431 V)1

Kocka nuk mund të pritët me :

- A) Frezë
 - B) Trefin
 - C) Piezo surgery
 - D) Elektro surgery
- PS)D

Pyetja 432 V)2

Kush nga procedurat e Bone graftit nuk është e vërtetë:

- A) Onlay
 - B) Inlay
 - C) Transpozicionale
 - D) Interpozicionale
- PS)C

Pyetja 433 V)2

Në Bone graft më i rëndësishëm për suksesin e tij është :

- A) Mbulimi me mukozë
 - B) Mbulimi me periost
 - C) Mbulimi me muskul
 - D) Mbulimi me lëkurë
- PS)B

Pyetja 434 V)3

Graftet kutane nuk përdoren në zëvendësimin e :

- A) Defekteve kutane
 - B) Defekteve mukoze
 - C) Defekteve kockore
 - D) Defekteve muko-kutane
- PS)C

Pyetja 435 V)1

Kush nga burimet e mëposhtëme për graft kutan nuk përdoret në korigjimin e defekteve faciale:

- A) Lëkura e qafës
- B) Lëkura post aurikulare

- C) Lëkura pre aurikulare
 - D) Lëkura e tabanit të këmbës
- PS)D

Pyetja 436 V)2

Biopsia qorrazi merret në regjionin e :

- A) Sinusit maksilar
 - B) Radiks lingue
 - C) Qafës
 - D) Mukozes retro molare
- PS)B

Pyetja 437 V)2

Për të vlerësuar një kancer të bazës së gjuhës më i mire është egzaminimi me :

- A) CT
 - B) IRM
 - C) EKO
 - D) FESS
- PS)B

Pyetja 438 V)2

Dega temporale e nervit facial futet:

- A) Poshtë fascies temporo faciale
 - B) Në mes të fascies temporo faciale
 - C) Sipër fascies temporo faciale
 - D) Anash fascies temporo faciale
- PS)A

Pyetja 439 V)2

Kush nga egzaminimet e mëposhtë me është më i rendësishëm në pacientët me kancer oral që konsumojnë duhan dhe alkool:

- A) Oroskopia
 - B) Rinoskopia
 - C) Panendoskopi
 - D) Otoskopi
- PS)C

Pyetja 440 V)3

Laserlitotripsia përdoret për trajtimin e :

- A) Tumoreve beninjë
- B) Tumoreve malinjë
- C) Infeksioneve
- D) Kalkulave salivare

PS)D

Pyetja 441 V)2

Hemangiomat janë tumore me origjinë nga qelizat:

- A) Epiteliale
- B) Endoteliale
- C) Muskulare
- D) Fibroze

PS)B

Pyetja 442 V)3

Për trajtimin e hemangiomave përdoret :

- A) Triamcinoloni
- B) Kinolomi
- C) Spirolakteni
- D) Amitriptilina

PS)A

Pyetja 443 V)3

Femijet e vegjël të traumatizuar kanë :

- A) Shans të pakët për dëmtim organesh
- B) Shans mesatar për dëmtim organesh
- C) Shans të madh për dëmtim organesh
- D) Nuk kanë shans për dëmtim organesh

PS)C

Pyetja 444 V)3

Femijet e vegjël kanë :

- A) Shans të madh për shok hemoragjik
- B) Shans të pakët për shok hemoragjik
- C) Shans mesatar për shok hemoragjik
- D) Nuk kanë shans për shok hemoragjik

PS)A

Pyetja 445 V)1

Në traumat abdominale duhet menduar për :

- A) Dëmtime të dukshme
- B) Dëmtime mesatarisht të dukshme
- C) Dëmtime të fshehta
- D) Dëmtime plotësisht të dukshme

PS)C

Pyetja 446 V)2

Kush nga vështirësitë e mëposhtëme për vlerësimin e urgjencës së traumës OMF nuk qëndron :

- A) Kompleksiteti i kockave faciale
- B) Edemat e mëdha të fytyrës
- C) Stafi i urgjencës
- D) Ardhja në orët e paradites e te traumatizuarit

PS)D

Pyetja 447 V)1

Kush nga komplikacionet e mëposhtëme të frakturave nuk qëndron :

- A) Malunion
- B) Nonunion
- C) Malokluzion
- D) Ortofonia

PS)D

Pyetja 448 V)1

Kush nga vaksinat e mëposhtëme nuk ka vlerë gjatë trajtimit të plagëve të regjionit OMF:

- A) Antirabike
- B) Antitetanike
- C) Anti TBC
- D) Anti hepatit B

PS)C

Pyetja 449 V)2

Kush nga egzaminimet e mëposhtëme nuk përdoret në vlerësimin e traumave te orbitës:

- A) Testi visual

- B) Testi virtual
 - C) Harta e HESS
 - D) Lëvizja okulare
- PS)B

Pyetja 450 V)3

Kirurgu OMF trajton:

- A) Dëmtimin e murit posterior të sinusit frontal
 - B) Dëmtimin e murit anterior të sinusit frontal
 - C) Dëmtimin e murit medial të sinusit frontal
 - D) Dëmtimin e murit lateral të sinusit frontal
- PS)B

Pyetja 451 V)3

Artroskopia e ATM për here të pare tek njeriu është përdorur në vitin :

- A) 1955
 - B) 1965
 - C) 1975
 - D) 1985
- PS)C

Pyetja 452 V)3

Kush nga komplikacionet e mëposhtëme të kirurgjisë së ATM nuk egziston :

- A) Paralizë faciale
 - B) Komunikim me veshin e mesëm
 - C) Verbim
 - D) Shurdhim
- PS)C

Pyetja 453 V)3

Hemoragjia e madhe gjatë kirurgjisë së ATM vjen nga :

- A) Arteria maksilare interna
 - B) Arteria alveolare inferior
 - C) Arteria faciale
 - D) Arteria temporale superficiale
- PS)A

Pyetja 454 V)1

Një cikatricë hipertrofike nuk trajtohet me :

- A) Pomadë me vitamin E
 - B) Pomadë cicatrix
 - C) Erbium YAG Laser
 - D) Pomadë tetraciklinë
- PS)D

Pyetja 455 V)2

Komplikacion potenacial intraoperator në korigjimin e defekteve bilaterale të buzës është:

- A) Frakturimi i pre maksilës
 - B) Hemoragjia nga arteria incizivale
 - C) Dëmtimi i naresit
 - D) Dëmtimi i kupidonit
- PS)A

Pyetja 456 V)3

Palatoplastika sipas Langenbeck është me:

- A) Lembo unipedunkulare
 - B) Lembo bipedunkulare
 - C) Lembo trekendeshe
 - D) Lembo rrotulluese
- PS)B

Pyetja 457 V)2

Në keiloplastikë moment i rendësishëm është:

- A) Riorjentimi i muskulit orbicularis oris
 - B) Riorjentimi i muskulit rizorius
 - C) Riorjentimi i muskulit nazal
 - D) Riorjentimi i muskulit kanin
- PS)A

Pyetja 458 V)3

Në palatoplastikë moment i rendësishëm është :

- A) Riorjentimi i muskulaturës velare
 - B) Riorjentimi i muskulit palatin major
 - C) Riorjentimi i muskulit palatin minor
 - D) Riorjentimi i muskulit glosfaringeus
- PS)A

Pyetja 459 V)1

Kush nga pohimet e mëposhtëme nuk është i vërtetënë dhënien e anestezisë gjenerale në fëmijë :

- A) Antestezist i specializuar për fëmijë
 - B) Volum i vogël trupor
 - C) Risk më të madh për hypotermi
 - D) Kirurg i specializuar vetëm për fëmijë
- PS)D

Pyetja 460 V)3

Me defekte të procesit alveolar shoqërohen :

- A) 55 % të defekteve të lindura të buzës dhe të qiellzës
 - B) 65 % të defekteve të lindura të buzës dhe të qiellzës
 - C) 75 % të defekteve të lindura të buzës dhe të qiellzës
 - D) 85 % të defekteve të lindura të buzës dhe të qiellzës
- PS)C

Pyetja 461 V)3

Grafti sekondar aplikohet në moshën :

- A) 0-3 vjeç
 - B) 3-6 vjeç
 - C) 6-13 vjeç
 - D) Pas moshës 13 vjeç
- PS)C

Pyetja 462 V)3

Kirurgjia segmentare e nofullave aplikohet kur midis rrënjëve të dhëmbëve ka hapësirë kockore:

- A) 2 mm
 - B) 3 mm
 - C) 4 mm
 - D) 5 mm
- PS)D

Pyetja 463 V)3

Trajtimi ortodontik pre operator si rregull zgjat :

- A) 6 muaj
 - B) 1 vit
 - C) 1.5 vjet
 - D) 2 vjet
- PS)B

Pyetja 464 V)3

Trajtimi ortodontik post operator si rregull zgjat :

- A) 6 muaj
 - B) 1 vit
 - C) 1.5 vjet
 - D) 2 vjet
- PS)A

Pyetja 465 V)3

Le Fort I osteotomia nuk përdoret për korrigjimin e :

- A) Hiperplazisë maksilare
 - B) Asimetrisë
 - C) Anomalisë së planit okluzal
 - D) Korrigjimin e defektit të palatumit
- PS)D

Pyetja 466 V)3

Mikrosomia hemifaciale është :

- A) Anomali shumë e rrallë
 - B) Anomali e rrallë
 - C) Anomali e shpeshtë
 - D) Anomali shumë e shpeshtë
- PS)C

Pyetja 467 V)3

Cianoza e buzëve është karakteristikë për :

- A) Sëmundjet respiratore
 - B) Sëmundjet e mëlçisë
 - C) Sëmundjet e veshkave
 - D) Sëmundjet e tëmthit
- PS)A

Pyetja 468 V)3

Hipersalivacioni nuk vjen si pasojë e :

- A) Çrregullimeve të gëlltitjes
 - B) Çrregullimeve anatomike
 - C) Çrregullimeve neuromuskulare
 - D) Çrregullimeve disfunktionale të ATM
- PS)D

Pyetja 469 V)1

Kserostomia nuk shkaktohet nga :

- A) Rrezatimi
 - B) Dehidrimi
 - C) Pilokarpina
 - D) Shkaqe psikogjene
- PS)C

Pyetja 470 V)1

Era e keqe nga goja nuk vjen nga :

- A) Pangrënia
 - B) Pirja e duhanit
 - C) Diabeti
 - D) Patologji kardiake
- PS)D

Pyetja 471 V)3

Shkaqet kryesore në crregullimin e shijes nuk janë :

- A) Diabeti
 - B) Skleroza e diseminuar
 - C) Neoplazma
 - D) Asma bronkiale
- PS)D

Pyetja 472 V)1

Pemfigoidi është një sëmundje kronike autoimmune që nuk prek :

- A) Mukozën
- B) Lëkurën
- C) Mukozën dhe lëkurën
- D) Kockën

PS)D

Pyetja 473 V)3

Rregulli i nëntave është karakteristikë për :

- A) Tumoret e gjëndrave të pështymës
- B) Tumoret e nofullave
- C) Tumoret e buzeve
- D) Tumoret e gjuhës

PS)A

Pyetja 474 V)3

IgG është :

- A) Proteinë
- B) Metallo proteine
- C) Gliko proteine
- D) Lipo proteine

PS)C

Pyetja 475 V)3

Filtrimi total glomerular ditor në litra në ditë është :

- A) 5-20
- B) 25-50
- C) 50-100
- D) Mbi 100

PS)D

Pyetja 476 V)3

Cila nga këto përbërje nuk mund të përcaktohet në gjak si shkaktar i vdekjes :

- A) Cianuri i kaliumit
- B) Kloruri i kaliumit
- C) Permanganati i kaliumit
- D) D.D.T

PS)B

Pyetja 477 V)3

Cilat nga të mëposhtëmet e marrin zhvillimin nga monocitet:

- A) Osteoklastet

- B) Histocitet
 - C) Makrofagët
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 478 V)3

Gjenotipet HLA shkaktojnë :

- A) Leucemi limfocitike akute
 - B) Lupus eritematoz sistemik
 - C) Dermatit herpetiform
 - D) Të gjitha të mësipërmet
- PS)D

Pyetja 479 V)3

Anergjia imunologjike (mos reagimi specifik ndaj një mikrobi) ndodh në :

- A) Leprozë
 - B) Kandidozë
 - C) TBC
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 480 V)3

Testi i alergjisë :

- A) Patch test
 - B) Prausnitz kustner test
 - C) Testi intradermal i lekures
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 481 V)3

Imuniteti humoral luan rol në :

- A) Testin e tuberkulines
 - B) Anafilaksi
 - C) Flakjen e graftit
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)B

Pyetja 482 V)3

Shenjat orale të anemisë përfshijnë :

- A) Gjuhën e zvogeluar
 - B) Predispozita ndaj ulceracioneve
 - C) Deskuamimi i papilave filiforme
 - D) Te gjitha sebashku
- PS)D

Pyetja 483 V)3

Sindroma Plumer Vinson ka lidhje me :

- A) Disfagi
 - B) Anemi
 - C) Gjendje prekanceroze
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 484 V)3

Anemia hiperkronike makro-citike shfaqet ne :

- A) Leucemie limfatike
 - B) Anemie permicioze
 - C) Anemie aplastike
 - D) Sindromin Plumer Vinson
- PS)B

Pyetja 485 V)3

Anemia aplastike shkaktohet nga :

- A) Përdorimi i kloranfenikolit te fëmijët
 - B) Osteo skleroza
 - C) Metastazat ekstensive kockore
 - D) Te gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 486 V)3

Purpura trombocitopenike :

- A) Shkakton hematoma intrakockore
 - B) Shenjën e parë më shpesh e ka orale
 - C) Shkaktohen nga rrezatimi
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 487 V)3

Hemofilia :

- A) Shtim i kohës së koagulimit dhe kohës parciale të trombo plastines
- B) Nuk haset asnjëherë tek femrat
- C) Trajtohet me palzëm të freskët
- D) Të gjitha sëbashku

PS)A

Pyetja 488 V)3

Crregullimi më i rëndë i hemostazës është:

- A) Crregullimi Hemoragjik
- B) Crregullimi i koagulimit
- C) Difekt i trombociteve
- D) Mungesë e protrombinës

PS)B

Pyetja 489 V)3

Meningjiti shoqërohet me :

- A) Shtim i glukozës në lëngun cerebrospinal
- B) Shtim i proteinës L.CS
- C) Mungesë e qelizave
- D) Të gjitha sëbashku

PS)B

Pyetja 490 V)3

Leukoplakia është :

- A) E mirëpërcaktuar
- B) Egzofitike
- C) Ulcerative
- D) Endofitike

PS)B

Pyetja 491 V)3

Cili nga lezionet e mëposhtëm shtrihet në formë gishtash në indet përreth :

- A) Lipoma
- B) Papiloma

- C) Fibroma
 - D) Kondroma
- PS)A

Pyetja 492 V)3

Epulisi kongenital është :

- A) Miksomë
 - B) Miomë
 - C) Fibromë
 - D) Neuromë
- PS)B

Pyetja 493 V)3

Neurofibroma :

- A) është e pa dhimbshme
 - B) Vendoset kryesisht në foramina
 - C) 15% ka ndryshime sarkomatoze
 - D) Te gjitha sebashku
- PS)D

Pyetja 494 V)3

Osteoma :

- A) është e atashuar në kortikalen e kockës
 - B) është radioopake pa linjë demarkacioni
 - C) Më e shpeshtë tek femrat
 - D) është autozomale recesive
- PS)A

Pyetja 495 V)3

Torusi palatinal :

- A) Mund të zhvillohet kancer
 - B) Ndalon zmadhimin në përmasa me mbarimin e rritjes
 - C) Janë të trashëgueshëm
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 496 V)3

Dhimbja ndodh në :

- A) Osteoma osteoide
- B) Osteoblastoma
- C) Kondroma
- D) Të gjitha sëbashku

PS)D

Pyetja 497 V)3

Displazia fibroze :

- A) Shkakton deformim në okluzion normal
- B) Sinusi maksilar dhe palatumi obliterohen por hunda nuk pëson gjë
- C) Ul rezistencën e kockës ndaj infeksionit
- D) Të gjitha sëbashku

PS)D

Pyetja 498 V)3

Çfarë fleksibiliteti paraqesin alginatet nën një presion prej 1000 gr/cm kub :

- A) 10 - 20 %
- B) 5 - 8 %
- C) 22 - 25 %
- D) 8 - 9 %

PS)A

Pyetja 499 V)3

Çfarë përfshin tipi i parë i alginatit:

- A) Alginate ku transformimi në xhel bëhet normalisht
- B) Alginate ku transformimi në xhel bëhet shumë shpejt
- C) Alginate ku transformimi në xhel bëhet mesatarisht
- D) Alginate ku transformimi bëhet shumë ngadalë

PS)B

Pyetja 500 V)1

Çfarë rivestimenti fosfatik përdoret për aliazhet jo fisnike:

- A) Rivestiment fosfatik pa grafit (karbon)
- B) Rivestiment fosfatik me grafit (karbon)
- C) Rivestiment fosfatik me gips hidrokol
- D) Rivestiment fosfatik me silicium

PS)A

Pyetja 501 V)1

Sa kohë mbahet cilindri në furrë në temperaturën 650 grade Celsius :

- A) 30 minuta
- B) 45 minuta
- C) 60 minuta
- D) 1.5 orë

PS)C

Pyetja 502 V)1

Në sa grupe klasifikohet korrozioni:

- A) Në dy grupe
- B) Në pesë grupe
- C) Në katër grupe
- D) Në një grup

PS)A

Pyetja 503 V)1

Çfarë paraqet korundi:

- A) Mineral natyral i zi
- B) Koks
- C) Kuarc
- D) Oksid alumini

PS)D

Pyetja 504 V)1

Çfarë përmbajnë saldatura e butë:

- A) Flori
- B) Kallaj
- C) Zink
- D) Platin

PS)B

Pyetja 505 V)1

Për çfarë përdoret Porcelani Targis vectris:

- A) Ne korona të veçanta tek dhëmbët frontal
- B) Për përgatitjen e protezave totale
- C) Për përgatitjen e protezës parciale

D) Për përgatitjen e koronave I
PS)A

Pyetja 506 V)1

Në çfarë temperature ndodh koha e ndryshimeve kimike të porcelanit :

- A) 94 grade – 480 grade Celsius
 - B) 870 grade celsius
 - C) 1090 grade Celsius
 - D) 1300 grade Celsius
- PS)B

Pyetja 507 V)1

Sa faza kalon pjekja e porcelanit:

- A) Në 5 faza
 - B) Në 3 faza
 - C) Në 4 faza
 - D) Në 6 faza
- PS)C

Pyetja 508 V)1

Në çfarë temperature kalon kuarci alfa në kuarc beta:

- A) Në 105 grade Celsius
 - B) Në 220 grade Celsius
 - C) Në 106 grade Celsius
 - D) 573 grade Celsius
- PS)D

Pyetja 509 V)1

Cili Aliazh floriri përdoret për urat metal porcelan:

- A) Aliazh i Degudent H
 - B) Aliazh i floririt 22 karat
 - C) Aliazh i floririt 20 karat
 - D) Aliazh i floririt 18 karat
- PS)A

Pyetja 510 V)1

Çfarë metali përdoret për implantet:

- A) Krom kobaldi
 - B) Titanium
 - C) Aliazhi Palgar
 - D) Ari i Bardhë
- PS)B

Pyetja 511 V)1

Çfarë sasie Au kanë aliazhet e forta të floririt:

- A) 83 %
 - B) 68 %
 - C) 78 %
 - D) 70 %
- PS)C

Pyetja 512 V)1

Çfarë pjese ka paladiumi në aliazhet e floririt me paladiumin:

- A) 50 pjesë
 - B) 650 pjesë
 - C) 70 pjesë
 - D) 220 pjesë
- PS)D

Pyetja 513 V)1

Çfarë përqindje ka platini në aliazhet flori - Platin:

- A) 4.15 %
 - B) 7.15 %
 - C) 8.15 %
 - D) 12.15 %
- PS)A

Pyetja 514 V)1

Për çfarë përdoret aliazhi i argjendit me metalet fisnike:

- A) Proteza të skeletuara
 - B) Shtiftet
 - C) Kroshet e derdhura
 - D) Urat fikse
- PS)B

Pyetja 515 V)1

Çfarë përqindje ka karboni në çelik:

- A) 0.3 %
- B) 1.7 - 5 %
- C) 0.4 - 1.6 %
- D) 2.7 - 2.9 %

PS)C

Pyetja 516 V)1

Çfarë përqindje ka karboni në gizë:

- A) 0.3 %
- B) 0.4 - 1.6 %
- C) 2.7 - 2.9 %
- D) 1.7 - 5 %

PS)D

Pyetja 517 V)1

Çfarë aliazhi përdoret për protezat e skeletuara:

- A) Wironit
- B) Remanium CS
- C) Kera 501
- D) Zirkoni

PS)A

Pyetja 518 V)1

Çfarë aliazhi përdoret për urat Metal - Porcelan:

- A) Wirocast
- B) Remanium 2001
- C) Wironium
- D) Vitalium

PS)B

Pyetja 519 V)1

Për çfarë përdoret Zirkoni:

- A) Në protetikën e protezave të lëvizshme totale
- B) Në protetikën e protezave të lëvizshme parciale
- C) Për realizimin e vidave intrakanalare
- D) Si material mbushës të dhëmbëve

PS)C

Pyetja 520 V)2

Alteracionet prezente ne dhembet me fluoroze jane nga ?

- A) Nga nje hiperkalcifikim te smaltit
- B) Nga nje hipoplazi te smaltit
- C) Nga nje disendokrinopati
- D) Nga nje hypokalcifikim te smaltit

PS)D

Pyetja 521 V)2

Per diagnozen Radiologjike te kariesit jane te dobishme Radiografite?

- A) Endoorale okluzale
- B) Endoorale bite wing
- C) Ortopanoramik
- D) Teleradiografi

PS)B

Pyetja 522 V)2

Ne cfare moshe fillon formimi i indeve te fort a te molarit te pare permanent:

- A) Ne muajin e 6 - te jetes intrauterine
- B) Ne muajin e 9 te jetes intrauterine
- C) Ne muajin e 6 te jetes
- D) Ne vitin e pare te jetes

PS)B

Pyetja 523 V)2

Ne melanodonci kariesi shtrihet:

- A) Ne siperfaqen vestibulare
- B) Aproksimale
- C) Okluzale
- D) Prek gjithë sistemin dentar

PS)A

Pyetja 524 V)2

Ne pulpotomin e dhembeve te qumeshtit cila nga teknikat ka me

sukses ne ruajtjen e integritetit te pulpes:

- A) Teknika me formokrezol
- B) Teknika me sulfat hekuri
- C) Teknika me MTA
- D) Teknika me (Ca OH)₂

PS)C

Pyetja 525 V)3

Ne pulpektomi te dhembeve te qumeshtit cila nga pastat per mbushje te kanaleve eshte e suksesshme:

- A) Pasta jodoformike
- B) Pasta me (CaOH)₂
- C) Vitapex
- D) Pasta me Oksid zink eugenol

PS)C

Pyetja 526 V)3

Membrana e Nansmit derivon nga:

- A) Nga guajana e Hertvingut
- B) Nga Osteoblasti
- C) Nga organi i smaltit
- D) Nga indi kartlaginoz

PS)C

Pyetja 527 V)3

Ne procesin carioz infiltrimi mikrobik takohet:

- A) Ne shtresen e trete
- B) Ne shresen e pare
- C) Ne shtresen e dyte
- D) Ne shtresen e katert

PS)A

Pyetja 528 V)3

Cila nga keto forma te periodontitit kronik nuk takohet ne dhembet e qumeshtit:

- A) Periodontit kronik granular
- B) periodontit kronik granulomatoz
- C) Periodontit kronik gangrenoz
- D) Periodontit kronik fibroz

PS)D

Pyetja 529 V)3

Në cilën nga këto mosha traumat e dhëmbëve të qumshtit japin dëmtim të rëndë të dhëmbit permanent:

- A) 1 vjeç
- B) 2 vjeç
- C) 3vjeç
- D) 4 vjeç

PS)B

Pyetja 530 V)3

Kush eshte faktori etiologjik ne parodontitin juvenil

- A) Hipertiroidizmi
- B) Diabeti
- C) Pllaka bakteriale
- D) Mungese evitamines C

PS)C

Pyetja 531 V)3

Kalcifikimi i rrenjes i molarit te dyte poshte te qumeshtit kryhet ne moshen:

- A) 2-2.5
- B) 2.5-3
- C) 3-3.5
- D) 4-4.5

PS)C

Pyetja 532 V)3

Kanini i qumshtit del ne muajt:

- A) 15.18
- B) 16-20
- C) 18-22
- D) 20-25

PS)B

Pyetja 533 V)3

Ne dhembet e qumeshtit amputimi mortal ka indikacion absolut ne:

- A) Pulpit purulent
 - B) Pulpit kronik ulceroz
 - C) Pulpit akut seroz
 - D) Kariesin e thelle
- PS)C

Pyetja 534 V)3

Ph kritik i pllakes bakteriale eshte:

- A) 5-4.5
 - B) 6-6.5
 - C) 5.5-5
 - D) 6.5-6
- PS)C

Pyetja 535 V)3

Ne nje dhemb te traumatizuar permanent me rrenje te pakalcifikuara kontrolli klinik do te kryhet:

- A) 8 dite
 - B) 18 dite
 - C) 21 dite
 - D) 90 dite
- PS)A

Pyetja 536 V)3

Embrioni i kaninit te perhershëm fillon te zhvillohet ne :

- A) Ne javen e 17 te jetes intrauterine
 - B) Ne javen e 30 te jetes intrauterine
 - C) Ne javen e 32 te jetes intrauterine
 - D) Ne javen e 25 te jetes intrauterine
- PS)D

Pyetja 537 V)3

Denticioni i perziere eshte pergjithesisht prezent ne moshat :

- A) 6-18 vjec
 - B) 12-18 vjec
 - C) 9 -12 vjec
 - D) 6-12 vjec
- PS)D

Pyetja 538 V)3

Ne pulpitin akut purulent dhimbja :

- A) Qetesohet nga te nxehtet
 - B) Qetesohet nga te ftohtit
 - C) Ulet nga te ftohtit
 - D) Provokohet nga mastikacioni
- PS)B

Pyetja 539 V)3

Ne stomatitin primar superficial bejne pjese te gjitha pervec:

- A) Stomatitit kataral
 - B) Aftoz
 - C) Hipertrofik
 - D) Soor stomatitin
- PS)C

Pyetja 540 V)3

Ne Morbus Moller -Barlow nevoja ditore per vit C eshte:

- A) 20-30 mg
 - B) 30-50 mg
 - C) 60-80mg
 - D) 50-100mg
- PS)D

Pyetja 541 V)3

Faktori primar ne etiologjine e hypoplazise se smaltit:

- A) Semundje endokrine
 - B) Crregullime gastrointestinale
 - C) Ushqime artificiale
 - D) Crregullimet e metabolizmit te calciumit dhe fosforit
- PS)D

Pyetja 542 V)3

Gingivo stomatiti Herpetik në fëmijë arrin pikun dhe paraqitjen klinike në moshat:

- A) 6 muaj
- B) 10 muaj
- C) 2-4 vjeç

D) 5 vjeç
PS)C

Pyetja 543 V)3

Lamina dura është:

A) Pareti I jashtëm I një kisti maxilar
B) Imazhi radiografik I kockes alveolare propium
C) Pareti I jashtëm I odontomës
D) Epiteli ku mer origjinë smalti dentar
PS)B

Pyetja 544 V)3

Në Hipoplazinë e zmaltit në pjesën bazale prizmat e tij I gjejmë në drejtim:

A) Tangencial
B) Radial
C) Horizontal
D) Pingul me bazën
PS)B

Pyetja 545 V)2

Disbakterozia intestinale e shkaktuar nga përdorimi I antibiotikëve çon në uljen e sintezës së

A) Vit E
B) Vit B2
C) Vit B12
D) Vit C
PS)B

Pyetja 546 V)2

Krijimi i koreve të holla si luspat e peshkut në buzë është karakteristikë e:

A) Cheilitit glandular
B) Cheilitit abraziv
C) Cheilitit exfoliativ
D) Cheilitit actinic
PS)C

Pyetja 547 V)2

Kutikula e fituar :

- A) Shihet lehtë me sy të lirë
 - B) Vendoset mbi pllaken bakteriale
 - C) Eshte vazhdim i komponenteve nen siperfaqesore te smaltit
 - D) Përbëhet kryesisht nga mikroorganizma
- PS)C

Pyetja 548 V)2

Me anë të sondës paradontale nuk mund të përcaktojmë:

- A) Thellësinë e xhepave periodontalë
 - B) Humbjen e atashmentit
 - C) Përmasat e destruksionit kockor
 - D) Përmasat e retraksionit gingivar
- PS)C

Pyetja 549 V)2

Chlorhexidina mund përdoret në këto përqëndrime si solucion për gargarë:

- A) 1.2 %
 - B) 0.6 %
 - C) 0.12%
 - D) 2%
- PS)C

Pyetja 550 V)2

Cili nga faktorët e mëposhtëm hyn tek faktorët jatrogjen të lindjes së një paradontopatie:

- A) Traumat dentare
 - B) Anomalitë dentare
 - C) Mbushjet me amalgam
 - D) Mbushjet e varura
- PS)D

Pyetja 551 V)2

Vezikula dhe bula dallohen nga :

- A) Përmbajtja : likid seroz për vezikulat dhe mukus për bulat
 - B) Përmasat : vezikula<5mm, ndërsa bulat >5mm
 - C) Indi në të cilin formohen : epiteli për vezikulat dhe indi lidhor për bulat
 - D) Shpërndarja : lezione difuze për vezikulat, një lezion i vetëm për bulat
- PS)B

Pyetja 552 V)2

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka ndikim më të madh në zhvillimin e gingivitit hipertrofik:

- A) Ciklosporina
 - B) Kortizonikët
 - C) Antibiotikët
 - D) Sulfamidikët
- PS)A

Pyetja 553 V)2

Medikamenti kryesor që përdoret në trajtimin e pemfigusit është:

- A) Kortizonik
 - B) Antimykotik
 - C) Stomakuran
 - D) Chlorhexidine
- PS)A

Pyetja 554 V)2

Trajtimi i lichen planus me kortizonikë topikalë:

- A) Sjell gjithnjë shërimin e sëmundjes
 - B) Favorizon lindjen e kandidozës orale
 - C) Përgjigja A dhe B janë të vërteta
 - D) Asnjëra nga përgjigjet nuk është e vërtetë
- PS)B

Pyetja 555 V)2

Rezorbimi kockor vertikal është karakteristik e:

- A) Paradontitit juvenil
 - B) Atrofisë senile
 - C) Paradontitit kronik
 - D) Gingivitit gravidar
- PS)A

Pyetja 556 V)2

Duhani ndikon me shume në lindjen e paradontopative me anë të:

- A) Efektit vazokonstriktor periferik
- B) Shkatërrimit të fibrave të kolagjenit
- C) Efektit vazodilatator periferik

D) Rritjes së permeabilitetit indoor

PS)A

Pyetja 557 V)2

Mund të dyshohet se një ulçer orale është shkaktuar nga një agjent traumatik nëse:

A) është e padhimbshme

B) Ka përmasa më të vogla se 3cm

C) është e padhimbshme dhe ka përmasa më të vogla se 3cm

D) Asnjëra nga përgjigjet e mësipërme

PS)D

Pyetja 558 V)2

Gingiviti nga pllaka bakteriale shoqërohet me:

A) Lëvizshmëri të dhëmbëve

B) Xhepa paradontalë

C) Destruksion të kockës alveolare

D) Asnjëra nga përgjigjet e mësipërme

PS)D

Pyetja 559 V)2

Purpura në një pacient me leuçemi akute mund të shkaktohet nga:

A) Shtimi i numrit të trombociteve

B) Pakësimi i numrit të trombociteve

C) Shtimi i numrit të eritrociteve

D) Pakësimi i numrit të eritrociteve

PS)B

Pyetja 560 V)2

Lëvizshmëria e dhëmbëve mund të jetë pasojë e:

A) Paradontitit të thellë

B) Traumës okluzale

C) Tumoreve malinje

D) Të gjitha përgjigjet janë të vërteta

PS)D

Pyetja 561 V)2

Pomada me aciclovir ose penciclovir shërben për mjekimin e:

- A) Herpes labialis
 - B) Gingivostomatitit herpetik primar
 - C) Herpanginës
 - D) Afteve rekurrente
- PS)A

Pyetja 562 V)2

Femrat preken më shpesh se meshkujt nga:

- A) Lihen planus
 - B) Pemfigus vulgaris
 - C) Cheilit eksfoliativ
 - D) Të gjitha përgjigjet janë të vërteta
- PS)D

Pyetja 563 V)2

Leukoplakia:

- A) Në shumicën e rasteve nuk është e nevojshme kryerja e biopsisë
 - B) Mund të transformohet në tumor malinj
 - C) Karakterizohet nga leziona bilaterale
 - D) Asnjëra nga përgjigjet e mësipërme
- PS)B

Pyetja 564 V)3

Operacion me lembo muko-periostale bëhen në xhepa paradontale me thellësi:

- A) Deri 2mm
 - B) Deri 3mm
 - C) Deri 4mm
 - D) Mbi 6mm
- PS)D

Pyetja 565 V)3

Kanceri intraoral mund të manifestohet klinikisht:

- A) vetëm në pacientët duhanpirës
 - B) si ulçeracion dhe/ose tumefaksion dhe/ose lezion të kuq dhe/ose lezion të bardhë
 - C) vetëm në formën ulçerative
 - D) me leziona buloze e më pas erozive
- PS)B

Pyetja 566 V)3

Sindroma Behçet karakterizohet nga:

- A) afte orale, ulçera genitale, uveit dhe eritema nodosum
- B) ulçera orale dhe bula kutane
- C) ulçera orale me stria likenide dhe papula kutane
- D) asnjë nga përgjigjet nuk është e vërtetë

PS)A

Pyetja 567 V)3

Në rastin e një pacienti me leukoplaki:

- A) është e nevojshme kryerja e biopsisë dhe ekzaminimi histopatologjik
- B) nuk kryhet biopsi, mjafton mbajtja e lezionit nën observim
- C) lezioni trajtohet me gargarë me klorheksidinë
- D) lezioni trajtohet me antibiotikë

PS)A

Pyetja 568 V)3

Pacientë femër 58 vjeçare, paraqitet me ulçeracione në gojë dhe diagnostikohet me Pemfigoid të membranave mukoze (cikatriciale). është e rëndësishme që pacienten ta referoni për një kontroll tek:

- A) kardiologu
- B) ortopedi
- C) okulist
- D) kirurgu i përgjithshëm

PS)C

Pyetja 569 V)3

Hiperplazi gingivare mund të japë:

- A) Phenytoina
- B) Nifedipina
- C) Cyclosporina A
- D) të gjithë medikamentet e sipërpërmendura

PS)D

Pyetja 570 V)3

Femër 50 vjeçe, paraqitet me ndjesi djegie të gingivave, të shtuar nga ngacmues mekanikë dhe kimikë. Në ekzaminim intraoral shihen zona të gingivës së ngjitur me ngjyrë të kuqe të ndezur e të shkëlqyeshme. Mund të dyshohet për:

- A) gingivit ulçero-nekrotik
 - B) gingivit deskuamativ
 - C) gingivit nga pllaka bakteriale
 - D) asnjë nga patologjitë e mësipërme
- PS)B

Pyetja 571 V)3

Mashkull 24 vjeç, HIV+, paraqitet me dhimbje dhe hemoragji nga gingivat shkaktuar nga ngacmues, si dhe halitosis. Në ekzaminim intraoral shihet ulçeracion dhe dekapitim i majave të papilave. Mund të dyshohet për:

- A) gingivit nga pllaka bakteriale
 - B) gingivit ulçero-nekrotik
 - C) gingivit deskuamativ
 - D) gingivostomat herpetik primar
- PS)B

Pyetja 572 V)3

Vezikula të vendosura përgjatë një dege të nervit V kranial janë shenjë e:

- A) eritemës poliforme
 - B) gingivostomatitit herpetik primar
 - C) herpes zoster
 - D) pemfigus vulgaris
- PS)C

Pyetja 573 V)3

Eritema multiforme mund të paraqitet në gojë me :

- A) bula
 - B) erozione
 - C) ulçeracione
 - D) a+b+c
- PS)D

Pyetja 574 V)3

Cili nga mikroorganizmat e mëposhtëm mendohet se shkakton paradontitin juvenil:

- A) Streptokoku mutans
 - B) Simbiosa fuzo spiroketale
 - C) Bacili actinomycetemcomitans
 - D) Treponema microdentium
- PS)C

Pyetja 575 V)3

Qelizat e Tzankut janë tipike për:

- A) Dermatitis herpetiform
- B) Pemfigus vulgaris
- C) Eritemen polimorfe
- D) Morbus Behxhet

PS)B

Pyetja 576 V)3

Herpangina dallohet nga gingivostomatiti herpetik primar (GSH) sepse:

- A) vezikulat orale janë më të mëdha se në GSH
- B) temperatura është zakonisht më e lartë se në GSH
- C) vezikulat janë të vendosura më posterior se në GSH
- D) prek moshat e rritura

PS)C

Pyetja 577 V)3

Mikonazoli është një medikament antimykotik, i kundraindikuuar në pacientët që mjekohen në rrugë sistemike me :

- A) Anksiolitikë
- B) Antibiotikë
- C) Antikoagolantë
- D) Antihipertensivë

PS)C

Pyetja 578 V)3

Paradontiti agresiv (juvenil):

- A) është një sëmundje që shkaktohet nga baktere veçanërisht patogjene për paradontin, në pacientë me një predispozitë gjenetike për këtë sëmundje.
- B) është një sëmundje e trashëgueshme dominante.
- C) Prek vetëm pacientët me higjenë shumë të keqe të gojës.
- D) Prek pacientët që vuajnë nga kolagenopati.

PS)A

Pyetja 579 V)3

Stomatiti protetik kandidozik mund të paraqitet në trajtën e:

- A) Zonave hiperemike difuze të mukozës nën protezë
- B) Hiperplazisë papilare të palatumit
- C) Asnjë nga përgjigjet e mësipërme nuk është e vërtetë
- D) Përgjigjet A dhe B janë të vërteta

PS)D

Pyetja 580 V)3

Në ndryshim nga aftet, ulçerat që shfaqen në kuadrin e gingivostomatitit herpetik primar :

- A) Mund të vendosen edhe në mukozën e keratinizuar
- B) Paraprihen nga vezikula
- C) Janë më të shumta në numër
- D) Të gjitha përgjigjet janë të vërteta.

PS)D

Pyetja 581 V)3

Pigmentimi fiziologjik i mukozës së gojës:

- A) Haset vetëm në pacientët me origjinë afrikane.
- B) Vërehet kryesisht në mukozën palatinale
- C) Haset më shpesh në moshat e vjetra
- D) Asnjë nga përgjigjet nuk është e vërtetë.

PS)D

Pyetja 582 V)3

Sindroma e Behçet mund të diagnostikohet nëse, përveç afteve në gojë, janë të pranishme edhe:

- A) Lezione genitale
- B) Lezione genitale dhe okulare
- C) Lezione genitale dhe kolagjenopati
- D) Asnjë nga përgjigjet e mësipërme

PS)B

Pyetja 583 V)3

Një pacient 65 vjeç ka protezë totale në nofullën e sipërme dhe vuan nga xerostomia. Pasoja kryesore e xerostomisë në këtë pacient do të ishte rritja e mundësisë për të zhvilluar:

- A) Lingua nigra villosa
- B) Abcese paradontale
- C) Stomatit protetik kandidozik
- D) Fluorozë të dhëmbëve të nofullës së poshtme

PS)C

Pyetja 584 V)3

Melanozomet janë:

- A) Lezione të pigmentuara nga melanina
- B) Grumbullime të melaninës që transferohen nga melanocitet tek qelizat epiteliale
- C) Qeliza që prodhojnë melaninë
- D) Asnjëra nga përgjigjet e mësipërme

PS)B

Pyetja 585 V)3

Sindromi Stivens Johnson është formë e rëndë e:

- A) Pemfigoidit buloz
- B) Eritemës polimorfe
- C) Dermatitit herpetiform
- D) Pemfigusit vulgar

PS)B

Pyetja 586 V)3

Ndërhyrja kirurgjikale mund të jetë e nevojshme në:

- A) Cheilitin glandular
- B) Cheilitin alergjik
- C) Cheilitin aktinik
- D) Cheilitin exfoliativ

PS)A

Pyetja 587 V)3

Cilat nga sëmundjet e mëposhtme është shfaqur dhe në formë epidemie:

- A) Morbus Behçet
- B) Aftet miliare
- C) Aftet recidivante
- D) Ethja aftoze nga kafshët

PS)D

Pyetja 588 V)3

Kandidoza akute pseudomembranore duhet të diferencohet me:

- A) PoliomiELITIN
- B) Varicellen

- C) Difterinë
 - D) Stomatitin aftoz
- PS)C

Pyetja 589 V)3

Disfagia mund të jetë më shumë pasojë e:

- A) Kandidozes akute pseudomembranore
 - B) Kandidozës kronike hiperplazike
 - C) Kandidozës akute atrofike
 - D) Angulusit Kandidozik
- PS)A

Pyetja 590 V)3

Përgatitja e një proteze totale me okluzion të ulët ndikon më shumë në lindjen e:

- A) Kandidozës kronike hiperplazike
 - B) Kandidozës kronike atrofike
 - C) Kandidozës akute pseudomembranore
 - D) Angulusit kandidozik
- PS)D

Pyetja 591 V)3

Shfaqjen e angulusit kandidozik e favorizon më shumë mungesa e vitaminës:

- A) Vit. B12
 - B) Vit. B2
 - C) Vit. B6
 - D) Vit. C
- PS)B

Pyetja 592 V)3

Kush ka ndikim më të madh në paradontopati:

- A) Kutikula e fituar
 - B) Pllaka subgingivale aderente
 - C) Pllaka subgingivale joaderente
 - D) Gurëzat nëngingivarë
- PS)C

Pyetja 593 V)3

Mbas heqjes së pseudomembranave të gingivitit ulceroz të sëmurit i rekomandojmë:

- A) Gargarë + larjen e dhëmbëve
- B) Moslarjen e dhëmbëve për disa ditë
- C) Berjen vetëm të gargarës
- D) Vetëm larjen e dhëmbëve

PS)A

Pyetja 594 V)3

është më e këshillueshme që gargara me ujë të oksigjenuar të zgjasë deri në:

- A) 4 javë
- B) 2 javë
- C) 3 javë
- D) 1 javë

PS)D

Pyetja 595 V)2

Lehtësimi i protezës bëhet në :

- A) tuberkulum alveolar mandibular të zhvilluar
- B) linjën Ah
- C) torus mandibular të zhvilluar
- D) ligamentin pterigomandibular

PS)C

Pyetja 596 V)2

Gjatë shqiptimit të bashkëtingëlloreve F dhe V, centralët lart duhet :

- A) të prekin lehtë buzën e poshtme në kufirin mes pjesës së lagur dhe asaj të thatë të mukozës së buzës
- B) të mos e prekin buzën e poshtme duke qëndruar 0,5mm larg saj
- C) të mos e prekin buzën e poshtme duke qëndruar 1.5mm larg saj
- D) të prekin buzën e poshtme duke u zhytur rreth 1 mm në të

PS)A

Pyetja 597 V)2

Kurba e kompensimit transversal formohet në nivel të:

- A) kaninëve
- B) centralëve
- C) premolarëve
- D) molarëve

PS)D

Pyetja 598 V)2

Kërcitja e dhëmbëve gjatë të folurit në një pacient me protezë totale tregon për një protezë me okluzion:

- A) të ulët
- B) të kryqëzuar
- C) të lartë
- D) prognatik

PS)C

Pyetja 599 V)2

Kufiri i protezës totale të përfunduar duhet të jetë :

- A) i hollë dhe i mprehtë
- B) i hollë dhe i rrumbullakosur
- C) në trashësinë e buzëve të masës anatomike
- D) në trashësinë e buzëve të masës funksionale

PS)D

Pyetja 600 V)2

Proteza axhuste përdoret kur :

- A) atrofia e procesit alveolar është e madhe
- B) qiellza është shumë e cekët
- C) procesi alveolar frontal në nofullën e sipërme është shumë i zhvilluar
- D) kur buza e sipërme është shumë e gjatë

PS)C

Pyetja 601 V)2

Ribazimi i protezave totale bëhet kur:

- A) proteza lëviz dhe okluzioni qendror nuk është i rregullt
- B) proteza lëviz dhe ka okluzion normal
- C) proteza lëviz dhe ka okluzion të lartë
- D) proteza lëviz dhe ka okluzion ulët

PS)B

Pyetja 602 V)2

Në rreshtimin e dhëmbëve në klasën e dytë skeletike kurbat Spee dhe Willson janë:

- A) të sheshta
 - B) normale
 - C) më të përkulura
 - D) inverse (të përmbysura)
- PS)C

Pyetja 603 V)2

- A) Gravimi i modeleve bëhet për :
 - A) lehtësimin e protezës në formacionet anatomike të zhvilluara
 - B) për të rritur qëndrueshmërinë e protezës në nofulla me procese alveolare të atrofizuara
 - C) C-për të evituar fundosjen e protezës
 - D) për të eliminuar paratakimet
- PS)B

Pyetja 604 V)2

Pasta e repinës është:

- A) tiokol
 - B) silikon
 - C) agar-agar
 - D) oksid zink eugenol
- PS)D

Pyetja 605 V)3

Në protezat e lëvizshme në fëmijë përdoren:

- A) kroshe më të holla se zakonisht [0,7mm]
 - B) kroshe të zakonshme
 - C) kroshe më të trasha [1mm]
 - D) nuk përdoren kroshe
- PS)D

Pyetja 606 V)3

Këndi i pjerrësisë incizivale formohet gjatë lëvizjeve të mandibulës:

- A) anash dhe poshtë
 - B) anash dhe lart
 - C) para dhe poshtë
 - D) prapa dhe poshtë
- PS)C

Pyetja 607 V)3

Mos presimi i duhur i muflës gjatë polimerizimit bën që proteza e ardhshme të jetë:

- A) me kufinj më të shkurtër
- B) më e trashë
- C) poroze
- D) me kufinj më të gjatë

PS)C

Pyetja 608 V)3

Lehtësimi ortopedik i formacioneve të caktuara anatomike bëhet me :

- A) dyllë
- B) stenc
- C) rezinë të fortë vetëpolimerizuese
- D) rezinë elastike

PS)D

Pyetja 609 V)3

Mos presimi i duhur i muflës gjatë polimerizimit bën që proteza e ardhshme të jetë:

- A) me kufinj më të shkurtër
- B) më e trashë
- C) me lartësi kafshimi më të madhe
- D) me kufinj më të gjatë

PS)C

Pyetja 610 V)3

Allçia rekomandohet për marrjen e masës për protezat totale në nofulla:

- A) shumë të atrofizuara
- B) me egzostoza të shumta
- C) me mukozë me reziliencë të shtuar
- D) me mukozë të hollë me reziliencë shumë të ulët

PS)C

Pyetja 611 V)3

Maceracionet e këndeve të buzëve në një pacient janë shenjë e një:

- A) proteze me okluzion të lartë
- B) proteze me gabim okluzioni

- C) kandidoze bucale
 - D) mukoze me reziliencë të shtuar
- PS)C

Pyetja 612 V)3

Mjekimi ortopedik i sindromit Costen konsiston në:

- A) uljen e lartësisë së kafshimit
 - B) ngritjen e lartësisë së kafshimit
 - C) mezializimin e mandibulës
 - D) distalizimin e mandibulës
- PS)B

Pyetja 613 V)3

Dukuria Christensen vërehet gjatë:

- A) lëvizjeve laterale të mandibulës
 - B) lëvizjeve propulsive
 - C) hapjes së gojës
 - D) mbylljes së gojës
- PS)B

Pyetja 614 V)3

Këndi i Benett-it formohet gjatë lëvizjeve:

- A) laterale në anën nga zhvendoset mandibula
 - B) laterale në anën e kundërt të zhvendosjes
 - C) propulsive
 - D) vertikale
- PS)B

Pyetja 615 V)3

Nëpërmjet Harkut facial bëhet orientimi individual i modeleve sipas:

- A) planit horizontal
 - B) horizontales së Frankfurtit
 - C) planit sagital
 - D) planit tuberal ose frontal
- PS)B

Pyetja 616 V)3

Rreshtimi i dhëmbëve artificialë distalë më brenda se mesi i procesit alveolar shkakton:

- A) thyerje të protezës në linjën mediane
- B) vështirësi në gëlltitje
- C) vështirësi në të folur
- D) kafshim të faqeve

PS)C

Pyetja 617 V)3

Lartësia e 1/3 së poshtme të fytyrës gjatë shqiptimit të germës M është:

- A) sa lartësia e okluzionit qendror
- B) 1-2mm më e ulët se lartësia e okluzionit qendror
- C) sa lartësia në pozicionin e qetësisë
- D) 1-2mm më e lartë se pozicioni i qetësisë

PS)C

Pyetja 618 V)3

Masa anatomike pa presion (me presion minimal) merret me :

- A) alginat
- B) repinë
- C) silikon të trashë (putty)
- D) allçi

PS)D

Pyetja 619 V)3

Këndi Gotik formohet gjatë:

- A) lëvizjeve propulsive
- B) hapjes së gojës
- C) mbylljes së gojës
- D) lëvizjeve laterale

PS)D

Pyetja 620 V)3

Në protezën imediate dhëmbët ekstraktohen:

- A) pasi proteza është plotësisht e përfunduar
- B) në provën me dhëmbë
- C) para përcaktimit të okluzionit qendror
- D) para marrjes së masës funksionale

PS)A

Pyetja 621 V)3

Gravimi i modeleve bëhet kur

- A) proceset alveolare janë shumë të zhvilluar
 - B) qiellza është shumë e thellë
 - C) proceset alveolare janë shumë të atrofizuar
 - D) kur ka egzostoza të shumta
- PS)C

Pyetja 622 V)3

Vendosja e modeleve në artikulatorin Stratos 200 bëhet duke u bazuar në:

- A) papilën incizivale dhe përgjysmoret e saj
 - B) frenulum labi superior
 - C) tuberkulum alveolar mandibulae dhe përgjysmoret e tij
 - D) tuberat maxilarë
- PS)C

Pyetja 623 V)3

Maceracionet e këndeve të buzëve janë shenjë e një :

- A) proteze me okluzion të lartë
 - B) proteze me okluzion të ulët
 - C) proteze që lëviz
 - D) proteze me gabim okluzioni
- PS)B

Pyetja 624 V)3

Në protezën e poshtme me krahë, zona ku shtrihen krahët e protezës ekstensive është:

- A) llozha bucinatore
 - B) llozha retromylohyoide
 - C) zona sublinguale anteriore
 - D) zona e plikave bukale
- PS)B

Pyetja 625 V)3

- A) Glosalgjia (djegia e gjuhës) vërehet në pacientë me :
- B) okluzion të lartë
- C) okluzion të kryqëzuar
- D) okluzion të ulët

E) okluzion të hapur

PS)C

Pyetja 626 V)2

Çfarë vlere ka elektroliza për skeletin:

- A) Për të eliminuar revestimentin
- B) Për të ilustruar skeletin
- C) Për të bërë elastik aliazhin
- D) Për të larguar oksidet nga skeleti

PS)D

Pyetja 627 V)2

Në çfarë temperature realizohet elektroliza:

- A) Në temperaturën e ambjentit
- B) Në temperaturën 20 – 30 grade Celsius
- C) Në temperaturën 40 – 60 grade Celsius
- D) Në temperaturën 80 – 100 grade Celsius

PS)C

Pyetja 628 V)2

Për të realizuar ribazimin e protezës parciale të skeletuar duhet:

- A) Të pastrohet sipërfaqja e brendshme e pllakës dhe të thahet
- B) Të gërryhet me freza laboratorike sipërfaqja e pllakës dhe kufijtë
- C) Të pastrohet me sablozë
- D) Nuk është e domosdoshme përpunimi

PS)B

Pyetja 629 V)2

Cili nga atashmentet ka stabilitet më të mirë:

- A) Atashmenti ekstradentar jo reziljent
- B) Atashmenti ekstradentar reziljent
- C) Atashmenti intradentar
- D) Atashmenti në formë shine

PS)C

Pyetja 630 V)1

Në çfarë vlere mesatare të reziljencës gingivare i përgjigjet atashmenti ekstradentar reziljent:

- A) Në reziljencën 0.3 mm
- B) Në reziljencën 0.6 mm
- C) Në reziljencën 0.9 mm
- D) Në reziljencën 1.2 mm

PS)A

Pyetja 631 V)2

Si realizohet vendosja e atashmentit në dhëmbët mbështetës të protezës së skeletuar:

- A) Në dorë të lirë
- B) Mbi procesin alveolar
- C) Me anë të pralelometrit
- D) Në anën distal të dhëmbit

PS)C

Pyetja 632 V)2

Në çfarë lloj mbyllje dhëmbët ballorë të dy nofullave bëjnë takim majë më majë :

- A) Në mbyllje Biprognatike
- B) Në mbyllje ortognatike
- C) Në mbyllje epistognatike
- D) Në mbyllje Eugnatike

PS)B

Pyetja 633 V)2

Në cilën zonë të palatumit ndodhen rrudhat palatine (Raffe palatine):

- A) Në pjesën e përparme të palatumit
- B) Në vijën mediane të palatumit
- C) Në zonën e Posdamit
- D) Në pjesën e prapme afër linjës -AH-

PS)A

Pyetja 634 V)2

Cili çift i gjendrave salivare e derdh pështymën në nivelin e molarit të parë sipër :

- A) Gjendrat submandibulare
- B) Gjendrat sublinguale
- C) Gjendrat Parotis
- D) Gjendrat limfatike

PS)C

Pyetja 635 V)2

Cilat gjendra salivare derdhen pështymën nëpërmjet kanalit të Wartonit :

- A) Gjendrat Parotis dhe submandibulare
- B) Gjendrat Parotis dhe sublinguale
- C) Gjendrat submandibulare dhe sublinguale
- D) Gjendrat Limfatike

PS)C

Pyetja 636 V)1

Çfarë force kontraktuese kanë dy muskujt Maseter së bashku :

- A) 100 kg
- B) 110 kg
- C) 130 kg
- D) 150 kg

PS)D

Pyetja 637 V)2

Çfarë sipërfaqe ka muskuli pterigoid i brendshëm :

- A) 3 cm katror
- B) 3.8 cm katror
- C) 4.9 cm katror
- D) 6.7 cm katror

PS)C

Pyetja 638 V)2

Çfarë force kontraktuese kanë dy muskujt pterigoid të brendshëm së bashku :

- A) 50 kg
- B) 70 kg
- C) 80 kg
- D) 100 kg

PS)C

Pyetja 639 V)2

Çfarë force kontraktuese kanë dy muskujt Temporal së bashku :

- A) 100 kg
- B) 140 kg
- C) 160 kg
- D) 190 kg

PS)C

Pyetja 640 V)2

Cili nga muskujt që ulin nofullën e poshtme përbëhet nga dy pjesë :

- A) Muskuli milolohyoid
- B) Muskuli genohyoid
- C) Muskuli digastrik
- D) Muskuli Temporal

PS)C

Pyetja 641 V)1

Në çfarë mbyllje dhëmbore ka vështirësi në lëvizjet anësore:

- A) Në mbylljen Eugnat
- B) Në mbylljen ortognat
- C) Në mbylljen Biprognatik
- D) Në mbylljen Epistognatik

PS)D

Pyetja 642 V)2

Në çfarë lloj mbyllje tuberkulat e dhëmbëve anësor të nofullës së sipërme futen në fisurën qendrore të sipërfaqeve përtypëse të dhëmbëve të nofullës së poshtme:

- A) Në mbyllje të thellë
- B) Në mbyllje të hapur
- C) Në mbyllje prognatike
- D) Në mbyllje të kryqëzuar

PS)D

Pyetja 643 V)1

Në çfarë lloj mbyllje dhëmbët ballorë të nofullës së poshtme mbulojnë dhëmbët ballorë të nofullës së sipërme:

- A) Në mbyllje prognatike
- B) Në mbyllje ortognatike
- C) Në mbyllje progenike
- D) Në mbyllje Biprognatike

PS)C

Pyetja 644 V)2

Në cilën klasë të Kennedit kemi defect të njëanshëm apo të dyanshëm të kufizuar :

- A) Klasa e parë e Kennedit
 - B) Klasa e dytë e Kennedit
 - C) Klasa e tretë e Kennedit
 - D) Klasa e katërt e Kennedit
- PS)C

Pyetja 645 V)1

Në cilën shkallë lëvizshmërie dhëmbi natyrorë ka dhe lëvizje mezio-distale:

- A) Shkalla e parë
 - B) Shkalla e dytë
 - C) Shkalla e tretë
 - D) Shkalla e katërt
- PS)C

Pyetja 646 V)2

Në cilën shkallë lëvizshmërie dhëmbi natyror ka lëvizje vestibulo-palatinale :

- A) Shkalla e parë
 - B) Shkalla e dytë
 - C) Shkalla e tretë
 - D) Shkalla e katërt
- PS)B

Pyetja 647 V)2

Në cilën fazë të përgatitjes speciale përgatiten vendet për krahët mbështetës të krosesë :

- A) Përgatitja terapeutike
 - B) Përgatitje kirurgjikale
 - C) Përgatitja Ortodontike
 - D) Përgatitja Ortopedike (protetike)
- PS)D

Pyetja 648 V)2

Në cilën sistem retentive të protezës parciale, lidhja e protezës parciale me dhëmbin bëhet nëpërmjet matricës dhe patricës :

- A) Sistemi retentive sipas Akersit
 - B) Sistemi Ney i retensionit
 - C) Sistemi i Atashmenteve
 - D) Sistemi i koronave teleskopike
- PS)C

Pyetja 649 V)1

Çfarë shpërndarje të forcave përtypëse bëjnë koronat teleskopike :

- A) Horizontale
- B) Aksiale
- C) Rrotulluese
- D) Diagonale

PS)B

Pyetja 650 V)2

Kur mund të realizohet riparimi i protezës parciaie me pllakë në klinikë :

- A) Kur kemi thyerje në mes të pllakës së protezës
- B) Kur kemi humbje të një pjese të pllakës së protezës
- C) Kur kemi dëmtim të krosheve
- D) Kur kemi për të zëvendësuar një dhëmb proteze të frakturuar

PS)D

Pyetja 651 V)2

Në çfarë moshe buza prerëse e dhëmbëzuar e dhëmbëve prerës në fëmijë lëmohe:

- A) 6 - 8 vjeç
- B) 8 - 10 vjeç
- C) 10 - 12 vjeç
- D) 14 - 15 vjeç

PS)C

Pyetja 652 V)1

Në cilën shkallë të abrazionit kemi abradim të dentinës :

- A) Shkalla e parë
- B) Shkalla e dytë
- C) Shkalla e tretë
- D) Shkalla e katërt

PS)B

Pyetja 653 V)2

Në cilën shtresë të mukozës kemi ind lidhor me fije elastike, enë gjaku, nerva, enë limfatike si dhe gjendra dhjamore :

- A) Shtresa e parë e mukozës

- B) Shtresa e mukozës së vërtetë
 - C) Shtresa e submukozës
 - D) Shtresa e mukozës së lëvizshme
- PS)C

Pyetja 654 V)2

Cila nga shtresat e mukozës është vazhdimisht në ripërtëritje :

- A) Shtresa e parë sipërfaqësore
 - B) Shtresa e mukozës së vërtetë
 - C) Shtresa e submukozës
 - D) Shtresa e lëvizshme aktive
- PS)A

Pyetja 655 V)1

Si është vlerësuar reziljenca e mukozës nga autorë të ndryshëm në nofullën e sipërme :

- A) 0.0 - 0.5 mm
 - B) 0.6 - 1.6 mm
 - C) 0.9 - 2.7 mm
 - D) 1.2 - 3.7 mm
- PS)B

Pyetja 656 V)1

Si është vlerësuar reziljenca e mukozës nga autorë të ndryshëm në nofullën e poshtme :

- A) 0.0 - 0.2 mm
 - B) 0.3 - 0.6 mm
 - C) 0.8 - 1 mm
 - D) 1.1 - 1.6 mm
- PS)B

Pyetja 657 V)1

Në cilën zonë të mukozës së lëvizshme shtrihet pllaka e protezës dhe ndikon në rritjen e qëndrueshmërisë së saj :

- A) Në mukozën aktive të lëvizshme
 - B) Në mukozën pasive të lëvizshme
 - C) Në zonën e submukozës
 - D) Në zonën e gjendrave
- PS)B

Pyetja 658 V)2

Në çfarë zone të nofullës së sipërme gjendet tuberi maksilar:

- A) Në zonën e dhëmbëve ballor
- B) Në zonën e kaninëve
- C) Në zonën e paradhëmballëve
- D) Në zonën e molarëve

PS)D

Pyetja 659 V)2

Kur përfshihet nga pllaka e protezës tuberkuli alveolar mandibule :

- A) Kur është i fiksuar (nuk lëviz)
- B) Kur është i lëvizshëm
- C) Kur është i butë
- D) Kur është hipertrofikë

PS)A

Pyetja 660 V)1

Dhëmbët në arkadë qëndrojnë në bazë të një ekuilibri të ballancuar forcash :

- A) Në bazë të dy forcave
- B) Në bazë të tre forcave
- C) Në bazë të katër forcave
- D) Në bazë të gjashtë forcash

PS)C

Pyetja 661 V)2

Në sistem dhëmbor me mangësi, kur kemi grupe funksionale :

- A) Kur nënjërën nofull kemi 3-4 dhëmbë rradhazi
- B) Kur në njëërën nofull kemi defect në zonën ballore
- C) Kur në dy nofullat kemi grupe dhëmbësh që okludojnë
- D) Kur dhëmbët e njëërës nofull nuk kanë antagonist

PS)C

Pyetja 662 V)2

Çfarë ndodh në dhëmbët ballorë kur ato janë grupe funksionale dhe përdoren për përtypje :

- A) Abradohen
- B) Ruhet gjendja e tyre fillestare
- C) Ruhet forma e dhëmbëve
- D) Ndryshojnë ngjyrë

PS)A

Pyetja 663 V)1

Çfarë mungesa dhëmbore përfshihen në klasin e parë të Wildit:

- A) Defekte të njëanëshme të pakufizuar
- B) Defekte të dyanëshme të pakufizuar
- C) Defekte të vogla deri në tre dhëmbë
- D) Defekte të mëdha deri në 8 dhëmbë

PS)C

Pyetja 664 V)2

Çfarë mungesa dhëmbore kemi në klasin e katërt sipas Wildit :

- A) Mungesa deri në 5 dhëmbë
- B) Mungesa deri në 8 dhëmbë
- C) Mungesa deri në 10 dhëmbë
- D) Mungesë të plotë të sistemit dentar

PS)D

Pyetja 665 V)1

Në cilën shkallë të lëvizshmërisë së dhëmbit kemi lëvizshmëri fiziologjike :

- A) Shkalla e parë
- B) Shkalla e dytë
- C) Shkalla e tretë
- D) Shkalla e katërt

PS)A

Pyetja 666 V)2

Si vlerësohet krahu i krosesë që vendoset në anën vestibulare të dhëmbit :

- A) Krahu mbështetës
- B) Krahu stabilizues
- C) Krahu fiksues
- D) Retension indirekt

PS)C

Pyetja 667 V)2

Si vlerësohet krahu i krosesë që vendoset në anën palatinale apo lingual të dhëmbit :

- A) Krahu stabilizues
- B) Krahu fiksues

- C) Krah mbështetës
 - D) Krah retentiv
- PS)A

Pyetja 668 V)1

Cili nga elementët e protezës nuk e lejon protezën të fundoset :

- A) Pllaka e protezës
 - B) Krah fiksues i kroshe
 - C) Krah stabilizues i kroshe
 - D) Krah mbështetës i kroshe
- PS)D

Pyetja 669 V)2

Çfarë këndi duhet të ketë lidhësi sekondar me krahun mbështetës të kroshe :

- A) Këndi 50 grade
 - B) Këndi 70 grade
 - C) Këndi 90 grade
 - D) Këndi 120 grade
- PS)C

Pyetja 670 V)2

Në cilët dhëmbë përdoret kryesisht krosheja në formë -Y- :

- A) Në dhëmbët central
 - B) Në dhëmbë kanin të shkurtër
 - C) Në premolar e molar me kurora të shkurtra
 - D) Në molar me kurora të larta
- PS)C

Pyetja 671 V)2

Çfarë vendosje duhet të kenë retensionet indirekte tek Protezat e Skeletuara në krahasim me retensionet direkte :

- A) Duhet të jenë afër protezës
 - B) Duhet të jenë së bashku me retensionet direkte
 - C) Duhet të jenë larg bazës së protezës
 - D) Duhet të vendosen në anën vestibulare të dhëmbëve
- PS)C

Pyetja 672 V)1

Në klasin e parë të Kennedit retensionet indirekte vendosen :

- A) Në margot incizale të dhëmbëve ballorë
- B) Në sipërfaqet okluzale të dhëmbëve
- C) Në sipërfaqet palatinale apo lingual të dhëmbëve
- D) Në anët vestibulare të dhëmbëve

PS)C

Pyetja 673 V)2

Në klasin e dytë të Kennedit retensioni indirect vendoset :

- A) Në margot incizale të dhëmbëve
- B) Në sipërfaqet vestibulare të disa dhëmbëve
- C) Në sipërfaqen palatinale apo linguale të dhëmbëve
- D) Vendoset kroshe tek premolari i parë në anë të kundërt të defektit

PS)D

Pyetja 674 V)2

Çfarë largësie duhet të kenë buzët e lugës së serisë nga nofulla për të krijuar shtresën e nevojshme për materialin e masës :

- A) 0.0 - 1 mm
- B) 2 - 3 mm
- C) 6 - 8 mm
- D) 9 - 12 mm

PS)B

Pyetja 675 V)2

Para se të përgatitet luga individuale a është e nevojshme të bëhet rregullimi i modelit :

- A) Nuk është e nevojshme
- B) Lyhet modeli me vaj recini
- C) Mbulohen dhëmbët në model dhe zonat retentive me dyll rozë
- D) Izolohet modeli me pudër talk

PS)C

Pyetja 676 V)2

Në pacientin për protezë totale, metoda e fleksionit të kokës prapa shfrytëzohet për të përcaktuar:

- A) Planin e okluzionit
- B) Lartësinë e okluzionit
- C) Përmasat e dhëmbëve artificiale

D) Pozicionin mezio-distal të mandibulës
PS)D

Pyetja 677 V)2

Në pacientin për protezë totale, metoda antropometrike (ndarja e fytyrës në kate të barabarta) shfrytëzohet për të përcaktuar :

A) Planin e okluzionit
B) Lartësinë e okluzionit
C) Përmasat e dhëmbëve artificial
D) Pozicionin mezio-distal të mandibulës
PS)B

Pyetja 678 V)2

Në pacientin për protezë totale, metoda e Walkoff-it (prekja e fundit të qiellzës me majën e gjuhës) shfrytëzohet për të përcaktuar :

A) Planin e okluzionit
B) Lartësinë e okluzionit
C) Pozicionin mezio-distal të mandibulës
D) Planin Camper
PS)C

Pyetja 679 V)2

Pamja e thelluar e plikave nasolabiale dhe e sulkusit labio mental, tregojnë për një:

A) Lartësi okluzioni më të lartë se sa duhet
B) Lartësi okluzioni më të ulët se sa duhet
C) Pozicion mezio-distal të gabuar
D) Plan okluzioni jo të saktë
PS)B

Pyetja 680 V)2

Pamja e tërhequr e plikave nasolabiale dhe e sulkusit labio mental, tregojnë për një:

A) Lartësi okluzioni më të madhe se sa duhet
B) Lartësi okluzioni më të ulët se sa duhet
C) Pozicion mezio-distal të gabuar
D) Plan okluzioni jo të saktë
PS)A

Pyetja 681 V)2

Në një pacient me mungesë të plotë të dhëmbëve, dalja e mentumit shumë përpara tregon për një:

- A) Atrofi pak të shprehur
 - B) Atrofi shumë të shprehur
 - C) Prognati
 - D) Ulje të tonusit muskular
- PS)B

Pyetja 682 V)2

Sipërfaqja vestibulare e centralëve maksilarë, në lidhje me përgjysmoren horizontale të papilës incizivale është:

- A) 1-2 mm më përpara
 - B) 7-9 mm më përpara
 - C) 4-5 mm më prapa
 - D) Në të njëjtin nivel
- PS)B

Pyetja 683 V)2

Sipërfaqja vestibulare e kanineve maksilare, në lidhje me pikën me distale të rugave palatine kanine është:

- A) 1-2 mm më përpara
 - B) 7-9 mm më përpara
 - C) 4-5 mm më përpara
 - D) Në të njëjtin nivel
- PS)B

Pyetja 684 V)2

Në pjesën frontale lartësia e shabllonit të sipërm duhet të jetë mesatarisht:

- A) 15mm
 - B) 18mm
 - C) 22mm
 - D) 27mm
- PS)C

Pyetja 685 V)2

Në pjesën frontale lartësia e shabllonit të poshtëm duhet të jetë mesatarisht:

- A) 15mm
- B) 18mm

- C) 22mm
 - D) 27mm
- PS)B

Pyetja 686 V)2

Në lidhje me kufirin e bashkimit të mukozës me papilla të gjuhës dhe mukozës së lëmuar të saj, plani I okluzionit I protezës totale duhet të jetë:

- A) Ne nivelin e bashkimit të dy mukozave
 - B) 2-3mm më lart se kufiri i bashkimit të dy mukozave
 - C) 2-3mm më ulët se kufiri i bashkimit të dy mukozave
 - D) 4-5mm më ulët se kufiri i bashkimit të dy mukozave
- PS)A

Pyetja 687 V)2

Sipas formulave të Pound-it, gjatësia e centraleve maksilarë është:

- A) Sa 1/160 e gjatësisë së trupit
 - B) Sa 1/16 e gjatësisë së fytyrës
 - C) Sa 1/16 e gjatësisë së fytyrës
 - D) Sa 1/10 e gjatësisë së fytyrës
- PS)B

Pyetja 688 V)2

Sipas formulave të Pound-it, gjatësia e centraleve maksilare është:

- A) Sa 1/160 e gjatësisë së trupit
 - B) Sa 1/16 e gjatësisë së fytyrës
 - C) Sa 1/16 e gjatësisë së fytyrës
 - D) Sa 1/10 e gjatësisë së fytyrës
- PS)C

Pyetja 689 V)2

Në rreshtimin e dhembëve në protezat totale në progeny:

- A) Frontalet lart rreshtohen më jashtë se normalisht
 - B) Frontalet lart rreshtohen më brenda se normalisht
 - C) Frontalet poshtë rreshtohen më jashtë se normalisht
 - D) Frontalet lart rreshtohen në mes të procesit alveolar
- PS)A

Pyetja 690 V)2

Ne rreshtimin e dhembeve ne protezat totale ne prognati:

- A) Frontalet lart rreshtohen me jashte se normalisht
- B) Frontalet lart rreshtohen me brenda se normalisht
- C) Frontalet poshte rreshtohen me brenda se normalisht
- D) Frontalet poshte rreshtohen ne mes te procesit alveolar

PS)B

Pyetja 691 V)2

Gjate rregullimit funksional te luges individuale te siperme, ne zonen e tuberave maksilare pacienti:

- A) Ben sikur fershellen
- B) Ben qeshje te ekzagjeruar (Ngerdheshet)
- C) Shqipton "Ah" te lehte e te zgjatur
- D) Hap gojen ne maksimum dhe leviz majtas-djathtas mandibulen

PS)D

Pyetja 692 V)2

Gjate rregullimit funksional te lugës individuale të sipërme, në zonën e vibrimit (post-damit), pacienti:

- A) Bën sikur fërshëllen
- B) Bën qeshje të ekzagjeruar (Ngërdheshet)
- C) Shqipton "Ah" të lehtë e të zgjatur
- D) Hap gojën në maksimum dhe lëviz majtas-djathtas mandibulën

PS)C

Pyetja 693 V)2

Në okludator punimet konstruktohen sipas okluzionit:

- A) Të balancuar unilateral
- B) Të balancuar bilateral
- C) Organik (të mbrojtur në mënyrë të dyanshme)
- D) Prognatik

PS)A

Pyetja 694 V)2

Në artikulator punimet konstruktohen sipas okluzionit:

- A) Të balancuar unilateral
- B) Të balancuar bilateral
- C) Organik (të mbrojtur në mënyrë të dyanshme)

D) Progenik
PS)B

Pyetja 695 V)2

Në rastin e atrofiave të shprehura të maksilës, papilla incizivale orienton për vendosjen (rreshtimin) e :

- A) Centralëve maksilarë
 - B) Lateralëve maksilarë
 - C) Kaninëve maksilarë
 - D) Centralëve mandibularë
- PS)A

Pyetja 696 V)2

Në rastin e atrofiave të shprehura të maksilës, ruga palatinale kanine orienton për vendosjen (rreshtimin) e :

- A) Centralëve maksilarë
 - B) Lateralëve maksilarë
 - C) Kaninëve maksilarë
 - D) Kaninëve mandibularë
- PS)C

Pyetja 697 V)2

Gjatë rreshtimit në okluzion normal, centralët maksilarë (11/21) kanë drejtimin:

- A) Qafa më e futur sesa margoja
 - B) Qafa më e dalë sesa margoja
 - C) Qafa në një nivel me margon
 - D) Sipas karakteristikave individuale
- PS)A

Pyetja 698 V)2

Gjatë rreshtimit në okluzion normal, lateralët maksilarë (12/22) kanë drejtimin:

- A) Qafa më e futur sesa margoja
 - B) Qafa më e dalë sesa margoja
 - C) Qafa në një nivel me margon
 - D) Sipas karakteristikave individuale
- PS)A

Pyetja 699 V)2

Në lidhje me planin horizontal, laterali maksilar (12/22) ka këtë raport:

- A) E takon me gjithë margon prerëse
- B) Qëndron 0,5-1mm më ulët
- C) Qëndron 0,5-1mm më lart
- D) Qëndron 2-3mm më lart

PS)C

Pyetja 700 V)2

Protezat me pllakë të reduktuar nuk mund të përdoren në pacientë me:

- A) Refleks të vjelli
- B) Humbje të shijes
- C) Atrofi të shprehur të maksilës
- D) Tubera maksilarë shumë të shprehur

PS)C

Pyetja 701 V)2

Në muflimin indirekt të protezës totale, gjatë vendosjes së modelit në bazën e muflës, mbulohen me allcinë e bazës së muflës:

- A) Dhëmbët artificialë
- B) Baza prej dylli e protezes
- C) Dhembet dhe baza e protezes
- D) Vetem anet e modelit

PS)D

Pyetja 702 V)2

Gjate ciklit te polimerizimit me nxehtesi te rezines, rekomandohet te mbahet temperatura konstante per rreth 1 ore ne intervalin :

- A) 20-30 grade
- B) 30-40 grade
- C) 40-50 grade
- D) 60-65 grade

PS)D

Pyetja 703 V)2

Ndikon pozitivisht ne qendrueshmerine e protezes totale te siperme nje qiellze e forte:

- A) Ne forme " U" je te permbysur
- B) Ne forme " V" je te permbysur
- C) E sheshte

D) Me mukoze me reziliencë të shtuar

PS)A

Pyetja 704 V)2

Rreshtimi I kryqëzuar I dhëmbëve distalë përdoret në:

A) Prognati

B) Okluzion normal

C) Okluzion të thellë

D) Atrofi të shprehur të të dyja nofullave

PS)D

Pyetja 705 V)2

Rreshtimi I kryqëzuar I dhëmbëve distalë përdoret në:

A) Okluzion normal

B) Okluzion të thellë

C) Prognati

D) Progeny

PS)D

Pyetja 706 V)2

Në rreshtimin e dhëmbëve në protezat totale në prognati, over-bite dhe over-jet :

A) Janë normale

B) Rriten

C) Zvogëlohen

D) Bëhen 0 (zero)

PS)B

Pyetja 707 V)2

Në rreshtimin e dhëmbëve në protezat totale në progeni, over-bite dhe over-jet :

A) Janë normale

B) Rriten

C) Ruhen të pandryshuara

D) Bëhen 0 (zero)

PS)D

Pyetja 708 V)2

Nëse një protezë totale e sipërme bie gjatë hapjes maksimale të gojës, kemi një kufi më të gjatë se sa duhet në zonën:

- A) Vestibulare frontale
 - B) E postdam-it (linjës Ah)
 - C) E plikave bukale
 - D) E sulkusit pterigomaksilar dhe ligamentit pterigo-mandibular
- PS)D

Pyetja 709 V)2

Baza e trashë e protezës gjatë modelimit me dyll, rrit mundësinë për :

- A) Stomatite protetike
 - B) Kafshim të faqeve
 - C) Porozitete në rezinë
 - D) Dekubituse
- PS)C

Pyetja 710 V)2

Në okluzionin e balancuar unilateral, gjatë lëvizjes laterale, në anën e punës kemi:

- A) Kontakt të dhëmbëve distalë lart dhe poshtë me tuberkulat me emër të kundërt
 - B) Kontakt të dhëmbëve distalë lart dhe poshtë me tuberkulat me emër të njëjtë
 - C) Mungesë kontakti midis dhëmbëve distalë lart dhe poshtë
 - D) Rrëshqitje të kaninit poshtë në sipërfaqen palatinale të kaninit lart
- PS)B

Pyetja 711 V)2

Fenomeni I alergjisë nga rezina e protezës shkaktohet nga:

- A) Polimeri (pluhuri)
 - B) Monomeri (lëngu)
 - C) Lëndët ngjyruese
 - D) Inhibitorët e rezinës
- PS)C

Pyetja 712 V)2

Gjatë polimerizimit primar të rezinës, faza ku fillon reaksioni kimik I polimerizimit ndërmjet polimerit dhe monomerit, është faza e :

- A) Parë
 - B) Dytë
 - C) Tretë
 - D) Katërt
- PS)B

Pyetja 713 V)2

Nëse gjatë përzierjes së polimerit me monomerin prishet raporti pluhur-lëng duke shtuar sasinë e monomerit (lëngut), proteza e përfunduar do të :

- A) Ketë lartësi okluzioni më të madhe
 - B) Ketë kufinj jo të saktë
 - C) Japë ngacmim të mukozës
 - D) Shkaktojë dekubituse
- PS)C

Pyetja 714 V)2

Në atrofitë e shprehura mund të shkaktohen dhimbje nevralgjike nga komprimimi i nervit dhe dalja në mes të kreshtës reziduale i :

- A) Foramen palatinum major
 - B) Foramen palatinum minor
 - C) Foramen incizivale
 - D) Foramen mentale
- PS)D

Pyetja 715 V)2

Mund të realizohet me riparim direkt në gojën e pacientit:

- A) Shtesa e një krosheje
 - B) Shtesa e disa dhëmbëve
 - C) Shtesa e një pjese të vogël të pllakës vestibulare
 - D) Ngjitja e dy pjesëve të thyera
- PS)C

Pyetja 716 V)2

Ribazimi indirekt kryhet kur:

- A) Proteza është thyer dhe fragmentet përputhen
 - B) Proteza ka gabim okluzioni
 - C) Ka ulje të lartësisë së okluzionit
 - D) Proteza lëviz se ka ndryshuar forma e kreshtave reziduale
- PS)D

Pyetja 717 V)2

Gjatë parapërgatitjes kirurgjikale të gojës për protezë immediate ekstrahohen:

- A) Të gjithë dhëmbët e mbetur
- B) Dhëmbët frontalë dhe ruhen distalët
- C) Dhëmbët distalë dhe ruhet vetëm një çift që ruan lartësinë e okluzionit
- D) Sipas dëshirës së pacientit

PS)C

Pyetja 718 V)2

Nëse gjatë përzierjes së polimerit me monomerin prishet raporti pluhur-lëng duke shtuar sasinë e polimerit (pluhuri), proteza e përfunduar do të :

- A) Ketë lartësi okluzioni më të madhe
- B) Ketë lartësi okluzioni më të madhe
- C) Japë ngacmim të mukozës
- D) Pësojë deformim gjatë polimerizimit

PS)D

Pyetja 719 V)2

Zona muskulare me tonus (tonicitet) të lartë, që ndikon pozitivisht në qëndrueshmërinë e protezës totale, është:

- A) Modiolusi
- B) Muskuli mylohioid
- C) Muskujt pterigoid-lateralë
- D) Muskujt geniohioid

PS)A

Pyetja 720 V)2

Modelimi konkav I pllakës vestibulare distale të protezës shkakton:

- A) Atrofi më të shpejtë të kreshtave
- B) Stomatit protetik
- C) Grumbullim të mbeturinave ushqimore
- D) Kafshim të gjuhës

PS)C

Pyetja 721 V)2

Modelimi konkav I pllakës vestibulare distale të protezës shkakton:

- A) Atrofi më të shpejtë të kreshtave
- B) Kafshim të faqeve
- C) Vështirësi në shqiptimin e germës "S"
- D) Kafshim të gjuhës

PS)B

Pyetja 722 V)3

Linja anteriore e vibrimit zakonisht ka formë :

- A) Të drejtë
 - B) Konkave
 - C) Konvekse
 - D) Të lakuar të dyfishtë (bikonkave)
- PS)D

Pyetja 723 V)3

Në atrofi të shprehura të mandibulës, fossa (gropa) artikulare:

- A) Zgjerohet (bëhet më e cekët)
 - B) Nuk ndryshon
 - C) Bëhet më e thellë
 - D) Varet nga karakteristikat individuale të pacientit
- PS)A

Pyetja 724 V)3

Në pacientët me protezë totale :

- A) Relacioni qendror është rreth 0,5 -1mm më përpara se okluzioni qendror
 - B) Relacioni qendror është rreth 0,5 -1mm më prapa se okluzioni qendror
 - C) Relacioni qendror përputhet me okluzionin qendror
 - D) Relacioni qendror është rreth 3-4mm më përpara se okluzioni qendror
- PS)C

Pyetja 725 V)3

Këndi I pjerrësisë së kondileve formohet gjatë :

- A) Lëvizjes së hapjes së gojës
 - B) Lëvizjes së mbylljes së gojës
 - C) Lëvizjes laterale të mandibulës
 - D) Lëvizjes propulsive të mandibulës
- PS)D

Pyetja 726 V)3

Këndi I Bennet-it ka mesatarisht një vlerë prej:

- A) 30 gradë
- B) 40 gradë

- C) 17 gradë
 - D) 37 gradë
- PS)C

Pyetja 727 V)3

Metoda e polimerizimit të rezinës me presion (SR-Ivocap) ka avantazh kryesor:

- A) Kohën më të shkurtër të polimerizimit
 - B) Evitimin e tkurrjes dhe deformimit të protezës
 - C) Lidhjen më të fortë midis dhëmbëve dhe rezinës
 - D) Peshën më të ulët të protezës së përfunduar
- PS)B

Pyetja 728 V)3

Këndi I Pjerrësisë së kondileve ka mesatarisht një vlerë prej:

- A) 30-33 gradë
 - B) 50-60 gradë
 - C) 17 gradë
 - D) 7 gradë
- PS)A

Pyetja 729 V)3

Midis planit Camper dhe planit të okluzionit ka një distancë mesatarisht :

- A) 14mm
 - B) 24mm
 - C) 34mm
 - D) 44mm
- PS)C

Pyetja 730 V)3

Linja që bashkon spina nasalis anterior me porus acusticus externus (tragusin e veshit) përfaqëson:

- A) Planin Camper
 - B) Horizontalen e Frankfurtit
 - C) Kurbën Spee
 - D) Kurbën Willson
- PS)A

Pyetja 731 V)3

Linja që bashkon pikën më të ulët të margos infraorbitale me porus acusticus externus (tragusin e veshit) përfaqëson:

- A) Planin Camper
 - B) Horizontalen e Frankfurtit
 - C) Kurbën Spee
 - D) Kurbën Willson
- PS)B

Pyetja 732 V)3

Në teknikën seksionale (zonale) të rregullimit funksional të lugës individuale përdoret si material:

- A) Bazis plate
 - B) Rezina fotopolimerizuese
 - C) Repina (oksid zink-eugenoli)
 - D) Dylli kerr
- PS)D

Pyetja 733 V)3

Në teknikën globale (në një kohë) të rregullimit funksional të lugës individuale përdoret si material:

- A) Bazis plate
 - B) Rezina fotopolimerizuese
 - C) Silikoni A (adicioni)
 - D) Dylli kerr
- PS)C

Pyetja 734 V)3

Hapësira neutrale e ekuilibrit protetik përfaqëson zonën (hapësirën) ku duhet të vendosen:

- A) Kufiri I protezave të përfunduara
 - B) Pllakat (bazat) e protezave
 - C) Dhëmbët artificialë të dy protezave
 - D) Gjuha dhe muskuli mylohioid
- PS)C

Pyetja 735 V)3

Mukoza neutrale (pasive e lëvizshme) përfaqëson zonën ku duhet të vendoset:

- A) Kufiri I protezave të përfunduara
- B) Pllaka (baza) e protezave

- C) Dhëmbët artificialë të dy protezave
 - D) Gjuha dhe muskuli mylohioid
- PS)A

Pyetja 736 V)3

Ngacimet kronike nga një kufi i gjatë, i hollë dhe prerës i bazës së protezës mund të shkaktojnë:

- A) Stomatit protetik
 - B) Kreshta fluktuante
 - C) Atrofi të zonës përkatëse
 - D) Hiperplazi të mukozës
- PS)D

Pyetja 737 V)3

Kur konstatohet gabim okluzioni në një protezë totale të përfunduar, difekti mund të korigjohet duke:

- A) Përsëritur të dy protezat
 - B) Përsëritur një nga protezat
 - C) Bërë ribazim indirekt të protezave
 - D) Bërë ribazim direkt të protezave
- PS)B

Pyetja 738 V)3

Në pacientët me dhëmbë natyralë dhe punime fikse Relacioni qendror :

- A) është rreth 0,5 -1mm më përpara se okluzioni qendror
 - B) është rreth 0,5 -1mm më prapa se okluzioni qendror
 - C) përputhet me okluzionin qendror
 - D) është rreth 3-4mm më përpara se okluzioni qendror
- PS)B

Pyetja 739 V)3

Në pacientin për protezë totale, metoda grafike (me përdorimin e gnatometrit) shfrytëzohet për të përcaktuar :

- A) Planin e okluzionit
 - B) Lartësinë e okluzionit
 - C) Përmasat e dhëmbëve artificiale
 - D) Pozicionin mezio-distal të mandibulës
- PS)D

Pyetja 740 V)3

Në artikulatorin me rregullim të pjesshëm, gjatë vendosjes së modeleve sipas regjistrimeve me hark facial, në artikulator vendoset:

- A) Fillimisht Modeli I sipërm
- B) Fillimisht Modeli I poshtëm
- C) Të dy modelet njëherësh
- D) Sipas zgjedhjes së laborantit

PS)A

Pyetja 741 V)3

Mungesa e Koridorit bukal në protezën totale, bën që:

- A) Arkada dentare të duket shumë e gjerë
- B) Arkada dentare të duket shumë e ngushtë
- C) Arkada dentare të duket josimetrike
- D) Plani I okluzionit të duket I shtrembër

PS)A

Pyetja 742 V)3

Silikoni light A(adicioni) përdoret në protezat totale për:

- A) Marrje mase anatomike
- B) Marrje mase funksionale
- C) Ribazim direkt
- D) Riparim indirekt

PS)B

Pyetja 743 V)3

Gjatë shqiptimit të germës "Ah" të lehtë dhe të zgjatur, tek pacienti vërehet:

- A) Ulje poshtë e qiellzës së butë
- B) Ngritje lart e qiellzës së butë
- C) Tërheqje e ligamenteve pterigo-mandibularë
- D) Formimi I hapësirës minimale fonetike

PS)B

Pyetja 744 V)3

Gjatë shqiptimit të germës "S" tek pacienti vërehet:

- A) Ulje poshtë e qiellzës së butë
- B) Ngritje lart e qiellzës së butë

- C) Tërheqje e ligamenteve pterigo-mandibularë
 - D) Formimi I hapësirës minimale fonetike
- PS)D

Pyetja 745 V)3

Gjatë shqiptimit të germës "Ah" të prerë dhe të fortë, ose gjatë shfryrjes së hundës me vrima të mbyllura, tek pacienti vërehet:

- A) Ulje poshtë e qiellzës së butë
 - B) Ngritje lart e qiellzës së butë
 - C) Tërheqje e ligamenteve pterigo-mandibularë
 - D) Formimi I hapësirës minimale fonetike
- PS)A

Pyetja 746 V)3

Gjatë shqiptimit të germës "Ah" të lehtë dhe të zgjatur, tek pacienti formohet:

- A) Linja anteriore e vibrimit
 - B) Linja posteriore e vibrimit
 - C) Hapësira minimale fonetike
 - D) Hapësira e lirë fiziologjike
- PS)B

Pyetja 747 V)3

Gjatë shqiptimit të germës "Ah" të prerë dhe të fortë, ose gjatë shfryrjes së hundës me vrima të mbyllura, tek pacienti formohet:

- A) Linja anteriore e vibrimit
 - B) Linja posteriore e vibrimit
 - C) Hapësira minimale fonetike
 - D) Hapësira e lirë fiziologjike
- PS)A

Pyetja 748 V)3

Në metodën e lodhjes së muskujve gjatë përcaktimit të okluzionit qendror, pacientin e instruktojmë të bëjë :

- A) Lëvizje hapje dhe mbyllje të gojës
 - B) Lëvizje laterale dhe propulsive
 - C) Lëvizje të kokës në gjithë drejtimet
 - D) Lëvizje të gjuhës dhe gëlltitje
- PS)B

Pyetja 749 V)3

Gjatë shqiptimit të germës "M" tek pacienti formohet:

- A) Linja anteriore e vibrimit
- B) Linja posteriore e vibrimit
- C) Hapësira minimale fonetike
- D) Hapësira e lirë fiziologjike

PS)D

Pyetja 750 V)3

Në teknikën globale (në një kohë) të rregullimit funksional të lugës individuale përdoret si material:

- A) Bazis plate
- B) Rezina fotopolimerizuese
- C) Pasta e oksid zink-eugenolit (repina)
- D) Dylli kerr

PS)C

Pyetja 751 V)3

Nëpërmjet Harkut facial tek pacienti regjistrohet:

- A) Gjatësia e brinjës së Trekëndëshit të Bonwill-it
- B) Pozicioni I Okluzionit qendror
- C) Lartësia e okluzionit
- D) Madhësia e maksilës

PS)A

Pyetja 752 V)3

Në artikulatorët me vlera individuale ose pjesërisht individuale, aksesori "Guida Bi-dimensionale" (kalota) ka të inkorporuar:

- A) Planin Camper
- B) Horizontalen e Frankfurtit
- C) Guidën kondilare
- D) Dy kurbat e kompensimit Spee dhe Willson

PS)D

Pyetja 753 V)3

Në dhëmbët natyralë të pa abraduar, këndi I pjerrësisë së tuberkulave është mesatarisht:

- A) 10-12 gradë

- B) 20-22 gradë
 - C) 30-33 gradë
 - D) 40-45 gradë
- PS)C

Pyetja 754 V)3

Në dhëmbët artificialë me morfologji të reduktuar, që përdoren në protezat e lëvizshme, këndi I pjerrësisë së tuberkulave është:

- A) 10-12 gradë
 - B) 20-22 gradë
 - C) 30-33 gradë
 - D) 40-45 gradë
- PS)B

Pyetja 755 V)3

Në dhëmbët artificialë anatomikë, që përdoren në protezat e lëvizshme, këndi I pjerrësisë së tuberkulave është:

- A) 10-12 gradë
 - B) 20-22 gradë
 - C) 30-33 gradë
 - D) 40-45 gradë
- PS)C

Pyetja 756 V)3

Në dhëmbët artificialë joanatomikë, që përdoren në protezat e lëvizshme, këndi I pjerrësisë së tuberkulave është:

- A) 0 gradë
 - B) 10-12 gradë
 - C) 30-33 gradë
 - D) 20-25 gradë
- PS)A

Pyetja 757 V)3

Në artikulatorët me vlera mesatare, aksesori që orienton për vendosjen e modeleve në artikulator dhe rreshtimin e dhëmbëve përfaqëson:

- A) Planin horizontal
- B) Planin e okluzionit
- C) Planin sagital
- D) Kurbën Willson

PS)

Pyetja 758 V)3

Brinja e Trekëndëshit të Bonwill-it është mesatarisht:

- A) 10,8 mm
- B) 100-108 mm
- C) 180-188mm
- D) 158mm

PS)B

Pyetja 759 V)3

Kurba Spee formohet në planin:

- A) Frontal
- B) Horizontal
- C) Sagital
- D) Në të tre planet

PS)C

Pyetja 760 V)3

Kurba Willson formohet në planin:

- A) Frontal
- B) Horizontal
- C) Sagital
- D) Në të tre planet

PS)A

Pyetja 761 V)3

Boshti gjatësor I lateralëve maksilarë (12/22) në lidhje me planin sagital:

- A) Konvergon distalisht
- B) Divergon distalisht
- C) Divergon mezialisht
- D) Është paralel

PS)B

Pyetja 762 V)3

Këndi Gotik (I lëvizjeve laterale në pikën incizivale) ka një vlerë mesatare prej:

- A) 33 gradë

- B) 90 gradë
 - C) 120 gradë
 - D) 150 gradë
- PS)C

Pyetja 763 V)3

Gjatë përcaktimit të okluzionit qendror, me metodën e lodhjes së muskujve, ne tentojmë të lodhim muskujt:

- A) Masseter
 - B) Temporal
 - C) Pterigoid lateral
 - D) Mylohioid
- PS)C

Pyetja 764 V)3

Adezioni ndërmjet pllakës së protezës dhe mukozës rritet kur:

- A) Rritet sipërfaqja e kontaktit
 - B) Zvogëlohet sipërfaqja e kontaktit
 - C) Rritet distanca midis protezës dhe mukozës
 - D) Ulet sasia e pështymës
- PS)A

Pyetja 765 V)3

Gravimet bëhen në zona të mukozës ku reziliencia e saj është:

- A) E ulët
 - B) Mesatare
 - C) E lartë
 - D) Mungon
- PS)C

Pyetja 766 V)3

Lehtësimet ortopedike bëhen në zona të mukozës ku reziliencia e saj është:

- A) E ulët ose mungon
 - B) Mesatare
 - C) E lartë
 - D) Shumë e lartë
- PS)A

Pyetja 767 V)3

Kreshtat fluktuante shkaktohen nga:

- A) Dekubituse të kronicizuar
 - B) Stomatite protetike
 - C) Mbingarkesa e regjionit frontal të procesit alveolar
 - D) Proteza të trasha e poroze
- PS)C

Pyetja 768 V)3

Masat hiperplazike shkaktohen nga:

- A) Ngacmim kronik (I përsëritur) nga proteza
 - B) Stomatitet protetike
 - C) Kandidoza
 - D) Proteza me kufinj të trashë
- PS)A

Pyetja 769 V)3

Mbetjet e dyllit në brendësi të muflës, të paeleminuara gjatë procedurës së shplarjes, do të shkaktojnë në protezën e përfunduar:

- A) Parakontakte në okluzion
 - B) Rritje të lartësisë së okluzionit
 - C) Mos forcim të plotë të rezinës
 - D) Tkurrje të rezinës
- PS)C

Pyetja 770 V)3

Këndi I pjerrësisë së kondileve (pjerrësia e rrugës kondilare) është mesatarisht :

- A) 13 gradë
 - B) 23 gradë
 - C) 33 gradë
 - D) 43 gradë
- PS)C

Pyetja 771 V)3

Këndi I pjerrësisë incizale është mesatarisht :

- A) 10 gradë
- B) 20 gradë
- C) 30 gradë

D) 40 gradë

PS)D

Pyetja 772 V)3

Sindroma e djegies së gojës haset më shumë:

A) Në burra mbi 50 vjec

B) Në gratë në menopauz

C) Njësoj në të dy sekset

D) Në persona me tonus muskular të ulët

PS)B

Pyetja 773 V)3

Në kandidozat orale mjekimi medikamentoz shoqërohet me ribazim:

A) Direkt të protezës me rezinë të fortë vetëpolimerizuese

B) Direkt të protezës me materiale elastike

C) Indirekt, ku hiqet gjithë baza e protezës

D) Indirekt, ku vishet me material të ri baza ekzistuese

PS)C

Pyetja 774 V)3

Materialet me të cilat merret masa funksionale duhet te :

A) Forcohen shpejt

B) Forcohen ngadalë

C) Jenë hidrofobë

D) Jenë termoplastikë

PS)B

Pyetja 775 V)3

Për të rritur stabilitetin e protezës totale të poshtme, molarët e parë poshtë (36/46) duhet të vendosen:

A) Në pikën më të ulët të procesit alveolar

B) Në pikën më të lartë të procesit alveolar

C) Sa më të lingualizuar

D) Sa më të vestibularizuar

PS)A

Pyetja 776 V)3

Materialet me të cilat merret masa funksionale duhet te :

- A) Forcohen shpejt
 - B) Jenë hidrofile
 - C) Jenë hidrofobe
 - D) Jenë termoplastikë
- PS)B

Pyetja 777 V)3

Porozitetet në rezinën e bazës së protezës favorizohen nga:

- A) Ngritja e shpejtë e temperaturës gjatë ciklit të polimerizimit
 - B) Baza e hollë e protezës
 - C) Mbetje të dyllit në brendësi të muflës
 - D) Modelimi jo i mirë i dyllit
- PS)A

Pyetja 778 V)3

Në protezën totale dhëmbët artificialë duhet të vendosen në zonën ku:

- A) Predominojnë forcat e faqeve
 - B) Predominon forca e gjuhës
 - C) Predominon forca e buzëve
 - D) Barazohet forca e gjuhës, me forcën e faqeve dhe të buzëve
- PS)D

Pyetja 779 V)3

Në kandidozat orale mjekimi medikamentoz shoqërohet me :

- A) Ribazim Direkt të protezës me rezinë vetëpolimerizuese
 - B) Ribazim Direkt të protezës me materiale elastike
 - C) Përgatitjen e një proteze të re
 - D) Ribazim Indirekt, ku vishet me material të ri baza ekzistuese
- PS)C

Pyetja 780 V)3

Këndi që formohet ndërmjet Planit Camper dhe Horizontales së Frankfurtit është rreth:

- A) 15 gradë
 - B) 25 gradë
 - C) 30 gradë
 - D) 40 gradë
- PS)A

Pyetja 781 V)3

Në personat me dhëmbë natyralë, pozicioni I relacionit qendror përputhet me okluzionin qendror në :

- A) 5-10% të njerëzve
- B) 20 % të njerëzve
- C) 50 % të njerëzve
- D) 100 % të njerëzve

PS)A

Pyetja 782 V)3

Në personat me proteza totale, pozicioni I relacionit qendror përputhet me okluzionin qendror në :

- A) 5-10% të njerëzve
- B) 20 % të njerëzve
- C) 50 % të njerëzve
- D) 100 % të njerëzve

PS)D

Pyetja 783 V)3

Gatë lëvizjes në planin sagital, kur mandibula lëviz lateralisht në njëren anë, kondili I anës së kundërt :

- A) Lëviz përpara dhe poshtë
- B) Lëviz prapa dhe lart
- C) Lëviz prapa dhe poshtë
- D) Rri në të njëjtin pozicion

PS)A

Pyetja 784 V)3

Në një artikulation temporo-mandibular disfunksional, në fazën fillestare të hapjes së gojës, disku artikular ndodhet:

- A) Para kondilit artikular
- B) Prapa kondilit artikular
- C) Në mes kondilit dhe fosës artikulare
- D) Varet nga veçoritë individuale

PS)A

Pyetja 785 V)3

Tek okludatorët, distanca midis dhëmbëve dhe aksit të rrotullimit (rotacionit) është:

- A) Sa distanca reale në kafkë
- B) Më e gjatë se distanca në kafkë
- C) Më e shkurtër se distanca në kafkë
- D) Varet nga veçoritë individuale

PS)C

Pyetja 786 V)3

Në artikulorët Arkon elementet kondilarë dhe fosat mekanike janë të vendosura në:

- A) Elementet kondilarë lart, fosat poshtë
- B) Elementet kondilarë poshtë, fosat lart
- C) Dhe Elementet kondilarë dhe fosat në pjesën e sipërme
- D) Dhe Elementet kondilarë dhe fosat në pjesën e poshtme

PS)B

Pyetja 787 V)3

Në artikulorët JoArkon elementet kondilarë dhe fosat mekanike janë të vendosura :

- A) Elementet kondilarë lart, fosat poshtë
- B) Elementet kondilarë poshtë, fosat lart
- C) Dhe Elementet kondilarë dhe fosat në pjesën e sipërme
- D) Dhe Elementet kondilarë dhe fosat në pjesën e poshtme

PS)A

Pyetja 788 V)3

Ndërtimi anatomik I Artikulacionit Temporo-Mandibular dhe I kapsulës artikulare, bën që të jenë shumë të kufizuara lëvizjet e tij:

- A) Propulsive (përpara)
- B) Retropulsive (prapa)
- C) Majtas
- D) Djathtas

PS)B

Pyetja 789 V)3

Në pacientin me mungesë të plotë të dhëmbëve, kondilet artikulare në fosë janë të zhvendosur:

- A) Anterior
- B) Inferior
- C) Superior
- D) Postero-superior

PS)D

Pyetja 790 V)3

Në stabilizimin më të mirë të protezave luan rol pozitiv muskuli:

- A) Bucinator
- B) Sternocleidomastoid
- C) Geniogloss
- D) Masseter

PS)A

Pyetja 791 V)3

Masa pa presion aplikohet në:

- A) Atrofi të shprehur të kreshtave reziduale
- B) Mukozë të hollë e atrofike
- C) Mukozë me reziliencë të shtuar
- D) Mukozë me kandidozë e stomatite

PS)C

Pyetja 792 V)3

Gjuha në formën e manaferrave paraqitet ne fëmije:

- A) Variçel
- B) Skarlatine
- C) Difteria
- D) Fruthi

PS)B

Pyetja 793 V)3

Shënja e pare klinike në një gingivit është :

- A) Gjakosje spontane
- B) Ndryshimi i formës së buzëve gingivale
- C) Gjakosje në prekje me sondë
- D) Prezenca e eksudatit

PS)C

Pyetja 794 V)3

Mekanizmi antikarioz i fluorit shprehet:

- A) Mbi pështymën

- B) Mbi smaltin
 - C) Mbi pulpën
 - D) Mbi pllakën bakteriale
- PS)B

Pyetja 795 V)3

Sistemi dentar i qumshtit kompletoht në:

- A) 20 muaj
 - B) 30 muaj
 - C) 40 muaj
 - D) 50 muaj
- PS)B

Pyetja 796 V)3

Embrioni i kaninit të përhershëm fillon të zhvillohet në :

- A) Në javën e 15 të jetës intrauterine
 - B) Në javën e 20 të jetës intrauterine
 - C) Në javën e 22 të jetës intrauterine
 - D) Në javën e 25 të jetës intrauterine
- PS)D

Pyetja 797 V)3

Mbeturinat Malasses mund të derivojnë:

- A) Nga Guajana Herving
 - B) Gjenden në granulomën apikale
 - C) Nga lamina dentare
 - D) Të gjitha opsionet janë të mundshme
- PS)D

Pyetja 798 V)3

Lënda inorganike në dhëmbë ka më shumë:

- A) Fluorapatit
 - B) Hidroksiapatit
 - C) Carbonatapatit
 - D) Oktacalciumfosfat
- PS)B

Pyetja 799 V)3

Cilat nga këto simptoma vjen si rezultat i një intoksikimi akut prej Fluorit:

- A) Diarre
- B) Hypotension
- C) Të vjella
- D) Kostipacion

PS)C

Pyetja 800 V)3

"Teknika Bass" është një teknike:

- A) Për larjen e dhëmbëve
- B) Evidenton pllakën bakteriale
- C) Teknikë për kirurgji paradontale
- D) Teknikë për pastrim interdental

PS)A

Pyetja 801 V)3

Uniteti Dhëmb-Paradont është i ndërtuar për të pritur forcat:

- A) Horizontale
- B) Laterale
- C) Vertikale
- D) Horizontale dhe laterale

PS)C

Pyetja 802 V)3

Koagulimi i pulpes realizohet më shpejt në amputimin vital në dhëmbë me rrënjë të paformuar me :

- A) $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- B) ZnO
- C) Yag Lazer
- D) Formokrezol

PS)C

Pyetja 803 V)3

Një fëmijë 11 vjeç me periodontit kronik të fistulizuar të dhëmbit 85 trajtimi do të jetë:

- A) Amputim vital
- B) Perpunim kanalesh dhe mbushje kanalesh
- C) Ekstraksion
- D) Amputim mortal

PS)C

Pyetja 804 V)3

Reinplantimi në avulsion të një dhëmbi permanent ka sukses nga koha e qëndrimit të dhëmbit jashtë alveolës:

- A) >3ore
- B) < 1-2ore
- C) <4 ore
- D) <3ore

PS)B

Pyetja 805 V)3

Cili është mjeti më i saktë në përcaktimin e vitalitetit në rastin e traumave të dhëmbëve:

- A) Aplikimi I gutaperkes se nxehtë
- B) Testi elektrodiagnostik
- C) Kloretili
- D) Copë akulli

PS)B

Pyetja 806 V)3

Në plotësimin e kartelës në pacient me trauma është e rëndësishme:

- A) Anamneza
- B) Egzaminimi klinik
- C) Matja e vitalitetit dhe Radiografia
- D) Të tri obsionet

PS)D

Pyetja 807 V)3

Në cilën nga linjat e fraktures radikulare kryhet ekstraksioni:

- A) Linja horizontale
- B) Longitudinale
- C) Sagitale
- D) Korono-radikulare

PS)B

Pyetja 808 V)3

Rezorbimi i rrënjes të një dhemb qumshti quhet:

- A) Apektomi
 - B) Pulpotomi
 - C) Rizaliza
 - D) Rezektomi
- PS)C

Pyetja 809 V)3

Dalja me vonesë e premolarëve si shkak më i shpeshtë është:

- A) Hereditar
 - B) Sëmundje sistemike
 - C) Ekstraksion i molarëve të qumshtit në moshën 4-5 vjeç
 - D) Ankiuloza
- PS)C

Pyetja 810 V)3

Cilat nga patologjitë jo dentare është përfshirë në opsionet:

- A) Patologji karioze
 - B) Patologji traumatike
 - C) Patologji e ATM-së
 - D) Patologji pulpo-paradontale
- PS)C

Pyetja 811 V)3

Me cilën nga metodat arrihet mjekimi dentar maksimal në fëmijë:

- A) Anestezi locale
 - B) Pa anestezi locale
 - C) Maska nazale me Protozit Azoti
 - D) Anestezi te përgjithëshme
- PS)C

Pyetja 812 V)3

Modeli në formë pyke karakteristike është:

- A) Në kariesin aproksimal
 - B) Kariesin e fisurave
 - C) Kariesin cervical
 - D) Kariesin radikular
- PS)B

Pyetja 813 V)3

Në nekrozën e pulpës me patologji paradontale kronike shënja kryesore klinike është:

- A) Shkatërim të koronës së dhëmbit
- B) Papila interdentalare hipreplazike
- C) Parulis në distance nga bordi gingivar
- D) Lëvizje e dhëmbit jo konstante

PS)C

Pyetja 814 V)3

Cilit sindrom patollogjik i bashkengjitet dentinogenezis imperfekta.

- A) Sindromi i Dawnit
- B) Osteogeneza imperfekta
- C) Dizostoza kleidokraniale
- D) Labiopalatoskiza

PS)B

Pyetja 815 V)3

Në faktorët riskant demografikë në epidemiologjinë e kariesit cili është më përcaktuesi:

- A) Mosha
- B) Gjinia
- C) Statusi social ekonomik
- D) Raca dhe etnia

PS)C

Pyetja 816 V)3

Në indekset për përcaktimin e kariesit cili është indeksi për dhëmbet e qumshtit:

- A) DMFT
- B) DMFS
- C) Defs
- D) dft

PS)D

Pyetja 817 V)3

Traumat në dhëmbët e qumshtit takohen më shpesh:

- A) 2 -3 vjec
- B) 3-4
- C) 4-5
- D) 5-6

PS)B

Pyetja 818 V)3

Hiperemia pasive e pulpes eshte e karakterizuar nga:

- A) Fluks i madh i gjakut arterial
- B) Nje dilatim aktiv te eneve te gjakut
- C) Qendrim te gjakut venoz ne pulpe
- D) Nje rritje te presionit sistolik

PS)C

Pyetja 819 V)3

Terapia e zgjedhjes për një shok anafilaktik parashikon përdorim të :

- A) Kortikosteroideve
- B) Adrenalinën
- C) Plazma
- D) Izoprenalina

PS)B

Pyetja 820 V)3

Në cilat kushte të mëposhtme mungon fluidi gingivar në:

- A) Gingiva inflamatore
- B) Trauma okluzale
- C) Gingiva e shëndoshë
- D) Në respiracion oral

PS)C

Pyetja 821 V)3

Vaskularizimi i indeve paradontale shtohet në :

- A) Shtohet në rastin e bruksizmit
- B) Shtohet në rastin e kerkesave funksionale
- C) Paksohet në rastin e kërkesave funksionale
- D) Nuk është i kushtëzuar nga kërkesat funksionale

PS)C

Pyetja 822 V)3

Hipoplazia e smaltit të 1/3 okluzale të koronës të centralit dhe të molarit të parë permanent janë të shkaktuara nga dismetabolizmi (rregullimet e metabolizmit) në moshën:

- A) 0-9 muajsh
- B) 9-15 muajsh
- C) 15- 30 muajsh
- D) 30-40 muajsh

PS)A

Pyetja 823 V)3

Në fëmijë gingivitis ulcero- nekrotik ka si vend selektiv :

- A) Gingivën e lëvizshme
- B) Siperfaqen e brëndshme të buzës
- C) Mukozën Palatine
- D) Papila interdentalë

PS)D

Pyetja 824 V)3

Testi më i mire për screening për hemofilinë është koha:

- A) Koha e protrombinës
- B) Koha parciale e Tromboplastinës
- C) Koha e kogulacionit
- D) Koha e gjakosjes

PS)B

Pyetja 825 V)3

Duke perjashtuar molarin e trete , cili dhëmb ka frekuencën të qëndrojnë në nofull :

- A) Kanini inferior permanent
- B) Kanini superior permanent
- C) Molari superior i qumeshtit
- D) Molari inferior permanent

PS)B

Pyetja 826 V)3

Në cilën nga këto kushte përcaktohet shtim të fluidit gingivar:

- A) Trauma nga okluzioni
- B) Ekstraksioni i një dhëmbi
- C) Inflamacioni gingival
- D) Kariesi dentar

PS)C

Pyetja 827 V)3

Çfarë perfaqëson bruksizmi në fëmije:

- A) Një intoksikim farmaceutik
 - B) Një lezion të koletit të dhëmbit
 - C) Kërcitje të dhëmbëve
 - D) Hipertrofi gingivare
- PS)C

Pyetja 828 V)3

Me termin agenezi nënkuptojmë:

- A) Anomali të dhëmbëve
 - B) Mungesë të formimit të embrionit të dhëmbit
 - C) Mungesë të formimit të smaltit
 - D) Mungesë të formimit të rrënjës
- PS)B

Pyetja 829 V)3

Epiteli i mbetur Malasses proliferon në:

- A) Karcinom të gjuhës
 - B) Nuk proliferon
 - C) Kist odontogen
 - D) Ostosarkomë
- PS)C

Pyetja 830 V)3

Ekzaminimi radiologjik i dorës është i dobishëm për të përshkruar:

- A) Moshën dentare
 - B) Moshën skeletike
 - C) Agenezi
 - D) Gradën e rezorbimit të rrënjëve
- PS)B

Pyetja 831 V)3

Cili është inklinimi i dhëmbëve posterior inferior:

- A) Vestibular
- B) Oral
- C) Distal

D) Mezio- vestibular
PS)B

Pyetja 832 V)3

Në trajtimin e kariesit në dhëmbët e qumshtit, cili nga materialet ka mundësi më të pakët për karies sekondar:

A) Amalgami
B) Glassionomeri
C) Kompozoti
D) Kompomeri
PS)B

Pyetja 833 V)3

Kur përdoret rimbushja Ca(OH)_2 në pulpektomi në trajtimin e dhëmbëve të përhershëm me rrënjë të paformuar :

A) Kur kanali është boshatisur nga Ca(OH)_2
B) Kur niveli i Ca(OH)_2 është në mes të kanalit
C) Kur niveli i Ca(OH)_2 është zvogluar me 1 / 3 apikale
D) Kur ka pastë Ca(OH)_2 në të gjitha kanalet
PS)C

Pyetja 834 V)3

Cilët dhëmbët preken më shumë nga forma e lokalizuar e parodontit tek të rinjtë:

A) Molarët e parë dhe incizivët permanent
B) Lateralët
C) Premolarët siper
D) Molarët e dytë poshtë
PS)A

Pyetja 835 V)3

Në çfarë moshe fillon rezorbimi i rrënjëve të dhëmbëve të qumështit:

A) 5vjeç
B) 4
C) 3
D) 4
PS)D

Pyetja 836 V)3

Hiperemia pulpare është e karakterizuar nga:

- A) Fluks i madh i gjakut arterial
- B) Një dilatim aktiv të enëve të gjakut
- C) Qëndrim të gjakut venoz në pulpë
- D) Një rritje të presionit sistolik

PS)C

Pyetja 837 V)3

Amelogenezis imperfekta është një anomali :

- A) Pozicioni
- B) Forme
- C) Struktura
- D) Hereditare

PS)D

Pyetja 838 V)3

Me numrin 42 cilin dhëmb përfaqësojmë:

- A) Kaninin inferior të djathtë permanent
- B) Kaninin inferior të majtë permanent
- C) Incizivin lateral inferior të djathtë permanent
- D) Kaninin inferior të djathtë të qumështit

PS)C

Pyetja 839 V)3

Frekuenca më e lartë në traumat e dhëmbëve të përhershëm është:

- A) 8-10 vjeç
- B) 8-14
- C) 8-11
- D) 7-16

PS)C

Pyetja 840 V)3

Kalçifikimi i rrënjës së molarit të dytë poshtë të qumështit kryhet në moshën:

- A) 3-3.5
- B) 2.5-4
- C) 3-3.5
- D) 5-5.5

PS)C

Pyetja 841 V)3

Kanini i qumshtit del në muajt:

- A) 12-15
- B) 16-20
- C) 17-19
- D) 20-25

PS)B

Pyetja 842 V)2

Pse shkaktohet devijimi i nofulles?

- A) nga hapja anteriore e kufizuar
- B) Nga hapja posteriore e kufizuar
- C) Nga problemi intra kapsular
- D) levizja tipike funksionale

PS)C

Pyetja 843 V)3

Sa është nurmi i lobeve në molarin e dytë mandibular:

- A) 5 lobe
- B) 3 lobe
- C) 2 lobe
- D) 4 lobe

PS)D

Pyetja 844 V)3

Kurbatura cervikale distal e Molarit të dytë mandibular është :

- A) 1.0 mm
- B) 0.0 mm
- C) 2.0 mm
- D) 2.5 mm

PS)B

Pyetja 845 V)3

Çfarë forme ka prerja transversal cervikale premolari i parë mandibular :

- A) veshke
 - B) katrore
 - C) eliptik
 - D) rrumboidale
- PS)C

Pyetja 846 V)3

Në çfarë moshe bëhet kalçifikimi fillestar i molarit të dytë mandibular:

- A) 2.5 - 3 vjeç
 - B) 1.5 - 2 vjeç
 - C) 3 - 4 vjeç
 - D) 4 - 5 vjeç
- PS)A

Pyetja 847 V)3

Çfarë përmase ka diametri Mezio-Distal i kaninit maxilar në cerviks:

- A) 7.5 mm
 - B) 5.5 mm
 - C) 8.0 mm
 - D) 7.0 mm
- PS)B

Pyetja 848 V)2

Në çfarë moshe kalçifikohet rrënja e Molarit të dytë maxilar:

- A) 14 - 16 vjeç
 - B) 9 - 10 vjeç
 - C) 12 - 14 vjeç
 - D) 12 - 13 vjeç
- PS)A

Pyetja 849 V)2

Në çfarë moshe kalçifikohet kurora e Incizivit lateral Maxilar :

- A) 6 - 7 vjeç
 - B) 4 - 5 vjeç
 - C) 5 - 6 vjeç
 - D) 7 - 8 vjeç
- PS)B

Pyetja 850 V)2

Sa qendra rritjeje ka çdo dhëmb:

- A) Tre qendra rritjeje
 - B) Dy qendra rritjeje
 - C) Katër qendra rritjeje
 - D) Gjashtë qendra rritjeje
- PS)C

Pyetja 851 V)2

Në çfarë moshe fillojnë të kalçifikohen dhëmbët e qumështit :

- A) Në muajin 7 - 8 të jetës fetale
 - B) Në muajin 6 - 7 të jetës fetale
 - C) Në muajin 8 - 9 të jetës fetale
 - D) Në muajin 4 - 5 të jetës fetale
- PS)D

Pyetja 852 V)2

Në çfarë moshe erupton kanini maxilar i qumështit :

- A) 16 - 22 muajsh
 - B) 8 - 12 muajsh
 - C) 13 - 19 muajsh
 - D) 9 - 13 muajsh
- PS)A

Pyetja 853 V)2

Labio-lingualisht në sa pjesë ndahen dhëmbët:

- A) Në dy pjesë
 - B) Në katër pjesë
 - C) Në tre pjesë
 - D) Në pesë pjesë
- PS)C

Pyetja 854 V)2

Çfarë lënde organike përmban Smalti:

- A) kalçium hydroxyopatit
- B) Enmal Matric
- C) Material organik
- D) Dhjamra

PS)B

Pyetja 855 V)2

Cili nga indet e forta të dhëmbit përmban 65 % kalçium hidroksiapatit:

- A) Dentina
- B) Zmalti
- C) Alveola
- D) Cementi

PS)D

Pyetja 856 V)2

Në sa pjesë ndahen dhëmbët frontal Mezio-Distalisht nga boshtet gjatësore :

- A) Në dy pjesë
- B) Në tre pjesë
- C) Në katër pjesë
- D) Në pesë pjesë

PS)A

Pyetja 857 V)2

Në sa pjesë e ndajnë boshtet gjatësore dhëmbët distal:

- A) Në dy pjesë
- B) Në tre pjesë
- C) Në katër pjesë
- D) Në pesë pjesë

PS)B

Pyetja 858 V)2

Çfarë rëndësie ka njohja dhe gjetja e boshteve të dhëmbëve:

- A) Estetike
- B) Ruajtja e gingivës marginale
- C) Për përgatitjen e elementeve të fiksimit në protezat parciales
- D) Për përgatitjen e koronave të dhëmbëve

PS)C

Pyetja 859 V)2

Çfarë rëndësie ka ekuatori i dhëmbit :

- A) Ruajtjen e mukozës së kavitetit oral

- B) Estetike
 - C) Për përgatitjen e koronave të dhëmbëve
 - D) Për përcaktimin e rrugës së krosjes në protezat parciales
- PS)D

Pyetja 860 V)2

Në sa pjesë e ndan ekuatori sipërfaqen e dhëmbit:

- A) Në dy pjesë
 - B) Në tre pjesë
 - C) Në katër pjesë
 - D) Nuk e ndan
- PS)A

Pyetja 861 V)2

Ku pozicionohet bukalisht dhe lingualisht ekuatori i dhëmbit të rinjtë:

- A) Në të tretën linguale
 - B) Në të tretën gingivale
 - C) Në të tretën bucale
 - D) Në të tretën okluzale
- PS)B

Pyetja 862 V)2

Ku ndodhet lartësia e ekuatorit lingual në dhëmbët anterior:

- A) Në të tretën linguale
 - B) Në të tretën bucale
 - C) Në të tretën cervikale
 - D) Në të tretën okluzale
- PS)C

Pyetja 863 V)2

Çfarë atrofië paraqet kreshta reziduale maxilare:

- A) ekscentrike
 - B) ovale
 - C) koncentrike
 - D) e kombinuar
- PS)C

Pyetja 864 V)2

Çfarë atrofie paraqet kreshta reziduale mandibulare :

- A) Koncentrike
- B) Parabolë
- C) ovale
- D) ekscentrike

PS)D

Pyetja 865 V)2

Çfarë kurbature cervikale meziale paraqet premolari i parë maxilar:

- A) 1.0 mm
- B) 0.5 mm
- C) 1.5 mm
- D) 2.0 mm

PS)A

Pyetja 866 V)2

Çfarë kurbature meziale ka bashkimi smalt - cement në prerësit maxilar :

- A) 2.5 mm
- B) 3.5 mm
- C) 2.0 mm
- D) 1.5 mm

PS)B

Pyetja 867 V)2

Sa modelitete paraqet atashmenti epithelial të dhëmbit:

- A) Dy modalitete
- B) Tre modalitete
- C) Katër modalitete
- D) Pesë modalitete

PS)C

Pyetja 868 V)2

Në çfarë zone shtrihet kurbatura cervikale:

- A) Prapa të tretës cervikale
- B) Prapa të tretës incizale
- C) Prapa të tretës okluzale
- D) Prapa kreshtës gingivale

PS)D

Pyetja 869 V)2

Çfarë shenjë dalluese përdoret për të identifikuar dhëmbët :

- A) Shenja e këndit
- B) Shenja ngjyrës
- C) Shenja e okluzionit
- D) Shenja e kontakteve të dhëmbit

PS)A

Pyetja 870 V)2

Çfarë shenje dalluese përdoret për të identifikuar dhëmbët:

- A) Shenja e okluzionit
- B) Shenja e kurbës
- C) Shenja e ngjyrës
- D) Shenja e kontakteve të dhëmbit

PS)B

Pyetja 871 V)2

Çfarë dhëmbi ka antagonist sekondar kanini mandibular:

- A) Incizivin central maksilar
- B) Incizivi lateral mandibular
- C) Incizivi lateral Maxilar
- D) Kanini maxilar

PS)A

Pyetja 872 V)2

Çfarë lloj okluzioni është okluzioni ortognat:

- A) Patologjik
- B) Pat-fiziologjik
- C) Fiz-patologjik
- D) fiziologjik

PS)D

Pyetja 873 V)2

Çfarë lloj okluzioni është okluzioni eugnat:

- A) Fiziologjik
- B) Patologjik

- C) Pat-fiziologjik
 - D) Fiz-patologjik
- PS)A

Pyetja 874 V)1

Çfarë gjatësie ka rrënja e Incizivit central Maxilar:

- A) 13 mm
 - B) 10.5 mm
 - C) 23.5 mm
 - D) 10 mm
- PS)A

Pyetja 875 V)1

Në çfarë zone është fusha e kontaktit proximal distal e Incizivit central Maxilar:

- A) 1/3 incizale
 - B) Bashkimi i pjesëve të 1/3 së mesme dhe incizale
 - C) 1/3 bukolinguale
 - D) 1/3 cervikale
- PS)B

Pyetja 876 V)1

Çfarë lidhje ka qafa e dhëmbit me hapësirën interproksimale:

- A) Influencon në gjatësinë e saj
 - B) Influencon në formën e saj
 - C) Influencon në gjerësinë e saj
 - D) Influencon në mbrojtjen e dhëmbit
- PS)A

Pyetja 877 V)1

Çfarë raporti ka margo incizale e incizivit central maxilar me planin e okluzionit:

- A) Nuk e takon
 - B) E takon pjesërisht
 - C) E takon vetëm me këndin mezial
 - D) E takon plotësisht
- PS)D

Pyetja 878 V)1

Në çfarë zone është fusha e kontaktit proximal distal e incizivit lateral maxilar:

- A) Në 1/3 e mesme
- B) Bashkimi i pjesës në 1/3 e mesme dhe incizale
- C) Në 1/3 incizale
- D) Në qendër bukolingualisht

PS)A

Pyetja 879 V)1

Çfarë raporti ka margo incizale e Incizivit lateral maksilar me planin e okluzionit:

- A) E takon plotësisht
- B) Nuk e takon
- C) E takon pjesërisht
- D) E takon vetëm me këndin distal

PS)B

Pyetja 880 V)1

Çfarë gjatësie rrënjë ka incizivi central mandibular:

- A) 16 mm
- B) 13.5 mm
- C) 12.5 mm
- D) 10 mm

PS)C

Pyetja 881 V)1

Për shqiptimin e çfarë gërme është i rëndësishëm Incizivi central mandibular:

- A) Gërmës A
- B) Gërmës C
- C) Gërmës K
- D) Gërmës S

PS)D

Pyetja 882 V)1

Në çfarë zone është fusha e kontaktit proksimal mezial i incizivit mandibular:

- A) Në 1/3 incizale
- B) Në 1/3 e mesme
- C) Në vendin e bashkimit të 1/3 së mesme me atë cervikale
- D) Në vendin e bashkimit të 1/3 së mesme me atë incizale

PS)A

Pyetja 883 V)1

Si paraqitet margo incizale e incizivit central mandibular:

- A) Më pak simetrik
 - B) Më simetrik
 - C) I përkulur
 - D) I rrumbullakosur
- PS)B

Pyetja 884 V)1

Cili është funksioni më i rëndësishëm i kaninit:

- A) Për të siguruar estetikën
 - B) Për të siguruar formën e dhëmbëve të tjerë
 - C) Për të siguruar guidën kanine
 - D) Për të siguruar funksionin e centralëve
- PS)C

Pyetja 885 V)1

Në çfarë ngjasojnë kaninët me incizivët:

- A) Nga pamja labiale
 - B) Nga pamja e margos incizale
 - C) Nga funksioni
 - D) Nga zonat e kontaktit
- PS)D

Pyetja 886 V)1

Në çfarë dallohen kaninët maxilarë me ato mandibularë:

- A) Margo meziale-incizale është më e ngushtë e kaninëve mandibular
 - B) Në ngjyrë
 - C) Në funksion
 - D) Në zonat e kontaktit
- PS)A

Pyetja 887 V)1

Sa variacione paraqet premolari i dytë mandibular:

- A) 6 variacione
- B) 10 variacione
- C) 8 variacione

D) 9 variacione
PS)B

Pyetja 888 V)2

Cilat janë pikat e aplikimit të elastikëve të klasës së III-të:

- A) Një pikë aplikimi në harkadën inferiore dhe superiore
 - B) Një pikë aplikimi në harkadën inferiore distalisht në lidhje me atë superiore
 - C) Një pikë aplikimi në harkadën inferiore mezialisht në lidhje me atë superiore
 - D) Nuk kanë rëndësi ku janë pikat e aplikimit
- PS)C

Pyetja 889 V)2

Cilat janë pikat e aplikimit të elastikëve të klasës së II-të:

- A) Një pikë aplikimi në harkadën inferiore dhe superiore
 - B) Një pikë aplikimi në harkadën inferiore distalisht në lidhje me atë superiore
 - C) Një pikë aplikimi në harkadën inferiore mezialisht në lidhje me atë superiore
 - D) Nuk kanë rëndësi ku janë pikat e aplikimit
- PS)B

Pyetja 890 V)2

Proceset e apozicionit dhe rezorbimit në nofulla:

- A) Varen nga influencat gjenetike
 - B) Janë të lidhura me faktorët e fituar dhe hereditarë
 - C) Varen nga faktorët e fituar
 - D) Asnjë përgjigje e saktë
- PS)B

Pyetja 891 V)3

Në një subjekt ortognatik drejtimi i rritjes së maksilës është:

- A) Lart dhe përpara
 - B) Mbrapa dhe poshtë
 - C) Poshtë dhe përpara
 - D) Mbrapa dhe lart
- PS)C

Pyetja 892 V)1

Në një subjekt ortognatik drejtimi i rritjes së mandibulës është:

- A) Lart dhe përpara
- B) Mbrapa dhe poshtë
- C) Mbrapa dhe lart
- D) Poshtë dhe përpara

PS)D

Pyetja 893 V)2

Cilët nga faktorët influencojnë rritjen e veltës kraniale:

- A) Aktiviteti i suturave dhe zhvillimi i trurit
- B) Zhvillimi i kompleksit maksilo-facial
- C) Aktiviteti i sinkondrozës sfeno-oksipitale
- D) Aktiviteti i suturave dhe i sinkondrozës sfeno-oksipitale

PS)A

Pyetja 894 V)1

Tipologjia normofaciale është karakteristikë e një fytyre:

- A) Të gjërë e të shkurtër
- B) Të ngushtë e të shkurtër
- C) Të ngushtë e të gjatë
- D) Asnjë përgjigje e saktë

PS)D

Pyetja 895 V)1

Tipologjia brakofaciale është karakteristikë e një fytyre:

- A) Të gjërë e të shkurtër
- B) Të ngushtë e të shkurtër
- C) Të ngushtë e të gjatë
- D) Asnjë përgjigje e saktë

PS)A

Pyetja 896 V)2

Në sindromën e klasës së II-të skeletale mund të vihet re:

- A) Maksila protuze dhe mandibula protuze

- B) Mandibula normale dhe maksila protuze
- C) Maksila normale dhe mandibula protuze
- D) Maksila retruze dhe mandibula protuze

PS)B

Pyetja 897 V)2

Në sindromën e klasës së III-të skeletale mund të vihet re:

- A) Maksila protuze dhe mandibula protuze
- B) Mandibula normale dhe maksila protuze
- C) Maksila retruze dhe mandibula protuze
- D) Maksila retruze dhe mandibula retruze

PS)C

Pyetja 898 V)1

Cili nga malokluzionet është më shpesh e tipit gjenetik :

- A) Asimetria skeletale
- B) Klasa II/1
- C) Laterodevijimi skeletal
- D) Klasa e III-të skeletale

PS)D

Pyetja 899 V)2

Çfarë është AMP ciklike:

- A) Mediator qelizor prezent në qeliza
- B) Medikament
- C) Kompozit për aplikimin e bracket
- D) Asnjë përgjigje e saktë

PS)A

Pyetja 900 V)1

Në raportin kanin të klasës I-rë:

- A) Kanini inferior gjendet i avancuar në krahasim me atë superior
- B) Kanini inferior gjendet më mbrapa në krahasim me atë superior

- C) Kuspidi i kaninit inferior prek atë superior
 - D) Kanini superior gjendet lingualisht në krahasim me atë inferior
- PS)A

Pyetja 901 V)1

Në raportin kanin të klasës II-të:

- A) Kanini inferior gjendet i avancuar në krahasim me atë superior
 - B) Kanini inferior gjendet më mbrapa në krahasim me atë superior
 - C) Kuspidi i kaninit inferior prek kuspidin e lateralit superior
 - D) Kanini superior gjendet lingualisht në krahasim me atë inferior
- PS)B

Pyetja 902 V)1

Në gëlltitjen atipike infantile:

- A) Mungon peristaltika orofaringeale
 - B) Ka ulje të levizshmërisë së gjuhës
 - C) Është prezent interpozicioni i gjuhës midis dhëmbëve
 - D) Është prezent alergjia ndaj qumështit maternal
- PS)C

Pyetja 903 V)3

Metodat e hapjes së kafshimit përfshijnë:

- A) Intruzionin e dhëmbëve posteriorë dhe ekstruzionin e atyre anteriorë
 - B) Intruzionin e dhëmbëve anteriorë dhe ekstruzionin e atyre posteriorë
 - C) Mezializimin e dhëmbëve posteriorë
 - D) Retroinklinimin e incizivëve
- PS)B

Pyetja 904 V)3

Metodat e mbylljes së kafshimit përfshijnë:

- A) Intruzionin e dhëmbëve posteriorë dhe ekstruzionin e atyre anteriorë
 - B) Intruzionin e dhëmbëve anteriorë dhe ekstruzionin e atyre posteriorë
 - C) Mezializimin e dhëmbëve posteriorë
 - D) Retroinklinimin e incizivëve
- PS)A

Pyetja 905 V)3

Pjerrësimi kortikal është proces rritjeje që përshin :

- A) Depozitimin e kockës
- B) Rezorbimin e kockës
- C) Përkuljen e kockës
- D) Depozitimin dhe rezorbimin e kockës

PS)D

Pyetja 906 V)2

Momenti përcaktohet si:

- A) Forcë x Distançë nga qendra e rrotullimit
- B) Forcë x Distançë nga qendra e rezistencës
- C) Forcë x Modul elasticiteti
- D) Forcë x Veprim suste

PS)A

Pyetja 907 V)2

Ankorimi minimal përcaktohet si:

- A) $\frac{3}{4}$ e hapësirës ekstraktuese përdoret nga uniti ankorues
- B) $\frac{1}{2}$ e hapësirës ekstraktuese përdoret nga uniti ankorues
- C) $\frac{1}{3}$ e hapësirës ekstraktuese përdoret nga uniti ankorues
- D) Absolutisht asnjë lëvizje e dhëmbëve anteriorë

PS)A

Pyetja 908 V)1

Ankorimi reciprok përcaktohet si:

- A) $\frac{3}{4}$ e hapësirës ekstraktuese përdoret nga uniti ankorues
- B) $\frac{1}{2}$ e hapësirës ekstraktuese përdoret nga uniti ankorues
- C) $\frac{1}{3}$ e hapësirës ekstraktuese përdoret nga uniti ankorues
- D) Absolutisht asnjë lëvizje e dhëmbëve anteriorë

PS)B

Pyetja 909 V)1

Ankorimi maksimal përcaktohet si:

- A) $\frac{3}{4}$ e hapësirës ekstraktuese përdoret nga uniti ankorues
- B) $\frac{1}{2}$ e hapësirës ekstraktuese përdoret nga uniti ankorues
- C) $\frac{1}{3}$ e hapësirës ekstraktuese përdoret nga uniti ankorues
- D) Absolutisht asnjë lëvizje e dhëmbëve anteriorë

PS)C

Pyetja 910 V)2

Lloji klasik i ekstraksionit në kamuflimin e klasës II-të është :

- A) Ekstraksioni i premolarëve 1 sipër dhe kaninëve poshtë
 - B) Ekstraksioni i premolarëve 1 sipër dhe premolarëve 2 poshtë
 - C) Ekstraksioni i të katër premolarëve 1
 - D) Ekstraksioni i premolarëve 2 sipër dhe premolarëve 1 poshtë
- PS)B

Pyetja 911 V)2

Cefalograma frontale përdoret për :

- A) Të vlerësuar simetrinë faciale
 - B) Overjet
 - C) Kompensimin dentar në planin sagital
 - D) Kafshimin vertikal
- PS)A

Pyetja 912 V)1

Dhëmbët natalë definoohen:

- A) Dhëmbë që eruptojnë në muajin e 2-3-të
 - B) Dhëmbë që eruptojnë midis muajit të 6-të dhe vitit të 2-të
 - C) Dhëmbë që eruptojnë mbas vitit të 3-të
 - D) Dhëmbë që janë prezentë në kohën e lindjes
- PS)D

Pyetja 913 V)1

Face mask përdoret për të prodhuar efekt:

- A) Dorsal
 - B) Transversal
 - C) Vertikal
 - D) Anteriposterior
- PS)D

Pyetja 914 V)2

Relapsi në dhëmbë të rotulluar mund të eleminohet:

- A) Me frenektomi
 - B) Duke ruajtur integritetin e harkut
 - C) Me ekstraksion të dhëmbëve të përmbajtur
 - D) Me fibrektomi cirkulare
- PS)D

Pyetja 915 V)2

Ekstraksioni është i detyruar në trajtimin e grumbullimeve, nëse dëndësimi është:

- A) Më pak se 4 mm
 - B) 4 mm - 6 mm
 - C) Më shumë se 10 mm
 - D) Më shumë se 10 mm dhe overjet negativ
- PS)C

Pyetja 916 V)3

Në klasën II/1 me kënd të madh intermaksilar tendenca në mjekim është që Pogonion ta çojë:

- A) Mbrapa dhe lart
 - B) Përpara dhe lart
 - C) Përpara dhe poshtë
 - D) Mbrapa dhe poshtë
- PS)B

Pyetja 917 V)1

Cilat nga vlerat nuk janë cefalometrike:

- A) SNB
 - B) SNA
 - C) Aksi Y i
 - D) Kendi NSD
- PS)D

Pyetja 918 V)3

Cila thenie është e vërtetë:

- A) Lëvizja e tepruar labiale e incizivëve mund të shkaktojë tërheqje gingivare
- B) Trajtimi ortodontik për pacientet e rritur me probleme paradontale është i kundërlindikuar
- C) Aparati ortodontik shkakton probleme paradontale
- D) Trajtimi i dhëmbi që i është prekur pulpa duhet vonuar deri pas trajtimit ortodontik

PS)C

Pyetja 919 V)3

Epiteli i brendshëm dentar:

- A) Është e vetmja shtresë e organit të smaltit, që është më pranë enëve të gjakut
 - B) Do të formojë ameloblastet
 - C) Bëhet pulpë dentare
 - D) Do të kombinohet me qelizat e papilës dentare për të formuar membranën e rrenjës
- PS)B

Pyetja 920 V)2

Nga formohet ligamenti periodontal:

- A) Folikula dentare
 - B) Organi i smaltit
 - C) Papila dentare
 - D) Membrana epiteliale e rrenjës
- PS)A

Pyetja 921 V)1

Germi i premolarit 2 do të zhvillohet:

- A) Anterior me molarin 2 të qumështit mandibular
 - B) Lingual me molarin 2 të qumështit mandibular
 - C) Posterior me molarin 2 të qumështit mandibular
 - D) Si një bulëz e ndarë, bukal me molarin 2 të qumështit mandibular
- PS)B

Pyetja 922 V)1

Zgjeruesi i shpejtë përbëhet nga:

- A) 2 unaza të cementuara tek molarët 1 permanentë
 - B) 2 unaza të cementuara tek molarët 1 permanentë dhe 2 tek molarët 2 permanentë
 - C) 2 unaza të cementuara tek molarët 1 permanentë dhe 2 unaza tek premolarët 2
 - D) 2 unaza të cementuara tek molarët 1 permanentë dhe 2 unaza tek premolarët 1
- PS)D

Pyetja 923 V)2

Cili është funksioni i spiraleve (kthesave) në sustën protuduese?

- A) Janë pjesë ndihmëse për të lidhur ligaturën ose fijet elastike
- B) Bëjnë që susta të qëndroj më mirë në gojë

- C) Diapazoni i veprimit rritet
 - D) Forca e veprimit rritet
 - E) Moduli i elasticitetit ulet
- PS)C

Pyetja 924 V)3

Forca e kundërt e përdorur për të neutralizuar momentet në rastin e lëvizjeve trupore vestibulo-linguale kërkon:

- A) Një forcë më të vogël me një krah më të gjatë
 - B) Një forcë më të madhe me një krah më të shkurtër
 - C) Një forcë të barabartë me krahun
 - D) Një forcë më të vogël me një krah të shkurtër
 - E) Një forcë të vetme
- PS)A

Pyetja 925 V)3

Këndi Sna Snp dhe GoMe përpiket të hapet në përgjigje :

- A) Të headgear cervikal
 - B) Trashjes anteriore në aparatin e levizshëm
 - C) Të dyja së bashku
 - D) Përdorimit të zgjatur të elastikëve intermaksilarë
 - E) Të gjitha të vërteta
- PS)E

Pyetja 926 V)2

Cili është një veprim që nuk i atribuohet headgear cervikal?

- A) Ndalon ekstrudimin e molarëve maksilarë
 - B) Ndalon rritjen përpara të maksilës
 - C) Distalizim i rregjionit maksilar
 - D) Ndhmon korrigjimin e kafshimit të thellë
 - E) Asnjë e vërtetë
- PS)A

Pyetja 927 V)2

Ankorimi aplikohet në çdo ndërhyrje ortodontike. Ankorimi nuk mund të aplikohet në subjektet e rritur.

- A) E para e vërtetë, e dyta gabim
- B) E para e gabuar, e dyta e vërtetë

- C) Të dyja te vërteta
 - D) Të dyja të gabuara
- PS)A

Pyetja 928 V)1

Kush është forca optimale për lëvizjen pjerrësuese dentare?

- A) 0,05 - 0,1 N
 - B) 02 - 0,4 N
 - C) 0,5 - 1.0 N
 - D) 5 - 10 N
 - E) 50 - 100 N
- PS)C

Pyetja 929 V)2

Çfarë karakteristike të përbashkët kanë elastikët e klasës II dhe III-te?

- A) Tipi i forcës së ushtruar që është i lehtë
 - B) Pikat e aplikimit të forcës që janë intra-orale
 - C) Të dyja së bashku
 - D) Magnituda e forcës vjen duke u rritur
 - E) Përcillen jashtë kavitetit oral
- PS)B

Pyetja 930 V)3

Ekstrudimi i molarëve:

- A) Shkaktohet nga headgear tërheqës i sipërm
 - B) Do të ndihmojë në korrigjimin e problemeve transversale
 - C) Rrit gjatësinë e harkut
 - D) Shkaktohet nga headgear tërheqës i poshtërm
- PS)D

Pyetja 931 V)1

Mezioinklinimi simetrik i dhëmbëve 11,21, ka më shpesh si shkak:

- A) Agenezi të 12,22
 - B) Mezioidens të impaktuar
 - C) Frenulum hipertrofik
 - D) Të gjitha së bashku
 - E) Traumën okluzale nga dhëmbët poshtë
- PS)B

Pyetja 932 V)3

Kundërindikacionet e lip-pumber në nofullën e poshtme:

- A) Kur ka tendencë të klasës së III-të
- B) Kur incizivët poshtë janë të labializuar
- C) Të dyja së bashku
- D) Në buzë hipotonike
- E) Asnjë e vërtetë

PS)C

Pyetja 933 V)1

Si një dentist i përgjithshëm, cili pacient nuk kërkon trajtim të menjëhershëm?

- A) 8 vjeçar me kafshim të kryqëzuar posterior bilateral
- B) 8 vjeçar me devijim të vijës mediane vetëm në pozicionin e okluzionit qëndror
- C) 8 vjeçar me malokluzion të klasës II/2
- D) 15 vjeçar me malokluzion të klasës I-re me grumbullime serioze

PS)C

Pyetja 934 V)2

Cili shoqëron zakonisht korrigjimin e malokluzionit të klasës II-të funksionale?

- A) Zgjerimi i harkut maksilar
- B) Distalizimi i molarëve të poshtëm
- C) Zgjerimi i harkut mandibular
- D) Heqja e premolarëve të poshtëm
- E) Ekstraksioni i dhembëve 53,63

PS)A

Pyetja 935 V)3

Në një kafshim të kryqëzuar: molari i parë i sipërm është i zhvendosur palatinal, molari i parë mandibular është korrekt. Si do ta korrigjoni këtë gjendje?

- A) Përdoret një plan i inklinuar
- B) Përdoret një aparat me vidë sagitale
- C) Përdoret një elastik i kafshimit të kryqëzuar mes dy molarëve
- D) Përdoret një headgear
- E) Asnjë e vërtetë

PS)E

Pyetja 936 V)3

Pse inkorporohen spiralet (kthesat) në susta?

- A) Për të ulur papërkuelshmërinë e sustës
- B) Për të ndryshuar pikën e aplikimit të forcës
- C) Për të zhvilluar një forcë më të fuqishme
- D) Për ta bërë sustën më të adaptueshme me relievin e gojës
- E) Për ti rezistuar forcave kundërvepruese

PS)A

Pyetja 937 V)1

Eruptimi ektopik i 26-tes në një pacient 8-vjeçar ka shkaktuar rënie të 65. Çfarë duhet bërë?

- A) Bërja e një RO periapikale për të parë nëse 25 është prezente
- B) Bërja e një cefalometrie për të gjykuar mbi modelin skeletal
- C) Vendosja e një aparati për të lëvizur 26 distalisht
- D) Vendosja e një ruajtësi vendi
- E) Vendosja e fituesit të vendit

PS)A

Pyetja 938 V)1

Humbja e hershme spontane e dhëmbëve 73,83, është:

- A) Rezultat i kariesit të pamjekuar
- B) Ndodh në rastet e mungesës kongjenitale të 33,43
- C) Një indikacion për vendosjen e ruajtësit të vendit
- D) Një simptomë e grumbullimit të dhëmbëve permanentë
- E) Prania e një kafshimi të thellë

PS)D

Pyetja 939 V)2

Cili është shkaku i zakonshëm i kafshimit të kryqëzuar posterior Unilateral (majtas) të shoqëruar me zhvendosje funksionale të mandibulës?

- A) Ngushtimi bilateral i maksilës
- B) Prania e karieseve në anën e kundërt
- C) Humbja e parakohshme e molarëve të qumështit
- D) Ngushtimi unilateral i maksilës
- E) Të gjitha të vërteta

PS)A

Pyetja 940 V)3

Diagnoza definitive e zhvendosjes funksionale laterale bazohet:

- A) Në Ro panoramike

- B) Ekzaminimin klinik
 - C) Matjet e gjërësisë maksilare intermolare
 - D) Studimi i modeleve të derdhura të allçisë
 - E) Cefalometri
- PS)B

Pyetja 941 V)3

Cili model heqjeje është më pak i përshtatshëm për një pacient me klasë të II/1?

- A) 14,24 dhe 35,45
 - B) 15,25 dhe 34,44
 - C) 14,24 dhe 34,44
 - D) 14,24
- PS)B

Pyetja 942 V)2

Trajtimi ortodontik mund të përfshijë edhe ekstraksionin e dhëmbëve permanentë. Cila nga situatat nuk është e vlefshme për ekstraksion?

- A) Korrigjimi i klasës së II-të ose të III-të
 - B) Mosbalancimi i sasisë së materialit dhembor në harkun e sipërm ose të poshtëm
 - C) Evitimi për të përdorur aparate fikse
 - D) Ulja e protuzionit dentar dhe sforcimit të buzës
 - E) Asnjë e vërtetë
- PS)C

Pyetja 943 V)2

Headgear mund të aplikohet tek molarët e dytë permanentë, sepse frenimi i rritjes maksilare është më i madh.

- A) Thënia dhe arsyeja janë të vërteta
 - B) Thënia dhe arsyeja janë të gabuara
 - C) Thënia e vërtetë, arsyeja e gabuar
 - D) Thënia e gabuar, arsyeja e vërtetë
- PS)B

Pyetja 944 V)1

Në pamjen cefalometrike, një simfizë e shkurtër dhe e gjërë është karakteristikë e subjektit me tipologji:

- A) Brakofacial
- B) Dolikofacial

- C) Normofacial
 - D) Asnjë e saktë
 - E) Mikse
- PS)A

Pyetja 945 V)2

Një kënd i madh i inklinimit maksilar çon në:

- A) Buzëqeshje gingivare
 - B) Rrit over-jet
 - C) Të dyja të vërteta
 - D) Tendencë për kafshim normal
 - E) Asnjë e vërtetë
- PS)E

Pyetja 946 V)1

Prezenca e deviacionit të vijës mediane në denticionin e qumështit varet nga:

- A) Grumbullimet e incizivëve
 - B) Malformacioni kongjenital
 - C) Parakontakti i kaninëve
 - D) Veset
 - E) Kontraksioni monolateral i harkadës
- PS)C

Pyetja 947 V)2

Prezenca në ekzaminimin klinik e diastemës dhe vestibularizimi i incizivëve inferiorë është rezultat i:

- A) Thithjes së gishtit
 - B) Makroglosisë
 - C) Respiracionit oral
 - D) Problemeve paradontale
 - E) Prezencës së adenoideve
- PS)B

Pyetja 948 V)1

Në sindromën e obstrukcionit respirator, cila nga simptomat e mëposhtme nuk është prezente:

- A) Rritja e tipit horizontal
- B) Buzët inkompetente
- C) Mikrorinia

- D) Rotacioni mandibular posterior
 - E) Respiracioni oral
- PS)A

Pyetja 949 V)3

Humbja parakohe e dhëmbit 55 mund të shkaktojë:

- A) Grumbullime anteriore
 - B) Klasë të III-të molare
 - C) Kafshim të kryqëzuar bilateral
 - D) Pseudo klasë të II-të molare djathtas
 - E) Asnjë përgjigje e saktë
- PS)D

Pyetja 950 V)2

Në kursin e trajtimit ortodontik tek një subjekt dolikofacial duhet evituar:

- A) Ekstruzioni incizival
 - B) Ekstruzioni dhe distalizimi incizival
 - C) Ekstruzioni dhe distalizimi molar
 - D) Intruzioni dhe distalizimi incizival
 - E) Distorotacioni i kaninëve
- PS)C

Pyetja 951 V)3

Në prezencë të disharmonisë dento-bazale, ekstraksioni i premolarëve të dytë indikohet:

- A) Kur diskrepanca është anteriore
 - B) Në rastet me vestibulo-version të theksuar të incizivëve
 - C) Kur kërkohet ankorim maksimal posterior dhe minimal anterior
 - D) Kur kërkohet ankorim minimal posterior dhe maksimal anterior
 - E) Në prezencë edhe të një kafshimi të thellë anterior
- PS)D

Pyetja 952 V)2

Cila nga planet cefalometrike me rritjen e femijës ndryshojnë më pak dimensionet:

- A) SGn
- B) SGo

- C) SN
- D) NPog

PS)C

Pyetja 953 V)2

Për krijimin e linjës së mbylljes chamfer në kurorat e plota metalike përdoret guri i diamantit:

- A) Cilindriko-konik
- B) Guri me fund të sheshtë
- C) Gurë torpedo
- D) Gurë me majë të hollë

PS)C

Pyetja 954 V)2

Trashësia e kapuçit metalik në kurorat metal-porcelan për metalet e zakonshme është:

- A) 0.7 mm
- B) 0.5-0.6 mm
- C) 0.4 mm
- D) 0.2-0.3 mm

PS)D

Pyetja 955 V)2

Nëpërmjet kujt elementeve porcelani fiton opacitetin:

- A) Oksid hekurit
- B) Oksid aluminit
- C) Oksid Titaniumit
- D) Oksid Plumbit

PS)C

Pyetja 956 V)2

Çfarë shkakton mungesa e bizotimit të kuspitit funksional:

- A) Një zonë me trashësi të vogël
- B) Një hapësirë të mjaftueshme për materialin
- C) Rritjen e retensionit
- D) Rritjen e estetikës

PS)A

Pyetja 957 V)2

Varësia e inklinimit të rrugës kondilare në lëvizjen protruzive me lartësinë e kuspideve:

- A) Inklinim i vogël, lartësia e kuspideve e madhe
 - B) Inklinim i theksuar, lartësia e kuspideve e madhe
 - C) Inklinim i theksuar, lartësia e kuspideve e vogël
 - D) Inklinim i theksuar, lartësia e kuspideve mesatare
- PS)B

Pyetja 958 V)2

Sa është këndi i inklinimit inciziv protruziv:

- A) 22 grade
 - B) 30 grade
 - C) 38 grade
 - D) 50-70 grade
- PS)D

Pyetja 959 V)2

Kërkesat për një kapuç të saktë në punimet metal-porcelan është:

- A) Formimi i oksideve të shumta
 - B) Sigurimi i estetikës
 - C) Vendi ku bashkohet metali me porcelanin duhet të ketë një kënd 90 grade
 - D) Aftësia e metalit për lustrim
- PS)C

Pyetja 960 V)2

Gjërësia mesatare vestibulo-linguale e kurorës metal qeramike është:

- A) 0.36 mm
 - B) 0.71 mm
 - C) 0.75 mm
 - D) 0.83 mm
- PS)B

Pyetja 961 V)2

Modifikimi i dhëmbëve të dëmtuar shumë bëhet:

- A) Vlerësimi i fortësisë së mureve të mbetura
- B) Finalizimi i preparimit
- C) Preparimi i strukturës dentare të mbetur
- D) Kunjat parapulpare

PS)D

Pyetja 962 V)2

Në cilin lloj punimi indikohet sistemi Ips-empres:

- A) Urat metal-porcelan
- B) Onlay
- C) Urat krejt metal
- D) Urat e merylandit

PS)B

Pyetja 963 V)3

Në modelimin me dyll të koronës full metal, sa janë përmasat e kuspидit lingual të premolarit të parë në

krahasim me kuspидin vestibular të premolarit të dytë mandibular:

- A) 2.0mm
- B) 2.6 mm
- C) 2.8 mm
- D) 3.3 mm

PS)D

Pyetja 964 V)3

Në bazë të kujt klasifikohet skema okluzale në modelimin me dyll:

- A) Nga lokalizimi i kontakteve okluzale që realizohen nga kuspидet funksionale mbi dhëmbët antagonistë në pozicionin e relacionit qëndror
- B) Nga kontakti i kuspидeve vestibulare mbi kreshtat marginale në pozicionin e interkuspидimit maksimal
- C) Nga vendosja e kuspидit lingual në pozicionin mezio-distal të sipërfaqes okluzale
- D) Nga vendosja e kuspидit mezio-vestibular në pozicionin e relacionit qendror

PS)A

Pyetja 965 V)3

Si duhet të jetë intermediери në urat fikse:

- A) Paralel me dhëmbët e tjerë
- B) Sa më i përkulur për estetikë
- C) Sa më i gjerë
- D) Sa më i kurbuar

PS)A

Pyetja 966 V)3

Cili është funksioni i antasialogogeve:

- A) Mungesa e ndryshimeve të pakthyeshme e gingivës
 - B) Ndikojnë në tharjen e pështymës
 - C) Ndikojnë në tharjen e hemoragjisë
 - D) Ndikojnë në shtimin e pështymës
- PS)B

Pyetja 967 V)3

Cila është teknika e ekspozimit të linjës së mbylljes:

- A) Teknika e kyretazit instrumentar
 - B) Teknika e preparimit të linjës së mbylljes chamfer
 - C) Teknika e preparimit të linjes së mbylljes shpatulla
 - D) Teknika mekanike
- PS)D

Pyetja 968 V)3

Konektori jo rigid ka për qëllim:

- A) Konektori jo rigid është e mjaftueshme për të parandaluar transformimin e forcave nga pjesa që ngarkohet në pjesën tjetër të urës fikse
 - B) Rrugë drejtuese për mandibulën
 - C) Pozicion më posterior në vend të një pozicioni fiziologjik
 - D) Tërë forcat që shpërndahen në gjithë artikulationin
- PS)A

Pyetja 969 V)3

Kurorat metal qeramik kanë një gjerësi mesatare vestibulare linguale për kurorat e floririt:

- A) 0.71 mm
 - B) 0.60 mm
 - C) 0.35 mm
 - D) 0.30 mm
- PS)C

Pyetja 970 V)3

Në lëvizjet laterale të përsëritura sa është deviacioni mesatar në relacionin qendror:

- A) 0.2 mm
- B) 0.3 mm
- C) 0.4 mm

D) 0.8 mm

PS)A

Pyetja 971 V)3

Për kurorat tërësisht qeramike përdoret:

A) Linja në formë shpatulle me kënd 90 grade

B) Linja në formë shpatulle

C) Shpatull me bizotim

D) Linja teh thike

PS)B

Pyetja 972 V)3

Në rrugë kirurgjikale zgjatja e kurorës arrin:

A) 3.0 mm

B) 2.5 mm

C) 1.5 mm

D) 0.3 - 1mm

PS)A

Pyetja 973 V)3

Sa është reduktimi okluzal për kuspidet jo funksionale për kurorat metal-porcelan:

A) 0.5-1.0 mm

B) 1.0-1.5 mm

C) 1.5-2.0 mm

D) 2.0 mm

PS)B

Pyetja 974 V)3

Në mekanizmin e formimit të zhurmës (klikut në ATM) luan rol:

A) Aksi sagital i lëvizjes së mandibulës

B) Aksi horizontal i lëvizjes së mandibulës

C) Aksi vertikal i lëvizjes së mandibulës

D) Pozicioni më posterior i kondilit në vend të një pozicioni fiziologjik

PS)D

Pyetja 975 V)3

Gropa e Tomasit zbatohet në pjesën:

- A) Distale të molarit të parë mandibular
 - B) Meziale të molarit të dytë mandibular
 - C) Distale të premolarit të parë mandibular
 - D) Meziale të premolarit të dytë mandibular
- PS)C

Pyetja 976 V)3

Çfarë lloj okluzioni zbatohet gjatë modelimit me dyll sipas raportit kuspit-fossë:

- A) Okluzioni majë më majë
 - B) Okluzioni një dhëmb me një dhëmb
 - C) Okluzioni një dhëmb me dy dhembë antagonistë
 - D) Okluzion i kryqëzuar
- PS)B

Pyetja 977 V)3

Nga se kushtëzohet vendosja e linjës së mbylljes:

- A) Të përpunohen lehtë nga dentisti
 - B) Të riprodhohet nga materiali i masës
 - C) Nga shtrirja e restaurimeve të mëparshme
 - D) Nga zgjatja e kurorës
- PS)C

Pyetja 978 V)3

Pse për kurorat tërësisht qeramike realizohet linja e mbylljes shpatull dhe jo chamfer:

- A) Siguron estetikën
 - B) Mënjanon kariesin
 - C) Paraqesin fuqi më të madhe
 - D) Lehtësi manipulimi
- PS)C

Pyetja 979 V)3

Urat e cementuara me rezinë kundëringkohen:

- A) Dhëmb shtyllë jo të kariuar
 - B) Si shina paradontale
 - C) Alergji ndaj floririt
 - D) Kafshim i thellë
- PS)D

Pyetja 980 V)3

Estetika e kurorës metal-qeramike influencohet nga orientimi i rrugës së inserimit në drejtim:

- A) Mezio-distal
 - B) Vestibulo-lingual
 - C) E inklinuar në drejtim lingual
 - D) E inklinuar në drejtim vestibular
- PS)B

Pyetja 981 V)3

Mungesa e pragjeve eleminohet me një konicitet minimal:

- A) 22 grade
 - B) 12 grade
 - C) 6 grade
 - D) 2.5 grade
- PS)B

Pyetja 982 V)3

Kriteret e përgatitjes së ulluqeve në dhëmbë shumë të dëmtuar:

- A) Të shmanget perforimi i membranës periodontale
 - B) Të jenë sa më të gjata me qëllim që të përmirësohet rezistenca
 - C) Nuk duhet të reduktohet asnjë mur dentine
 - D) Nuk duhet të kalojë në pulpë
- PS)B

Pyetja 983 V)1

Cila nga termat mëposhte nuk hyn tek interferencat okluzale

- A) Qendrore
 - B) Protruzive
 - C) Punuese
 - D) Periferike
- PS)D

Pyetja 984 V)2

Intereferenca protruzive ndodh:

- A) Midis pjesës meziale të dhembëve posterior mandibularë dhe pjesës distale të posterioreve maksilare

- B) Midis pjeses distale te dhembeve posterior mandibulare dhe pjeses meziale te posterioreve maksilare
 - C) Midis pjeses meziale te dhembeve anterior mandibulare dhe pjeses distale te anterioreve maksilare
 - D) Midis pjeses distale te dhembeve anterior mandibulare dhe pjeses distale te anterioreve maksilare
- PS)A

Pyetja 985 V)2

Ne okluzionin e mbrojtur ne menyre te dyaneshme duhet qe

- A) Dhembet anterior mbrojne dhembet posterior ne te gjitha levizjet mandibulare
 - B) Dhembet posterior mbrojne dhembet anterior ne te gjitha levizjet mandibulare
 - C) Dhembet posterior ne anen punuese takojne kurse ata ne anen jopunuese disokludojne
 - D) Dhembet posterior ne anen jopunuese takojne kurse ata ne anen punuese disokludojne
- PS)A

Pyetja 986 V)3

Deviacioni mesatar i gjate levizjeve laterale te perseritura ne anen punuese eshte

- A) 0.3 mm
 - B) 1.3mm
 - C) 2.3 mm
 - D) 3.3 mm
- PS)A

Pyetja 987 V)3

Nese translacioni lateral i menjehershëm eshte i madh atehere:

- A) Lartesia e kuspideve te dhembeve posterior eshte e madhe
 - B) Lartesia e kuspideve te dhembeve posterior eshte e vogel
 - C) Margot e dhembeve anterior jane te mprehta
 - D) Margot e dhembeve anterior jane jo te mprehta
- PS)B

Pyetja 988 V)3

Vlera e inklinimit te rruges kondilare eshte

- A) 20.4 grade
- B) 30.4 grade
- C) 40.4 grade

D) 50.4 grade

PS)B

Pyetja 989 V)3

Vlera e Inklinimit incizal protruziv eshte:

A) 30-50 grade

B) 50-70 grade

C) 70-90 grade

D) 90-110 grade

PS)B

Pyetja 990 V)2

Kur mbulimi vertikal i dhembeve anterior eshte i madh

A) Kuspidet e dhembeve posterior jane te shkurtra

B) Kuspidet e dhembeve posterior jane te larta

C) Kuspidet e dhembeve posterior jane te sheshta

D) Kuspidet e dhembeve posterior jane te konsumuara

PS)B

Pyetja 991 V)2

Kur mbulimi horizontal i dhembeve anterior eshte i madh

A) Kuspidet e dhembeve posterior jane te shkurtra

B) Kuspidet e dhembeve posterior jane te larta

C) Kuspidet e dhembeve posterior jane te sheshta

D) Kuspidet e dhembeve posterior jane te konsumuara

PS)A

Pyetja 992 V)2

Cili nga restaurimet e meposhteme eshte restaurim ekstrakoronal

A) Inlay qeramike

B) Onlay MOD

C) Fasetat e qeramikes

D) Glasionomeret

PS)C

Pyetja 993 V)1

Cili nga restaurimet e meposhteme eshte restaurim intrakoronal

- A) Kurorat e plota
 - B) Fasetat e qeramikes
 - C) Kurorat e pjeseshme
 - D) Amalgami kompleks
- PS)D

Pyetja 994 V)2

Stresi qe lind tek cementi midis restaurimit dhe preparimit rritet me shpejtesi kur koniciteti eshte:

- A) 10 grade
 - B) 20 grade
 - C) 30 grade
 - D) 40 grade
- PS)B

Pyetja 995 V)2

Linja optimale e mbylljes per punimet metalike eshte:

- A) Teh thike
 - B) Chamfer
 - C) Shpatull
 - D) Shpatull e bizotuar
- PS)B

Pyetja 996 V)2

Ne punimet total qeramike linja e mbylljes me e indikuar eshte

- A) Teh thike
 - B) Chamfer
 - C) Shpatull e rrumbullakosur
 - D) Shpatull e bizotuar
- PS)C

Pyetja 997 V)1

Kunjat parapulpare duhet te vendosen

- A) Ne smalt
 - B) Ne dentine te shendoshe
 - C) Ne dhomen pulpare
 - D) Ne junktionin smalt-cement
- PS)B

Pyetja 998 V)2

Rezina qenuk perdoret sot per restaurimet provizore jane

- A) Polimetli-metakrilati
 - B) Poli etil metakrilati
 - C) Uretan dimetakrilanti
 - D) Epimine
- PS)D

Pyetja 999 V)3

Ne modelet e punes te pergatitura me laser pindex trashesia nga baza e modelit deri tek linja e mbylljes duhet te jete

- A) 15 mm
 - B) 30mm
 - C) 15cm
 - D) 30 cm
- PS)A

Pyetja 1000 V)2

Sa kunja duhet të permbajë çdo kult:

- A) 1
 - B) 2
 - C) 3
 - D) 4
- PS)B

Pyetja 1001 V)1

Cila nga alternativat e mëposhtëme nuk është karakteristikë e ngjyrës

- A) Ngjyra
 - B) Intensiteti
 - C) Translucenca
 - D) Kontrasti
- PS)C

Pyetja 1002 V)1

Fasetat janë restaurime që shtrihen kryesisht në sipërfaqen

- A) Vestibulare
- B) Palatinale

- C) Meziale
 - D) Distale
- PS)A

Pyetja 1003 V)1

Onlay shtrihet

- A) Në sipërfaqen vestibulare të dhëmbit
 - B) Në sipërfaqen palatinale të dhëmbit
 - C) Në sipërfaqen okluzale mbi kuspide
 - D) Në sipërfaqen okluzale pa prekje të kuspideve
- PS)C

Pyetja 1004 V)2

Reduktimi i dhëmbit për faseta duhet të jetë

- A) 0.5mm
 - B) 1 mm
 - C) 1.5 mm
 - D) 2 mm
- PS)A

Pyetja 1005 V)2

Fasetat cementohen me:

- A) Cemente polikarboksilate
 - B) Glasionomere
 - C) Rezina kompozit
 - D) Cement Oksifofati
- PS)C

Pyetja 1006 V)2

Trashësia e kapuçave të metalit ne aliazhe fisnike për punimet metal qeramikë duhet të jetë

- A) 0.1- 0.3 mm
 - B) 0.3-0.5 mm
 - C) 0.6-0.8 mm
 - D) 0.8-1 mm
- PS)B

Pyetja 1007 V)2

Trashësia minimale absolute e porcelanit në punimet metal qeramikë është

- A) 0.5 mm
- B) 0.7 mm
- C) 0.9 mm
- D) 1.1 mm

PS)B

Pyetja 1008 V)3

Trashësia e shtresës së porcelanit opak duhet të jetë

- A) 0.3 mm
- B) 0.5 mm
- C) 0.7 mm
- D) 0.9 mm

PS)A

Pyetja 1009 V)2

Intermedieri duhet të pozicionohet

- A) Sa më vestibularisht në raport me dhëmbët e tjerë
- B) Sa më lingualisht në raport me dhëmbët e tjerë
- C) Sa më paralel në raport me dhëmbët e tjerë
- D) Sa më pjerrtaz në raport me dhëmbët e tjerë

PS)C

Pyetja 1010 V)2

Cili nga intermedierët e mëposhtëm është më pak higjenik

- A) Ne formë shale
- B) Në formë shale të modifikuar
- C) Në forme konike
- D) Ne forme ovale

PS)A

Pyetja 1011 V)1

Cili nga punimet e mëposhtëme nuk është urë e cementuar me rezinë

- A) Ura Virginia
- B) Ura Maryland
- C) Ura Brooklyn
- D) Ura Rochette

PS)C

Pyetja 1012 V)2

Kur mungojnë 12,11, dhe 22 zëvendësimi do të realizohet me punim fiks që shtrihet

- A) 13 deri 23
 - B) 13 deri 24
 - C) 14 deri 24
 - D) 25 deri 25
- PS)A

Pyetja 1013 V)2

Në mungesë të dhëmbëve 14 dhe 12 do të zëvendësojmë

- A) 16-11
 - B) 16-21
 - C) 15-11
 - D) 15-21
- PS)C

Pyetja 1014 V)2

Në mungesë të dhëmbëve 15 dhe 13 do të zëvendësojmë

- A) 16-12
 - B) 17-12
 - C) 16-11
 - D) 17-11
- PS)C

Pyetja 1015 V)2

Në mungesë të dhëmbëve 11,12,14,21,22 do te zëvendësojmë

- A) 16- 25
 - B) 15-24
 - C) 15-25
 - D) 15-23
- PS)B

Pyetja 1016 V)2

Në mungesë të dhëmbëve 14 dhe 16 zëvendësojmë nga

- A) 17-13
- B) 17-12
- C) 17-11

D) 17-21

PS)A

Pyetja 1017 V)2

Në mungesë të 11,12,21,22 zëvendësojmë nga :

A) 13-23

B) 14-23

C) 13-24

D) 14-14

PS)D

Pyetja 1018 V)2

Në mungesë të 31,32,41,42 zëvendësojmë nga:

A) 33-43

B) 34-43

C) 33-44

D) 34-44

PS)A

Pyetja 1019 V)2

Në mungesë të 12,21 zëvendësojmë nga:

A) 13-22

B) 13-13

C) 14-23

D) 14-22

PS)A

Pyetja 1020 V)2

Në mungesë të 12,13 zëvendësojmë nga:

A) 21-15

B) 11-15

C) 11-14

D) 21-14

PS)A

Pyetja 1021 V)2

Në mungesë të 11,21 zëvendësojmë nga:

- A) 13-23
 - B) 13-22
 - C) 12-22
 - D) 12-24
- PS)A

Pyetja 1022 V)2

Në mungesë të 32,33 zëvendësojmë nga:

- A) 34-41
 - B) 35-43
 - C) 34-42
 - D) 34-44
- PS)A

Pyetja 1023 V)2

Në mungesë të 13,14 zëvendësojmë nga:

- A) 15-11
 - B) 16-11
 - C) 17-12
 - D) 17-11
- PS)B

Pyetja 1024 V)2

Në mungesë të 33,34 zëvendësojmë nga:

- A) 35-41
 - B) 36-41
 - C) 35-42
 - D) 35-31
- PS)A

Pyetja 1025 V)1

Në mungesë të 35 zëvendësojmë nga:

- A) 34-36
 - B) 31-36
 - C) 33-36
 - D) 33-37
- PS)A

Pyetja 1026 V)1

Në mungesë të 11 zëvendësojmë nga:

- A) 12-21
- B) 12-22
- C) 13-21
- D) 13-22

PS)A

Pyetja 1027 V)1

Parathormoni siguron efektet e mëposhtme, përveç:

- A) Inhibon riabsorbimin tubular të fosfateve.
- B) Rrit aktivitetin osteoklastik.
- C) Stimulon sintezën e 1-25(OH) vitamina D.
- D) Stimulon riabsorbimin renal të kalciumit.
- E) Redukton ekskretimin urinar të bikarbonatit

PS)E

Pyetja 1028 V)1

Simptoma e hershme me e shpeshtë e një tumori të ezofagut është:

- A) Disfagia.
- B) Disfonia.
- C) Hematemeza
- D) Rektorragjia.
- E) Temperatura e lartë.

PS)A

Pyetja 1029 V)2

Janë shkaqe të dispnesë në insuficiencen e majtë të gjitha alterimet e mëposhtme, përveç:

- A) Hipoksisë.
- B) Edemës së mukozës bronkiale.
- C) Rritjes së rigiditetit (elasticiteti i ulur) pulmonar.
- D) Edema intersticiale pulmonare
- E) Sensibilitet me i shtuar i qendrave respiratore

PS)E

Pyetja 1030 V)1

Cili është përbërësi kryesor i kilomikroneve?

- A) Trigliceridet

- B) Fosfogliceridet
 - C) Acidet yndyrore
 - D) Kolesterolit
 - E) Proteinat
- PS)A

Pyetja 1031 V)3

Cili nga faktorët e mëposhtëm nuk bën pjesë tek faktorët prognostikë që ndikojnë pozitivisht në diagnozën e skizofrenisë?

- A) Prania e simptomatologjise negative.
 - B) Prania e ngjarjeve stresante që kanë paraprire fillimin e simptomave.
 - C) Fillimi i shpejtë dhe akut i sëmundjes.
 - D) Jeta sociale e kënaqshme përpara sëmundjes.
 - E) Ko-ekzistenca e çrregullimeve të humorit.
- PS)A

Pyetja 1032 V)1

Në cilën nga sëmundjet infektive të mëposhtme haset me shpesh glomerulonefriti?

- A) Fruthi
 - B) Skarlatina
 - C) Rubeola
 - D) Parotiti epidemik
 - E) Difteria
- PS)B

Pyetja 1033 V)2

Cili nga indikacionet e mëposhtëm përbën një përdorim të përshtatshëm të imipraminës?

- A) Pagjumësia
 - B) Epilepsia
 - C) Enuresis nokturna e fëmijës
 - D) Glaukoma
 - E) Mania
- PS)C

Pyetja 1034 V)1

Të gjithë termat e mëposhtëm mund të përdoren për të treguar një çrregullim të shkaktuar nga një medikament tek një individ i caktuar, përveç:

- A) Efekteve anësore të medikamentit
- B) Sinjalit

- C) Ngjarje risku
 - D) Reaksion risku
 - E) Çrregullim iatrogenik
- PS)B

Pyetja 1035 V)3

Nga trunkusi celiac marrin origjinën:

- A) Arteria gastrike e djathtë, a hepatike komune, a splenike.
 - B) Arteria gastrike e majte, a hepatike komune, a splenike.
 - C) Arteria hepatike e djathtë, a hepatike e majte, a splenike.
 - D) Arteria mezenterike superior, a hepatike komune, a splenike.
 - E) Arteria mezenterike superior, a hepatike e majtë dhe e djathtë.
- PS)B

Pyetja 1036 V)3

Cila nga rrethanat e mëposhtme mund të shkaktojë SIADH (Syndrom of Inappropriate ADH)?

- A) Karcinoma bronkiale
 - B) Hipokaliemia
 - C) Tumoret e prostatës
 - D) Hiperkalcemia
 - E) Sindroma Cushing
- PS)A

Pyetja 1037 V)2

Të gjitha rrethanat morboze të mëposhtme janë të transmetuara në mënyrë autozomale dominante, përveç:

- A) Akondroplazisë.
 - B) Miotonisë kongenitale.
 - C) Sklerozës tuberoze.
 - D) Fibrozës kistike.
 - E) Osteogenezës imperfekte.
- PS)D

Pyetja 1038 V)3

Cila nga substancat e mëposhtme, përbërës të disa ushqimeve të dietës normale të përditshme, mund të provokojë një krizë hipertensive në subjektet që marrin inhibitorët e MAO-A?

- A) Tiramina

- B) Tirosina
 - C) Acetilkolina
 - D) Acidi oleik
 - E) Muskarina
- PS)A

Pyetja 1039 V)1

Për cilin nga këto hepatite ekziston një vaksinë?

- A) Hepatitin A e C
 - B) Hepatitin C
 - C) Hepatitin D
 - D) Hepatitin A e B
 - E) Hepatitin G, A e B
- PS)D

Pyetja 1040 V)1

Cila nga këto sigla identifikon kompleksin madhor të histokompatibilitetit?

- A) HLA
 - B) ABC
 - C) ZWA
 - D) ALH
 - E) LAH
- PS)A

Pyetja 1041 V)1

Cila nga këto qeliza prodhon interferonin?

- A) Eritrocitet
 - B) Makrofagët
 - C) Mastocitet
 - D) Osteoblastet
 - E) Qelizat e pankreasit endokrin
- PS)B

Pyetja 1042 V)1

Me miotoni nënkuptojmë

- A) Një gjëndje persistente kontraktimi muskular me krampe.
- B) Një shtim persistent të tonusit muskular të tipit elastik, me shtim të refleksive tendinoze.
- C) Një shtim të tonusit muskular të tipit plastik, me spazma muskulare.

- D) Një deficit i relaksimit muskular nga kontraktimi persistent edhe pas mbarimit të stimulit.
- E) Një çrregullim motor central me lëvizje të përsëritura të vazhdueshme dhe posturë anormale.
- PS)D

Pyetja 1043 V)1

Feokromocitoma shkakton

- A) Krizë hipertensive.
- B) Kolaps.
- C) Sepsis.
- D) Abdomen akut.
- E) Asgjë.
- PS)A

Pyetja 1044 V)2

Cili nga pohimet e mëposhtëm mbi etiopatogenezën e artritis reumatoid (RA) është i gabuar?

- A) Gratë nullipare kanë një risk të shtuar për të zhvilluar RA-në.
- B) Në tre muajt që pasojnë shtatzaninë risku i RA-së është i shtuar.
- C) Në shtatzani sëmundja zakonisht përmirësohet.
- D) Në RA raporti M:F është pothuaj 1:2-3
- E) Përdorimi i kontraktivëve orale precipiton manifestimet klinike.
- PS)E

Pyetja 1045 V)3

Në cilin nga vaskulitetet sistematike të mëposhtme raportohet më shpesh prekja e aparatit respirator?

- A) Sëmundja Kawasaki
- B) Purpura e Schonlein-Henoch
- C) Arteriti me qeliza gjigande
- D) Sindromi Cogan
- E) Granulomatoza Wegener
- PS)E

Pyetja 1046 V)2

Insulina indukton të gjitha efektet metabolike të mëposhtme, përveç

- A) Fuqizimit të magazinimit dhe përdorimit të energjisë.
- B) Stimulimit të sintezës e lipoproteinë lipazës (LPL)
- C) Induktimit të enzimës malike

- D) Induktimit të glukozë-7-fosfat dehidrogjenazës
 - E) Stimulimit të qelizave muskulare dhe adipoze për të sekretuar glukozë
- PS)E

Pyetja 1047 V)1

Acidet yndyrore transportohen në plazmë nga

- A) Albumina.
 - B) Fosfolipaza A2.
 - C) Lipoproteina (a).
 - D) Acil koenzima A.
 - E) Karnitina.
- PS)A

Pyetja 1048 V)1

Absorbimi i cilës nga substancat e mëposhtme rezulton më i prekuri pas një rezeksioni të ileumit distal?

- A) Glukoza
 - B) Vitamina B12
 - C) Uji
 - D) Kripa
 - E) Fibrat vegjetale
- PS)B

Pyetja 1049 V)1

Në vendet e industrializuara, cili është agjenti më i shpeshtë i gastroenteritit akut në moshën pediatrike?

- A) E coli
 - B) Salmonela
 - C) Rotavirus
 - D) Adenovirus
 - E) Giardia
- PS)C

Pyetja 1050 V)3

Glomerulonefriti proliferativ ekstrakapilar ('crescente') përkufizon

- A) Një sëmundje specifike të karakterizuar nga prania e gjysmëhënave epiteliale ("crescents") në shumicën e glomerulave.
- B) Një sindrom anatomo-klinik me etiologji multiple, që e patrajtuar çon në insuficiencë renale kronike shpesh irreversible për jave/muaj.

- C) Një sindrom anatomo-klinik me etiologji multiple që çon shpesh në insuficiencë renale kronike shpesh irreversible në javë/muaj.
 - D) Një sindrom anatomo-klinik me etiologji multiple gjithnjë të karakterizuar nga prania e komplekseve imune në imunofluoreshencë
 - E) Një sëmundje specifike me etiologji auto-imune e karakterizuar nga prevalenca e antigenëve
- PS)B

Pyetja 1051 V)3

Një djalë 18 vjeçar paraqet ethe, dhimbje fyti, asteni e limfadenopati laterocervikale. Në ekzaminimin objektiv paraqitet faringo-tonsilit, petekie në palatum, limfadenopatia cervikale, aksilare dhe inguinale; hepatosplenomegali. Ekzaminimet laboratorike

- A) Virusi Epstein-Barr
 - B) Neisseria gonorrhoeae
 - C) CMV
 - D) Mykoplasma hominis
 - E) Streptokoku grupit A
- PS)A

Pyetja 1052 V)1

Pas lindjes, ku ndodh diferencimi i limfociteve B?

- A) Në timus
 - B) Në palcën kockore
 - C) Në hepar
 - D) Në qendrat germinale të limfonodulave
 - E) Në qendrat germinale të shpretkës
- PS)B

Pyetja 1053 V)1

Ekzaminimet e screening-ut

- A) Vlerësojnë shpërndarjen e një neoplazie pas ndërhyrjes kirurgjikale.
 - B) Kërkojnë praninë e nje neoplazie specifike në nje popullatë të shëndoshë në risk për këtë neoplazi.
 - C) Kërkojnë metastazat eventuale përpara një ndërhyrjeje kirurgjikale.
 - D) Kërkojnë praninë e një neoplazie specifike tek subjektet me simptoma dyshuese për këtë neoplazi.
 - E) Bëjnë pjesë në parandalimin primar të tumoreve.
- PS)B

Pyetja 1054 V)1

Substratet energjetike që truri mund të përdorë janë

- A) Glukoza dhe trupat ketonike.
- B) Ekskluzivisht glukozë.
- C) Ekskluzivisht glutamat dhe glukozë.
- D) Ekskluzivisht proteina.
- E) Ekskluzivisht yndyrna.

PS)A

Pyetja 1055 V)2

Në trajtimin e një kuadri konfuzional do të duhej

- A) Të siguronim për pacientin një prani të vazhdueshme.
- B) Të mbanim pacientin në kushtet e errësirës dhe izolimit.
- C) Të përdornim sasi të mëdha sedativësh.
- D) Të përdornim antidepressivët triciklikë.
- E) Të mbanim pacientin të zgjuar me çdo kusht.

PS)A

Pyetja 1056 V)2

Në dyshim për polimiozit, ekzaminimi fillestar dhe shumë i indikuar është

- A) Kërkimi i antikorpeve antinukleare.
- B) Eritrosedimenti.
- C) Fibrinogjeni.
- D) Dozimi i enzimave muskulare.
- E) Biopsia e arteries temporale.

PS)D

Pyetja 1057 V)2

Sediment i lartë, ethe, leukocitozë me neutrofili janë shenja të

- A) Tuberkulozit kockor.
- B) Mielomës multiple.
- C) Metastazës kockore
- D) Osteomielitit akut.
- E) Osteomës osteoide.

PS)D

Pyetja 1058 V)1

Cila nga të dhënat laboratorike të mëposhtme vërehet në fenilketonuri?

- A) Acidoza metabolike
- B) Hiperamoniemia

- C) Ketoza
 - D) Shtimi i nivelit plazmatik të fenilalaninës
 - E) Shtimi i niveleve plazmatike të aminoacideve të degëzuara (izoleucina, valina, leucina)
- PS)D

Pyetja 1059 V)1

Vlera normale e pH-it arterial është

- A) 7.15-7.25.
- B) 7.25-7.35.
- C) 7.35-7.45.
- D) 7.45-7.55.
- E) 7.55-7.65.

PS)C

Pyetja 1060 V)3

Në dekursin e një infeksioni nga HIV-1 cili nga këto ekzaminime të mëposhtme përdoret zakonisht për monitorimin e dekursit dhe progresionit të sëmundjes?

- A) Eritrosedimenti, hematokriti
- B) Nënpopullata limfocitare, HIV-RNA
- C) Nënpopullata limfocitare, HIV-DNA
- D) Eritrosedimenti, beta-2 mikroglobulina
- E) Antikorp anti-HIV

PS)B

Pyetja 1061 V)1

Sa ventrikuj cerebralë janë gjithsej?

- A) Një
- B) Dy
- C) Tre
- D) Katër
- E) Pesë

PS)D

Pyetja 1062 V)1

Në kontraksionin e sarkomerit

- A) është e rëndësishme sasia e kalciumit që futet në citoplazëm nga jashtë.
- B) është e rëndësishme sasia e natriumit që futet nga jashtë në citoplazëm.
- C) është e rëndësishme sasia e kalciumit që hyn në citoplazëm nga retikulumi sarkoplazmatik.

- D) strijet Z largohen.
 - E) kalciumi ndahet nga miozina.
- PS)C

Pyetja 1063 V)1

Cili është rezervuari natyral i toxoplazmës?

- A) Fëmijët e moshës shkollore
 - B) Ekskrementet e zogjve
 - C) Peshqit e kontaminuar
 - D) Macja
 - E) Gjaku
- PS)D

Pyetja 1064 V)1

Ovociti në momentin e ovulacionit

- A) nuk është i veshur nga asnjë strukturë.
 - B) është i veshur vetëm nga zona pelucida.
 - C) është i veshur nga zona pelucide, nga qelizat e korona radiata dhe nga oofori.
 - D) është i veshur nga një shtresë lidhore e lëmuar.
 - E) është i veshur nga një shtresë lidhore dense.
- PS)C

Pyetja 1065 V)2

Cili është faktori prognostik kryesor në një karcinomë mamare të operuar në mënyrë radikale?

- A) Moshë
 - B) Mutacioni i BRCA1
 - C) Përdorimi i estroprogestativëve
 - D) Prekja limfonodulare
 - E) Dimensionet e T (tumorit)
- PS)D

Pyetja 1066 V)1

Cilat janë simptomat specifike të periudhës menopauzale?

- A) Djersitja nokturne
 - B) Pagjumësia
 - C) Rënia në peshë
 - D) Fraktura
 - E) Rritja në peshë.
- PS)A

Pyetja 1067 V)1

Me pneumoni nozokomiale kuptojmë

- A) Një formë të pranishme në momentin e hospitalizimit.
- B) Një formë që manifestohet të paktën 48 ore pas hospitalizimit dhe që nuk ishte në inkubacion në momentin e shtrimit në spital.
- C) Një formë e fituar gjatë hospitalizimit në repartin e riaftësimit.
- D) Një formë e fituar gjatë hospitalizimit në repartin e Terapisë Intensive.
- E) Një formë që manifestohet në dalje nga spitali.

PS)B

Pyetja 1068 V)1

Një dëmtim glomerular mund të përbëjë një komplikacion të rëndësishëm të të gjitha patologjive të mëposhtme, përveç

- A) Lupusit eritematoz të diseminuar.
- B) Amiloidozës.
- C) Purpura e Schonlein-Henoch.
- D) Hiperkalcemisë.
- E) Sindromit Goodpasture.

PS)D

Pyetja 1069 V)3

Shpërndarja botërore e beta-talasemisë, drepanocitozës dhe deficiencës së glukozë-6-fosfat-dehidrogenazës (G6PD) koincidon me atë të

- A) Malaries.
- B) Sklerozës multiple.
- C) Kolerës.
- D) Persistencës së laktazës.
- E) Gripit.

PS)A

Pyetja 1070 V)1

Sëmundja e Dupuytrenit karakterizohet nga retraksioni i strukturës

- A) Aponeurozës së muskulit psoas.
- B) Aponeurozës palmare.
- C) Aponeurozës perineale media.
- D) Ligamentit inguinal.
- E) Fascia dorsalis e këmbës.

PS)B

Pyetja 1071 V)3

Në komën diabetike, në fazë fillestare, pupilat zakonisht janë

- A) Normale.
- B) Miotike.
- C) Midriatike.
- D) Anizohorike.
- E) Duke paraqitur fenomenin e Argyll-Robertson.

PS)C

Pyetja 1072 V)1

Forma më e shpeshtë e hipertensionit arterial është

- A) Hipertensioni renovaskular.
- B) Hipertensioni esencjal.
- C) Hipertensioni nga morbus Cushing.
- D) Hipertensioni në sindromin Conn.
- E) Hipertensioni neurogen.

PS)B

Pyetja 1073 V)1

Një shtim i hemoglobinës (>18g%) vërehet në patologjinë e

- A) Neoplazive malinje të rënda.
- B) Sëmundjeve infektive invalidizuese.
- C) Anemisë hemolitike.
- D) Morbus Vaquez.
- E) Klorozës.

PS)D

Pyetja 1074 V)1

Trashëgueshmëria në distrofinë muskulare të Duchenne është

- A) E lidhur me transmetimin me seksin.
- B) E tipit mitokondrial.
- C) Autozomal recesiv.
- D) Autozomal dominant.
- E) Mund të jetë ose autozomal recesiv ose autozomal dominant.

PS)A

Pyetja 1075 V)2

Karnitina përdoret si përbërës ushqimor për përmirësimin e performancës agonistike sepe

- A) Shton transportin e acideve yndyrore përmes membranës plazmatike.
 - B) Aktivizon acidet yndyrore në citozol.
 - C) Është një rregullator alosterik i acil-CoA dehidrogjenazës.
 - D) Shton transportin e acideve yndyrore përmes membranës mitokondriale interne.
 - E) Transporton acetatin gjatë konvertimit të acetyl-CoA në trupa ketonikë.
- PS)D

Pyetja 1076 V)1

Në cilën nga këto sëmundje bashkëshoqërohet neuriti optik ?

- A) Cistitis
 - B) Pankreatitis
 - C) Skleroza me pllaka
 - D) Pneumonia
 - E) Ulcera gastrike
- PS)C

Pyetja 1077 V)1

Përse përdoret adrenalina në anestezinë lokale?

- A) Rrit rrjedhjen
 - B) Pakëson rrjedhjen hematike
 - C) Shton edemën
 - D) Nuk përdoret asnjëherë
 - E) Pakëson dhëmbjen
- PS)B

Pyetja 1078 V)1

Cila nga gjetjet e mëposhtme është e pranishme në insuficiencën mitrale kronike?

- A) Ritmi sinusal
 - B) Zhurma holosistolike
 - C) Vala "V" e atriumit të majtë shumë të rritur.
 - D) Toni i parë i përforcuar
 - E) Galop presistolik
- PS)B

Pyetja 1079 V)1

Cili nga këta medikamente ka një veprim fibrinolitik të shtuar?

- A) Dikumarol

- B) Streptokinaza
 - C) Heparina
 - D) Fenidioni
 - E) Kumopirani
- PS)B

Pyetja 1080 V)1

Deficiti i nervit të IV kranial provokon

- A) Diplopi në shikimin poshtë.
 - B) Hemianopsia bilaterale.
 - C) Diplopi në shikimin anash.
 - D) Nistagmus.
 - E) Ndryshime pupilare.
- PS)A

Pyetja 1081 V)2

Sinusi koronarian i zemrës normale drenon zakonisht në

- A) Atriumin e djathtë.
 - B) Atriumin e majtë.
 - C) Ventrikulin e majtë.
 - D) Ventrikulin e djathtë.
 - E) Vena cava superior.
- PS)A

Pyetja 1082 V)3

Një djalë 24 vjeçar vjen për një vlerësim të një enjtjeje në kavigjen e djathtë. Kavilja ka qënë e fryrë për një ditë. Në të shkuarën ai ka patur një trombozë të venave të thella, në moshën 17 vjeçare, për të cilën kishte marrë 'warfarinë' për 3 muaj. N

- A) Antikorpët antifosfolipidike.
 - B) Neoplazi okulte.
 - C) Hemoglobinuria paroksistike nokturne.
 - D) Mutacioni i faktorit V të Leiden.
 - E) Homocisteinemia.
- PS)D

Pyetja 1083 V)2

Në rastet e angina pectoris instabile, cila do të konsiderohej terapia kryesore, përveç medikamenteve të nevojshme për të kontrolluar simptomat e anginës?

- A) Aspirina 100mg/ditë.
- B) Aspirina 325mg/dite + kalciparine 0.5mgx2/ditë.

- C) Diltiazem.
 - D) Verapamil 240mg + nifedipine 40mg/ditë.
 - E) Antikoagulantët oralë.
- PS)B

Pyetja 1084 V)2

Çrregullimet psikiatrike të zakonshme

- A) Verifikohen tek 50% e grave në një vit.
 - B) Nuk i pergjigjen psikoterapisë.
 - C) Duhet të vlerësohen gjithnjë tek psikiatri.
 - D) Paraqiten shpesh me simptoma fizike.
 - E) Shpesh paraqiten me agresivitet të lartë.
- PS)D

Pyetja 1085 V)2

Sick Sinus Syndrom (sëmundja e nyjes sinusale) nënkupton çrregullime të shumta të formimit dhe përçimit të stimulit. Nga të poshtë permendurit, cila alternativë duhet përjashtuar?

- A) Ndalimi funksional i nyjes sino-atriale.
 - B) Blloku i degës së djathtë ose të majtë.
 - C) Blloku sino-atrial.
 - D) Bradikardi e theksuar sinusale me ekstrasistola atriale.
 - E) Sindromi taki-bradikardik.
- PS)B

Pyetja 1086 V)1

Dhëmbja që nga peritoneumi parietal është e tipit

- A) Somatik.
 - B) Visceral superficial.
 - C) Visceral profund.
 - D) Të projektuar.
 - E) Radikular.
- PS)A

Pyetja 1087 V)1

Nga e merr më shpesh origjinën tumori i prostatës?

- A) Zona centrale.
- B) Zona periferike.
- C) Zona tranzicionale.
- D) Vezikulat seminale.

E) Uretra prostatike.

PS)B

Pyetja 1088 V)2

Cila nga rrethanat e mëposhtme përfaqëson një kundër-indikacion relativ për realizimin e një shintigrafie perfuzionuese pulmonare?

A) Insuficienca renale kronike.

B) Koagulopatia nga konsumi.

C) Insuficienca kardiake.

D) Shtatzania.

E) Shoku septik.

PS)D

Pyetja 1089 V)1

Cili nga lokalizimet e mëposhtëm është i pasur me gjëndra apokrine

A) Regjioni perianal.

B) Lëkura me flokë.

C) Regjioni palmo-plantarë.

D) Faqia.

E) Arkada supraciliare.

PS)A

Pyetja 1090 V)1

Është një formë sekondare e cefalesë

A) Hemikrania pa aura.

B) Hemikrania me aura.

C) Cefalea tensive.

D) Cefalea akute idiopatike.

E) Arteriti temporal.

PS)E

Pyetja 1091 V)1

Në absceset pelvike, kuadri klinik karakterizohet nga

A) Konstipacion.

B) Mbrojtja ("defanse") abdominale difuze.

C) Dhembja abdominale difuze.

D) Pamundësia për eliminim të gazrave dhe konstipacion.

E) Trishtimi.

PS)A

Pyetja 1092 V)1

Artroza është një sëmundje e karakterizuar nga

- A) Humbja e masës kockore.
- B) Çrregullime primare të trofizmit muskular.
- C) Ecurisë migrante dhe zëvendësuese.
- D) Harxhimit të kartilagos artikulare.
- E) Infeksioneve artikulare recidivante.

PS)D

Pyetja 1093 V)1

Cila nga patologjitë e mëposhtme nuk indukon hipertension arterial?

- A) Hipersurrenalizmi.
- B) Feokromocitoma.
- C) Pielonefriti kronik.
- D) Hipertiroidizmi.
- E) Anemia.

PS)E

Pyetja 1094 V)1

Një katalizator

- A) Zhvendos përqendrimet në ekuilibër.
- B) Ul energjinë e aktivizimit të një reaksioni të caktuar.
- C) Është shpesh e konsumuar gjatë reaksionit.
- D) Është gjithnjë një substancë gazoze.
- E) Është e nevojshme për çfarëdolloj reaksioni.

PS)B

Pyetja 1095 V)1

Cili është përkufizimi i saktë i 'kongenitales'?

- A) E lidhur me trashëgiminë paternale.
- B) E pranishme në anëtarët e tjerë të familjes.
- C) Që mund të përsëritet tek femijët e tjerë.
- D) Që do të lërë gjurmë në gjeneratat e ardhshme.
- E) Që është e pranishme në lindje.

PS)E

Pyetja 1096 V)1

Tek një paciente e prekur nga hernia diskale L5-S1 të djathtë shenjat e Lassegue dhe Wassermann janë

- A) Negative.
 - B) Pozitive.
 - C) Lassegue pozitiv e Wassermann negativ.
 - D) Wassermann pozitiv e Lassegue negativ.
 - E) Lassegue e Wassermann lehtësisht pozitiv.
- PS)C

Pyetja 1097 V)1

Terapia kirurgjikale e hernies inguinale kongjenitale tek fëmijët konsiston në

- A) Mbylljen e urakut.
 - B) Mbylljen e ductus peritoneal vaginal.
 - C) Mbylljen e unazës inguinale të jashtme.
 - D) Vendosjen e patch në zonën e lokalizimit të hernies.
 - E) Vendosjen e patch në skrotum.
- PS)B

Pyetja 1098 V)1

Korteksi visiv vaskularizohet kryesisht nga arteria

- A) Cerebrale anteriore.
 - B) Cerebrale media.
 - C) Oftalmike.
 - D) Cerebrale posteriore.
 - E) Vertebrale e djathtë.
- PS)D

Pyetja 1099 V)1

Cili nga efektet e mëposhtëm lidhet me aktivitetin fiziologjik të gastrinës?

- A) Stimulimi i sekretimit të acidit klorhidrik.
 - B) Stimulimi i sekretimit të kolecistokininës.
 - C) Përsheptimi i zbrazjes gastrike.
 - D) Stimulimi i sekretimit të bikarbonateve.
 - E) Stimulimi i ekskrecionit të bilës.
- PS)A

Pyetja 1100 V)2

Cili është mekanizmi patogjenetik që akuzohet veçanërisht në gjenezën e fibrozës kistike?

- A) Inhalacioni i pluhurave me veprim fibrotizues.
- B) Shtimi i numrit dhe funksionalitetit të gjëndrave seromukozale të aparatit respirator.
- C) Shtimi i transportit të ujit në nivel të membranës qelizore.
- D) Transport i alteruar i joneve në nivel të membranës qelizore.
- E) Riabsorbim i shtuar i ujit në nivel të membranave qelizore.

PS)D

Pyetja 1101 V)1

Në çfare intervali përfshihet PH i gjakut normal ?

- A) 7.24-7.28
- B) 7.29-7.35
- C) 7.36-7.41
- D) 7.42-7.46
- E) 7.47-7.52

PS)C

Pyetja 1102 V)2

Cili është lezioni elementar i moluskum contagiosum?

- A) Vesikula me përmbajtje seroze.
- B) Bula hemorragjike hemisferike.
- C) Papula hemisferike umbelikale.
- D) Pllaka eritematoze.
- E) Skuamim sero-hematik.

PS)C

Pyetja 1103 V)1

Adenoma hipofizare GH-sekretore indukon

- A) Akromegali në subjektet post-pubertet, gjigandizëm në subjektet pre-pubertet dhe prirje për hyperglicemi.
- B) Akromegali tek subjektet post-pubertet.
- C) Gjigandizëm tek subjektet pre-pubertet.
- D) Prirje për hiperglicemi.
- E) Akromegali tek subjektet post-pubertet, gjigandizëm tek subjektet pre-pubertet.

PS)A

Pyetja 1104 V)1

Në ekografinë kardiake, infarkti karakterizohet nga:

- A) Hipertrofia e ventrikulit të majtë.
- B) Hipertrofia e ventrikulit të djathtë.

- C) Hipokinezia-akinezia e një zone të miokardit.
 - D) Rritje e atriumit të majtë.
 - E) Rritje e atriumit të djathtë.
- PS)C

Pyetja 1105 V)1

Neuropatia diabetike përmban në mënyrë tipike

- A) Një dhëmbje të tipit somatik.
 - B) Një dhëmbje të tipit visceral.
 - C) Një dhëmbje të tipit neuropatik.
 - D) Një dhëmbje homeopatike.
 - E) Një dhëmbje adianatike.
- PS)C

Pyetja 1106 V)1

Qelizat beta të ishujve të Langerhansit sekretojnë

- A) Somatostatinë.
 - B) Glukagon.
 - C) ACTH.
 - D) FSH.
 - E) Insulinë.
- PS)E

Pyetja 1107 V)1

Terapia e hipogonadizmit hipofizar kryhet me

- A) Klomifen.
 - B) Gonadotropinë.
 - C) Testosteron.
 - D) Estroprogesteronikë.
 - E) Ciklofenil.
- PS)B

Pyetja 1108 V)1

Miringitis është një infeksion

- A) I meningjeve.
- B) I membranave timpanike.
- C) Mukozës rinofaringeale.
- D) Membranës tektale.
- E) Tubave ovarienë.

PS)B

Pyetja 1109 V)2

Cili është komplikacioni më i rënde nga ana prognostike i cirkrozës hepatike?

- A) Sindromi hepatorenal.
- B) Insuficiencia ascitike.
- C) Edema.
- D) Shfaqja e varicëve ezofageale.
- E) Encefalopatia porto-sistémike.

PS)A

Pyetja 1110 V)1

Cili nga ekzaminimet e mëposhtëm është më i dobishmi për diagnozën e një neoplazie periferike të pulmonit?

- A) Radiografia standarte e toraksit.
- B) Shintigrafia pulmonare.
- C) CT scanner.
- D) Bronkografia.
- E) Bronkoskopia.

PS)C

Pyetja 1111 V)1

Cila anemi hemolitike zakonisht nuk është normokromike?

- A) Anemia hemolitike autoimune.
- B) Hemoglobinuria paroksistike nokturne.
- C) Talasemia major.
- D) Ikteri hemolitik konstitucional.
- E) Anemia hemolitike nga mangesi në enzima.

PS)C

Pyetja 1112 V)1

Cili është përkufizimi më i saktë i termit 'keloid'?

- A) Një rezultat i shumicës së plagëve të infektuara.
- B) Faza fillestare e indit të granulacionit.
- C) Një cikatrice hipertrofike.
- D) Një tumor benign me origjinë melanocitike.
- E) Një tumor malinj i indit fibroz.

PS)C

Pyetja 1113 V)1

Limfocitet B marrin pjesë në mbrojtjen e organizmit si

- A) Pjesë e sistemit qelizor jospecifik.
- B) Pjesë e sistemit mekanik të mbrojtjes.
- C) Përgjegjës të sistemit humoral specifik të imunitetit.
- D) Pjesë e sistemit qelizor specifik.
- E) Përgjegjës të sistemit humoral të imunitetit të vonuar.

PS)C

Pyetja 1114 V)1

Çfarë është shenja Blumberg?

- A) Dhimbje e provokuar në pikën cistike.
- B) Dhimbje e provokuar nga tërheqja e menjëhershme e dorës nga abdomeni.
- C) Dhimbje e prodhuar nga kompresioni manual i abdomenit.
- D) Dhimbje e provokuar në fosa iliake sinistra.
- E) Dhimbje e provokuar në regjionin apendikular.

PS)B

Pyetja 1115 V)1

Cila nga ngjarjet e mëposhtme pason më shpesh një frakturë kostale?

- A) Hemotoraksi.
- B) Hemopneumotoraksi.
- C) Pneumotoraksi.
- D) Piopneumotoraksi.
- E) Hemoperikardiumi.

PS)C

Pyetja 1116 V)1

Gjuha si luleshtrydhe vërehet në

- A) Skarlatinë.
- B) Sindromin Down.
- C) Anemi pernicioze.
- D) Sprue celiake.
- E) Pelagra.

PS)A

Pyetja 1117 V)2

Cili nga variablat e mëposhtëm është më specifik në diagnozën e podagrës?

- A) Anamneza familjare.
 - B) Matja e uricemisë.
 - C) Llogaritja e fraksionit të ekskrecionit të acidit urik.
 - D) Radiografi e këmbëve, kavaljeve, gjurit.
 - E) Artrocenteza dhe observacionet e likidit sinovial nën dritë të polarizuar.
- PS)E

Pyetja 1118 V)1

Çfarë është një papulë?

- A) Hiperemi e thjeshtë me vazodilatacion.
 - B) Hiperemi, vazodilatacion, infiltracion celular.
 - C) Dëmtim kapilar.
 - D) Degjenerim vaskular e akantolizë.
 - E) Degjenerim retikular me nekrozë.
- PS)B

Pyetja 1119 V)2

Cila nga zonat e mëposhtme të zemrës vaskularizohet nga ramus circumflexum i arteries koronare të majte?

- A) Atriumi i majtë dhe ventrikuli i majtë.
 - B) Atriumi i djathtë e ventrikuli i majtë.
 - C) Atriumi i djathtë dhe ventrikuli i djathtë.
 - D) Apeksi i zemrës.
 - E) Ventrikuli i majtë dhe i djathtë.
- PS)A

Pyetja 1120 V)1

Shkaku kryesor i obstruksionit të rrugëve ajrore tek pacientët pa vetëdije është

- A) Rënia e gjuhës posteriorisht.
 - B) Fleksioni i epiglotisit.
 - C) Bronkospazma.
 - D) Obstruksioni i salivës.
 - E) Kolapsi i trakesë.
- PS)A

Pyetja 1121 V)1

Qelizat e mesangiumit janë të lokalizuara

- A) Në ansën e Henle.

- B) Në arteriolën aferente në korpuskulin renal.
- C) Në duktusin kolektor.
- D) Në glomerulin renal.
- E) Në kaliksin minor.

PS)D

Pyetja 1122 V)3

Të gjitha rrethanat e mëposhtme karakterizojnë 'encefalitin herpetik ', përveç

- A) Prekjes në mënyre tipike të lobeve oksipitale.
- B) Prekjes së individëve të çdo lloj moshe.
- C) Alterimeve të tipit nekrotik hemorragjik.
- D) Manifestimit me çrregullime psikike.
- E) Prekjes së subjekteve imunokompetente.

PS)A

Pyetja 1123 V)1

Cili simptom nuk është tipik ne TIA?

- A) Hemiplegjia.
- B) Vertigo.
- C) Afazia tranzitore.
- D) Humbje e vetëdijes.
- E) Ataksia.

PS)A

Pyetja 1124 V)1

Cili nga parametrat e mëposhtëm të pranishëm në likidin ascitik shkakton diagnozën e peritonitit bakterial spontan?

- A) Aspekti si qumësht.
- B) Prania e 300 granulociteve neutrofile/mm³.
- C) Prania e 300 leukociteve totale/mm³.
- D) Prania e mbi 3g% të proteinave.
- E) Aspekti hemorragjik.

PS)B

Pyetja 1125 V)1

Cistet e Echinococcus granulosus gjenden tek njeriu më shpesh në

- A) Gjak.
- B) Hepar.
- C) Intestin.

- D) Muskulin e strijuar.
 - E) Lëkurë.
- PS)B

Pyetja 1126 V)1

Në rast hipertiroidizmi primar, përqëndrimi i TSH (hormon tireotrop) në gjak është

- A) I rritur ose normal.
 - B) Në limitet e normës.
 - C) I pakësuar.
 - D) Fortësisht i rritur.
 - E) I rritur.
- PS)C

Pyetja 1127 V)2

Cilat anomali laboratorike vërehen shpesh në evolucionin e mononukleozës infektive?

- A) Leukopenia e trombopenia.
 - B) Leukocitozë neutrofilike dhe rritje e transaminazave.
 - C) Leukocitozë limfocitike dhe rritje e transaminazave.
 - D) Leukopenia dhe rritja e bilirubinës.
 - E) Anemi dhe trombopeni.
- PS)C

Pyetja 1128 V)2

Cila nga këto shenja takohet vetëm në rast të një aneurizme aorte abdominale të pakomplikuar?

- A) Vertigot.
 - B) Shok.
 - C) Dhëmbje abdominale akute.
 - D) Masë pulsuese abdominale.
 - E) Okluzion intestinal.
- PS)D

Pyetja 1129 V)1

Në insuficiencën kardiake të lehtë në të moderuar, trajtimi farmakologjik i preferuar konsiston në

- A) Digitalizim me digoksinos e digitoksinë.
- B) Medikamente ACE-inhibitore dhe diuretikët, në bashkëshoqërim me beta-blokues.
- C) Diuretikët kali-protektore.
- D) Inotropet pozitive jodigitalike, ose amrinone ose enoximone.

E) Antagonistë beta-1 selektive, tipi i dobutaminës.

PS)B

Pyetja 1130 V)1

Koha e protrombinës është e rritur në patologjinë e

A) Fibrinolizës primare.

B) Koagulimit intravaskular të diseminuar.

C) Trombopenisë.

D) Hipernatremisë.

E) Hipokloremisë.

PS)B

Pyetja 1131 V)2

Cili nga agjentët e mëposhtëm mund të jetë shkaku i akalazisë?

A) Helicobacter pylori.

B) Schistosoma mansoni.

C) Tripanosoma cruzi.

D) Necator americanus.

E) Leishmania donovani.

PS)C

Pyetja 1132 V)3

Mezotelioma pleurale mund të shfaqet me karakteristikat e mëposhtme, përveç

A) Opacitetit difuz të hemitoraksit.

B) Spontimit kontrolateral të mediastinit.

C) Versamentit hematik pleural.

D) Dispnesë.

E) Dhëmbjes difuze torakale.

PS)B

Pyetja 1133 V)2

Në psikiatri termi 'melankoli' e merr origjinën

A) Nga greqishtja antike, që tregon një çrregullim të bilës.

B) Nga emri i një mali në afërsi të të cilit gjendej një i shenjtë i famshëm.

C) Nga emri i një qyteti antik të famshëm të Anatolit.

D) Nga emri i një perëndie.

E) Nga një term gjeografik antik grek.

PS)A

Pyetja 1134 V)1

Do të ketë një probabilitet të lartë për të zhvilluar cianozë një person i prekur nga

- A) Edema e glotisit.
- B) Intoksikacioni me oksid karboni.
- C) Intoksikacioni me cianur kaliumi.
- D) Anemia pernicioza.
- E) Insuficienca renale.

PS)A

Pyetja 1135 V)1

Diagnoza e hipertensionit esencial është

- A) E sigurtë.
- B) Përgjashtuese.
- C) Instrumentale.
- D) Histologjike.
- E) Serologjike.

PS)B

Pyetja 1136 V)1

Mbrojtja imunitare specifike e mukozave karakterizohet nga prania e

- A) Granulocyteve neutrofile.
- B) Granulocyteve eozinofile.
- C) IgM e IgG.
- D) IgA sekretore.
- E) Interleukina dhe kemokinat.

PS)D

Pyetja 1137 V)1

Një trup i huaj endo-bronkial

- A) Mund të trajtohet me terapi konservative.
- B) Duhet të hiqet nën endoskop.
- C) Duhet të hiqet me rrugë kirurgjikale.
- D) Duhet të hiqet përmes endoskopit, vetëm nëse është me thepa.
- E) Duhet të hiqet në rrugë kirurgjikale, vetëm nëse është me thepa.

PS)B

Pyetja 1138 V)2

Cili nga pohimet e mëposhtëm është i saktë lidhur me reaksionet kutane si efekte anësore të medikamenteve?

- A) Eritema fikse është forma më tipike.
 - B) Eritema fikse nuk recidivon në të njëjtin vend pas rimarrjes së medikamentit përgjegjës.
 - C) Antibiotikët beta-laktamike nuk japin asnjëherë reaksione.
 - D) Laksativët nuk japin asnjëherë reaksione.
 - E) Nga tipi i kuadrit klinik mund të arrish me siguri në medikamentin përgjegjës.
- PS)A

Pyetja 1139 V)1

Cili nga organet e mëposhtëm rezulton më shpesh i prekur nga proceset psikosomatike?

- A) Koloni.
 - B) Veshi i mesëm.
 - C) Veshka.
 - D) Shpretka.
 - E) Testikuli.
- PS)A

Pyetja 1140 V)1

Mungesa e surfaktantit, që ndodh në sindromën infantile të distresit respirator, rezulton në

- A) Një shtim të komplaincës.
 - B) Një stabilizim të volumit alveolar.
 - C) Një shtim të forcës retraktuese të pulmoneve.
 - D) Një reduktim të diferencës alveolo-arteriale të PO₂.
 - E) Një pakësim të forcës së filtracionit në kapilarët pulmonare.
- PS)C

Pyetja 1141 V)3

Cili është mekanizmi i veprimit të triciklikeve?

- A) Stimulojnë sintezën e serotoninës.
 - B) Blllokojnë riabsorbimin e GABA.
 - C) Potencojnë transmetimin kolinergjik.
 - D) Nuk veprojnë në nivel sinaptik.
 - E) Blllokojnë rikapjen e serotoninës e noradrenalinës.
- PS)E

Pyetja 1142 V)2

Cilat janë komplikacionet kryesore të frakturës së collum femuri ?

- A) Shiatalgja.
- B) Insuficiencia venoze në anësitë inferiore.
- C) Nekroza aseptike e kokës së femurit dhe pseudoartroza.
- D) Rigiditet i kofshës.
- E) Kofsha doloroze.

PS)C

Pyetja 1143 V)1

Cili nga steroidet e mëposhtëm prodhohet më shumë se 90% nga testikuli?

- A) Estradioli.
- B) Dihidrotosteroni.
- C) Testosteroni.
- D) Androstenedioni.
- E) 17-OH-progesteroni.

PS)C

Pyetja 1144 V)2

Cila nga të mëposhtmet nuk është një diarre sekretore?

- A) Diarre nga infesioni nga vibrio cholerae.
- B) Diarre nga sindromi karcinoid)
- C) Diarre nga VIPoma.
- D) Diarre nga deficit i disakaridazës.
- E) Diarre nga infeksioni nga Escherichia coli.

PS)D

Pyetja 1145 V)1

Rinolalia e hapur shkakton

- A) Hipoakuzi transmissi.
- B) Pneumoni ab ingetis.
- C) Refluks nazal.
- D) Obstruksion tubarik.
- E) Pamundësi për të artikuluar fjalët.

PS)C

Pyetja 1146 V)2

Cili është simptomi imediat i rakturës së një aneurisme aorte ?

- A) Dhëmbja e papritur akute dhe/ose shok.
- B) Melena.

- C) Hematemezë.
 - D) Anuri.
 - E) Shfaqja e pulseve periferike.
- PS)A

Pyetja 1147 V)3

Në cilën nga këto rrethana haset linja e Ellis-Damoiseau ?

- A) Pleurit eksudativ.
 - B) Hidropneumotoraks.
 - C) Pneumotoraks.
 - D) Perikardit.
 - E) Pneumoni lobare.
- PS)A

Pyetja 1148 V)2

Cili nga pohimet e mëposhtëm në lidhje me hiperkolesteroleminë familjare homozigotë është i vërtetë?

- A) Paraqet një pakesim të kapacitetit të heparit për të metabolizuar kolesterolin.
 - B) Mungojnë receptorët qelizorë për LDL që për pasojë akumulohen në gjak.
 - C) Paraqet një shtim të absorbimit të acideve yndyrore nga ana e epitelit intestinal.
 - D) Paraqet një pakësim të eliminimit të acideve yndyrore përmes rrugëve biliare.
 - E) Mungojnë receptorët për kolesterolin në nivel të hepatociteve.
- PS)B

Pyetja 1149 V)2

Cili nga hormonet e mëposhtëm është një oligopeptid?

- A) Insulina.
 - B) Progesteroni.
 - C) Triidotironina.
 - D) Vazopresina (ADH).
 - E) Tireotropi.
- PS)D

Pyetja 1150 V)1

Cila nga këto sëmundje mund të ketë si komplikacion rupturën splenike?

- A) Cirrhoza hepatike.
- B) Sëmundja Fanconi.
- C) Mieloma.
- D) Mononukleozë infektive.

E) Anemia e May-Hagglin.

PS)D

Pyetja 1151 V)1

Vena porta dërgon në mëlçi përqindjen e gjakut prej

A) 20%.

B) 50%.

C) 75%.

D) 20%.

E) 95%.

PS)C

Pyetja 1152 V)1

Cili është agjenti etiologjik i pneumonisë jashtë-spitalore që haset më shpesh?

A) Legionela pneumofila.

B) Klebsiella pneumoniae.

C) Streptokoku pneumoniae.

D) Stafilokoku.

E) Enterokoku.

PS)C

Pyetja 1153 V)2

M.I.C tregon

A) Koncentrimin më të lartë të antibiotikut që lejon zhvillimin e variantit bakterial në antibiogramë.

B) Përqëndrimin minimal të antibiotikut që frenon zhvillimin e variantit bakterial në antibiogramë.

C) Sasinë e antibiotikut që vret variantin bakterial në kulturë.

D) Sasinë e antibiotikut që favorizon zhvillimin e variantit bakterial në antibiogramë.

E) Përqëndrimin minimal të mikrobeve të afta për të infektuar një kafshë laborator.

PS)B

Pyetja 1154 V)1

Në kushte normale pH i gjakut është

A) 7.50+/-0.02.

B) 7.40+/-0.02.

C) 7.30+/-0.02.

D) 7.20+/-0.02.

E) 7.10+/-0.02.

PS)B

Pyetja 1155 V)1

Elementi diagnostik i erizipelës është

- A) Dhëmbje e gjallë dhe shpuese.
- B) Shënja e "shkallës".
- C) Konsistenca e butë.
- D) Aspekt nekrotik central.
- E) Shënja e "krepitantes"

PS)B

Pyetja 1156 V)2

Ku pozicionohet rruga e hyrjes së mediastinoskopisë?

- A) Përmes sternumit.
- B) Në hapesirën e III interkostale parasternale të djathtë.
- C) Në hapesirën e II interkostale parasternale të majtë.
- D) Në fossa jugulare.
- E) Në lokalizim infra-ksifoid.

PS)D

Pyetja 1157 V)1

Virilizimi mund të vërehet në rrethanat e

- A) Hiperplazisë surrenaliene.
- B) Miksedemës.
- C) Hipopituitarizmit.
- D) Hipertiroidizmit.
- E) Sindromit Turner.

PS)A

Pyetja 1158 V)3

Përse në disa zona gjeografike është i përhapur aleli për beta-talaseminë?

- A) Për shkak të prejardhjes gjenetike.
- B) Sepse përmban një avantazh selektiv në klimat e ngrohta.
- C) Sepse në heterozigotë ka avantazh selektiv duke u përballur me malarjen e përhapur në ato zona.
- D) Sepse frenon përhapjen e sëmundjes në popullatë.
- E) Sepse frenon infeksionin nga ana e virusit të malarjes në heterozigotet.

PS)C

Pyetja 1159 V)1

Komplikacioni më i shpeshtë i një infarkti miokardi është

- A) Ruptura e muskulit papilar.
- B) Perikarditi hemorragjik.
- C) Instalimi i nje aritmie.
- D) Ruptura e septumit interventrikular.
- E) Miokarditi.

PS)C

Pyetja 1160 V)2

Prania në qarkullimin e IgM specifike ndaj një agjenti të caktuar sugjeron

- A) Nje infeksion pre-ekzistent.
- B) Një vaksinim të mëparshëm.
- C) Një infeksion recent.
- D) Një sëmundje kronike.
- E) Një infeksion i sigurtë bakterial.

PS)C

Pyetja 1161 V)1

Nga cili kombinim anormal kromozomik karakterizohet sindromi Klineferter?

- A) XO.
- B) Trisomi 15.
- C) Delecioni i krahut te shkurtër të kromozomit 18.
- D) XXY.
- E) XYY.

PS)D

Pyetja 1162 V)2

Cila nga motivacionet e mëposhtme nuk është percaktuese për rekomandimin e analizave laboratorike?

- A) Konfirmim i një dyshimi klinik.
- B) Formulim i një prognoze.
- C) Përrjashtim i një diagnoze.
- D) Konfirmim i një diagnoze.
- E) Kërkesa e pacienti.

PS)E

Pyetja 1163 V)1

Një karcinomë është:

- A) Një neoplazi beninje.
- B) Një proces inflamator.
- C) Një neoplazi epiteliale malinje.
- D) Një neoplazi mezenkimale malinje.
- E) Një infeksion purulent.

PS)C

Pyetja 1164 V)1

Të gjithë medikamentet e mëposhtëm përdoren në terapinë e astmës, përveç

- A) Terbutalinës.
- B) Teofilinës.
- C) Kromoglikatit të natriumit.
- D) Neostigminës.
- E) Prednisonit.

PS)D

Pyetja 1165 V)3

Leucemia akute me qeliza T e adultit bashkëshoqërohet me

- A) Citomegalovirus.
- B) HTLV-1.
- C) Parvovirus.
- D) Adenovirus.
- E) Virus Epstein-Barr.

PS)B

Pyetja 1166 V)2

Cili lezion elementar karakterizon pemfigus?

- A) Papula me lokalizim intraepidermik.
- B) Papula me lokalizim subepidermik.
- C) Bula me lokalizim intraepidermik.
- D) Bula me lokalizim subepidermik.
- E) Bula me lokalizim subkutan.

PS)D

Pyetja 1167 V)1

Osteoporoza e tipit I është e korreluar me deficiencën e hormonit

- A) Kalcitoninë.

- B) Testosteroni.
- C) Estrogeni.
- D) Parathormoni.
- E) Tireotropi.

PS)C

Pyetja 1168 V)1

Cili nga produktet e mëposhtëm, që bëjnë pjesë në ushqime, nuk ka vlerë ushqimore të rëndësishme?

- A) Celuloza
- B) Glikogeni
- C) Fruktoza
- D) Lecitina
- E) Kolesterolli

PS)A

Pyetja 1169 V)1

Përkufizohet 'anginë e efortit'

- A) Angina de novo.
- B) Angina stabile.
- C) Angina Prinzmetal.
- D) Angina e qetësisë.
- E) Angina me ngarkesë variabile.

PS)B

Pyetja 1170 V)1

Në ikterin obstruktiv rezulton i rritur

- A) Albuminemia.
- B) Fosfataza alkaline.
- C) Y-globulinemia.
- D) Urobilina.
- E) Amoniemia.

PS)B

Pyetja 1171 V)1

Cili është nënkuptimi i termit 'seropozitiv' në infeksionin nga HIV?

- A) Subjekt që ka kontakt me infeksionin.
- B) Subjekt i sëmurë me AIDS.
- C) Subjekt i shëruar nga infeksioni.

- D) Subjekt që është i mbrojtur nga kontakti me infeksionin.
 - E) Subjekt i ekzaminuar në periudhën e inkubacionit.
- PS)A

Pyetja 1172 V)2

Kohëzgjatja mesatare e episodit depresiv të patrajtuar është

- A) 1 muaj
 - B) 6 muaj
 - C) 12 muaj
 - D) 2 vjet
 - E) 3 vjet
- PS)B

Pyetja 1173 V)1

Nga dallojnë grupet e gjakut A, B, AB, O?

- A) Disa kanë një proteinë në siperfaqet e eritrociteve ndërsa të tjerët jo .
 - B) Kanë rezidua karbohidratesh të lidhura me molekulat lipidike që dalin nga membrana e eritrocitit.
 - C) Kanë sekuenca të ndryshme DNA-je për një proteinë esenciale.
 - D) Numri i atomeve të hekurit në grupet hemo ndryshon nga një grup në tjetrin.
 - E) Forma e eritrociteve ndryshon nga një grup gjaku në tjetrin.
- PS)B

Pyetja 1174 V)1

Cilat janë qelizat protagoniste të inflamacionit kronik ?

- A) Monocitet, makrofaget, limfocitet e fibroblastet
 - B) Limfocitet e granulocitet
 - C) Fagocitet mononukleare e polimorfonukleare
 - D) Qelizat endoteliale
 - E) Qelizat endoteliale e fibroblastet
- PS)A

Pyetja 1175 V)2

Duktuset kolektore të veshkës

- A) Mund të sekretojnë në mënyre aktive molekula uji në urinë.
- B) Janë përgjegjës për shumicën e riabsorbimit të ujit që vjen në veshka.
- C) Janë përgjegjës të osmolaritetit final të urinës
- D) Janë shndëruar të papërshekueshëm nga uji përmes veprimit të hormonit anti-diuretik.
- E) Sekretojnë në mënyre aktive urenë.

PS)C

Pyetja 1176 V)3

Sëmundja e Menetrier karakterizohet nga

- A) Disfagia.
- B) Fistula intestinale rekurente.
- C) Hipertrofia gjigande e plikave gastrike.
- D) Divertikuloza.
- E) Atrofia gastrike.

PS)C

Pyetja 1177 V)1

Kreatin fosfokinaza (CPK) katalizon

- A) Formimin e fosfokreatininës nga kreatina dhe ATP-ja.
- B) Formimin e fosfokreatinës nga kreatina dhe acidi fosforik.
- C) Formimin e kreatininës.
- D) Formimin e kreatininës dhe acidit fosforik nga fosfokreatina.
- E) Formimin e fosfokreatinës.

PS)A

Pyetja 1178 V)2

Cila nga këto simptoma nuk është karakteristike për një çrregullim të sjelljes?

- A) Fuga
- B) Thyerja e rregullave
- C) Agresionet
- D) Gënjeshttrat
- E) Tiket

PS)E

Pyetja 1179 V)3

Karcinoma prostatike metastazon më shpesh

- A) Në skelet.
- B) Në surenale.
- C) Në mëlçi.
- D) Në mushkëri.
- E) Në tru.

PS)A

Pyetja 1180 V)1

Dimensionet e aksoneve janë të ndryshme në pjesë të ndryshme të sistemit nervor. Cila është gjatësia maksimale që mund të arrijnë?

- A) Jo më shumë se një nanometër
- B) 1-100 mikron
- C) 1-10 milimetra
- D) Decimetra
- E) Deri në 100 centrimetra e më tepër

PS)E

Pyetja 1181 V)1

Manitoli është

- A) Një antikoagulant oral.
- B) Një diuretik osmotik.
- C) Një beta-blokues.
- D) Një kalci-blokues.
- E) Një antidot që kelaton plumbin.

PS)B

Pyetja 1182 V)1

Një astrupogramë e dhënë: pH=7.41, pCO₂=40.3, pO₂=106, nënkupton

- A) Insuficiencë respiratore akute normokapnike të kompensuar.
- B) Insuficiencë respiratore kronike normokapnike të pakompensuar.
- C) Astrupogramë në limitet e normës.
- D) Acidozë respiratore e kompensuar.
- E) Alkalozë respiratore e kompensuar.

PS)C

Pyetja 1183 V)2

Hemikrania mund të karakterizohet nga të gjitha simptomat e mëposhtme, përveç

- A) Alterimeve të pamjes.
- B) Shenjës së Kernig pozitiv.
- C) Anoreksisë.
- D) Nauzesë.
- E) Dhëmbjes në fillim pulsante.

PS)B

Pyetja 1184 V)2

Cila nga pohimet e mëposhtëm lidhur me sklerozën multiple është e gabuar?

- A) Prek vetëm sistemin nervor qëndror.
- B) Incidenca është shumë më e lartë në zonat me temperaturë kontinentale tropikale.
- C) Aspekti patologjik karakteristik është alteracioni i substancës gri.
- D) Diagnoza mund të bëhet nga potencialet e evokuara vizive.
- E) Janë gjetur shpesh nivele të larta të IgG në likidit cerebro-spinal.

PS)C

Pyetja 1185 V)1

Çfarë rroli kanë muskujt sternokleidomastoid dhe skalenë në respiracion?

- A) Inspiratorë e ekspiratorë ndihmës
- B) Nuk ndërhyjnë në respiracion
- C) Inspiratorë kryesorë
- D) Inspiratorë ndihmës
- E) Ekspiratorë ndihmës

PS)D

Pyetja 1186 V)3

Cili nga këto ekzaminime ka sensibilitetin më të lartë për diagnozën e Lupusit Eritematoz të diseminuar?

- A) Antikorpët antinukleare
- B) Kërkimi i qelizave LE
- C) Testi i fiksimit të komplementit
- D) Dye test
- E) Reaksioni i Paul Tunnel

PS)A

Pyetja 1187 V)2

Të gjitha janë efekte anësore të rëndësishme të ciklosporinës, me përjashtim të

- A) Nefrotoksicitetit.
- B) Hiperkaliemisë.
- C) Hipertensionit.
- D) Hepatotoksicitetit.
- E) Alopecisë.

PS)E

Pyetja 1188 V)1

Shkaku më i shpeshtë i iktusit kardio-embolik është

- A) Prolapsi i valvulës mitrale.

- B) Stenoza aortës.
- C) Fibrilacioni atrial jo-valvular.
- D) Miksoma atriale.
- E) Tetralogjia Fallot.

PS)C

Pyetja 1189 V)1

Me luksacion nënkuptohet

- A) Një laceracion ligamentoz total.
- B) Një humbje e përkohshme e raporteve artikulare.
- C) Një frakturë artikulare.
- D) Një humbje permanente e raporteve artikulare.
- E) Një frakturë artikulare e shoqëruar me lezion kapsulo-ligamentoz.

PS)D

Pyetja 1190 V)1

Cila nga situatat e mëposhtme nuk hyn midis atyre në të cilat administrimi i ACE-inhibitorëve mund të induktojë insuficiencën renale akute?

- A) Pacient anefritik
- B) Pacient i moshuar me insuficiencë kardiake kongjестive
- C) Stenoza bilaterale e arteries renale
- D) Dizanteria akute me dehidratim
- E) Stenoza e arteries renale tek pacientë me një veshkë

PS)A

Pyetja 1191 V)2

Tek një pacient i dehidratuar uji korporal duhet të rikonstituohet nëpërmjet një perfuzioni endovenoz të

- A) Ujit të distiluar.
- B) Solucionit të NaCl 0.9%.
- C) Solucionit hipertonic të albuminës.
- D) Solucionit NaCl 5%.
- E) Solucionit glukozë 10%.

PS)B

Pyetja 1192 V)1

Episodet hemorragjike mund të shoqërohen me një defiçit të

- A) Prekalikreinës.
- B) Proteinës S.

- C) Faktorit XII.
 - D) Faktorit VIII.
 - E) Heparin-sulfatit me peshë të lartë molekulare.
- PS)D

Pyetja 1193 V)1

Cili është trajtimi i zgjedhur i pemfigus?

- A) Antibiotikët
- B) Vazodilatatorët
- C) Vazokonstriktorët
- D) Antiprotozoarët
- E) Kortikosteroidet

PS)E

Pyetja 1194 V)1

Çfarë nënkupton testi ELISA?

- A) Një provë imuno-enzimatike
- B) Nje test radio-imunologjik
- C) Një provë hemoaglutinimi pasiv.
- D) Një ngjyrim i mikroskopisë elektronike.
- E) Një metodë për llogaritjen e ngarkesës virale

PS)A

Pyetja 1195 V)1

Trombocitopatia përkufizohet si

- A) Reduktim i trombociteve.
- B) Deficit i adezionit ose agregimit trombocitar.
- C) Shtim i numrit të trombociteve.
- D) Difekt i prodhimit të trombociteve.
- E) Shtim i degradimit trombocitar.

PS)B

Pyetja 1196 V)2

Cila është enzima që mungon në zonën glomerulare të korteksit surenal?

- A) 21-hidroksilaza
- B) 17-alfa-hidroksilaza
- C) 11-hidroksilaza
- D) 3-holo-dehidrogenaza
- E) Desolaza

PS)B

Pyetja 1197 V)2

Çfare është fusha e vetëdijes?

- A) Tërësia e kujtimeve
- B) Momenti që paraprin rizgjimin
- C) Shtrirja e konfabulacioneve
- D) Vetëdija e fushës vizive
- E) Tërësia e përmbajtjes aktuale të vetëdijes në një moment të dhënë

PS)E

Pyetja 1198 V)1

Përmes placentës kalojnë

- A) IgM-ja.
- B) IgG-ja.
- C) Imunokomplekset me shumicë antigenësh.
- D) Imunokomplekset me shumicë antikorpesh.
- E) Imunokomplekset me komplement të fiksuar.

PS)B

Pyetja 1199 V)1

Për kërkimin e metastazave pulmonare, ekzaminimi më i përshtatshëm është

- A) CT skaneri.
- B) Rezonanca magnetike.
- C) Angiografia.
- D) Ekografia.
- E) Shintigrafia.

PS)A

Pyetja 1200 V)1

Si quhet një ankth i fortë i padominuar dhe i pamotivuar nga situatat, veprimet apo objektet?

- A) Frikë
- B) Fobi
- C) Obsesion
- D) Pseudohallucinacion
- E) Delirium

PS)B

Pyetja 1201 V)1

Kolapsi pulmonar mund të verifikohet në të gjitha rrethanat e mëposhtme, përveç

- A) Pneumotoraksit.
- B) Plagës pulmonare.
- C) Obstruksionit bronkial.
- D) Plagës parietale.
- E) Hemotoraksit.

PS)C

Pyetja 1202 V)2

Çfarë pozicioni zënë qelizat plazmatike në popullaten limfoide?

- A) Janë progenitorë të limfociteve supresore
- B) Marrin origjinën nga limfocitet T në nivel të timusit
- C) Janë stadi i maturuar terminal i linjës B limfocitare
- D) Janë të afta të diferencohen nën stimujt antigenikë.
- E) Proliferojnë nën veprimin e PHA(PhytoHemagglutinin)

PS)C

Pyetja 1203 V)1

Në kushte normale, kohëzgjatja e intervalit P-Q të EKG-së së një adulti është rreth

- A) 0.12-0.20 sekonda.
- B) 0.18-0.24 sekonda.
- C) 0.06-0.08 sekonda.
- D) 0.10-0.12 sekonda.
- E) 0.24-0.30 sekonda.

PS)A

Pyetja 1204 V)1

Biodisponibiliteti i një medikamenti

- A) Është matja e fraksionit të dozës së administruar që arrin qarkullimin sistemik.
- B) Është proporcional me efikasitetin.
- C) Është në përpjestim të drejtë me dozën e administruar.
- D) Nuk varion në funksion nga rruga e administrimit të përdorur.
- E) Është i ulur për medikamentet më pak të fuqishëm.

PS)A

Pyetja 1205 V)1

Roli kryesor fiziologjik i mioglobinës është

- A) Të transportojë O₂ në muskul.
- B) Të magazinonjë informacionin genetik.
- C) Të kontraktojnë muskujt.
- D) Të magazinonjë O₂.
- E) Të transportojë glukozën.

PS)D

Pyetja 1206 V)2

Çfarë nënkuptojmë me tumor Pancoast?

- A) Tumor i kufizuar në hilusin pulmonar.
- B) Tumor me prekje të nervit laringeal recurrens.
- C) Tumor me zona likuidifikimi në brendësi.
- D) Tumor që ka origjinën në sulkusin superior me prekje të pleksit brakial.
- E) Tumor me metastaza cerebrale unike.

PS)D

Pyetja 1207 V)1

Rritja e IgE serike mund të haset më shpesh në

- A) Leuceminë mieloide kronike.
- B) Aneminë hemolitike nga defekt i PK-së.
- C) Favizëm.
- D) Parazitozë.
- E) Saturnizëm.

PS)D

Pyetja 1208 V)2

Nefropatia që shkakton më shpesh IRK është

- A) Nefropatia diabetike.
- B) Nefropatia intersticiale.
- C) Nefropatia glomerulare.
- D) Nefropatia vaskulare.
- E) Nefropatia tubulare.

PS)A

Pyetja 1209 V)1

Cila simptomë okulare vërehet në miasteni?

- A) Keratitis.
- B) Konjuktivitis.
- C) Ptoza palpebrale.

- D) Entropioni.
 - E) Ektropioni.
- PS)C

Pyetja 1210 V)1

Të gjitha shenjat e mëposhtme janë pjesë e sëmundjes së Cushing, përveç

- A) Policitemisë.
 - B) Facies lunaris.
 - C) Eozinofilisë.
 - D) Diabetit.
 - E) Osteoporozës.
- PS)C

Pyetja 1211 V)1

Cili është presioni i oksigjenit që përmbahet normalisht në ajrin e ambientit?

- A) Rreth 7%
 - B) Rreth 12 %
 - C) Rreth 40%
 - D) Rreth 22 %
 - E) Rreth 30%
- PS)D

Pyetja 1212 V)3

Tek një pacient me kuadër klinik të akromegalisë dhe nivele të GH=4.8ng/ml, mënyra më e thjeshtë për të vendosur nëse ka akromegali aktive është

- A) Realizimi i rezonancës magnetike të sela turcica.
 - B) Dozimi i IGF-1.
 - C) Praktikimi i testit të TRH.
 - D) Praktikimi i testit me bromkriptinë.
 - E) Praktikimi i testit me somatostatinë.
- PS)B

Pyetja 1213 V)2

Cili nga pohimet e mëposhtëm në lidhje me output-in kardial është i gabuar?

- A) Reduktohet në pozicion në këmbë.
- B) Rritet për një gradë të ulët të hipoksisë.
- C) Rritet në insuficiencën kardiakë.
- D) Rritet në ethe
- E) Është rreth 4-6 litra.minutë tek adulti mesatar

PS)C

Pyetja 1214 V)2

Quhen izotope, bërthamat që diferencohen mes tyre nga numri i

- A) Neutroneve dhe protoneve.
- B) Vetëm protoneve.
- C) Elektroneve dhe protoneve.
- D) Vetëm neutroneve.
- E) Neutroneve dhe elektroneve.

PS)D

Pyetja 1215 V)1

Të gjitha rezultatet klinike laboratorike të mëposhtme hedhin dyshime për diagnozën e sindromës Zollinger-Ellison, përveç

- A) Pozitivitetit të testit respirator me ureazë.
- B) Nivelit të shtuar të gastrinës serike.
- C) Ulcerave multiple gastro-intestinale.
- D) Pozitivitetit të testit të stimulimit të sekretinës.
- E) B+D

PS)A

Pyetja 1216 V)1

Nga cila arterie merr origjinën arteria silviane?

- A) Nga arteria cerebrale anteriore.
- B) Nga arteria pulmonare.
- C) Nga arteria temporale.
- D) Nga arteria vertebrale.
- E) Nga arteria karotide.

PS)E

Pyetja 1217 V)2

Në një atak astmatik ekspektorati i prodhuar në mënyrë tipike mund të përmbajë

- A) Korpuskulat e Mallory.
- B) Qelizat e Reed-Sternberg.
- C) Spiralet e Curschmann.
- D) Eritrocitet.
- E) Qelizat mezoteliale.

PS)C

Pyetja 1218 V)1

Cili nga medikamentet e mëposhtme antituberkulare ka si efekt kolateral shfaqjen e çrregullimeve vizive?

- A) Etambutoli
- B) Isoniazidi
- C) Streptomicina
- D) Pirazinamide
- E) Rifampicina

PS)A

Pyetja 1219 V)2

Tek cila kafshë prodhohen oocistet e Toxoplasma gondii?

- A) Papagalli
- B) Macja
- C) Qeni
- D) Gjedhët
- E) Derri

PS)B

Pyetja 1220 V)2

Cili është ekzaminimi i zgjedhur për studimin e neoplazive retroperitoneale?

- A) Urografia
- B) CT skaner
- C) Aortografia
- D) Retropneumoperitoneum
- E) Kiazma optike

PS)B

Pyetja 1221 V)3

Tumori më i shpeshtë i gjëndrës parotis është

- A) Karcinoma adenocistike.
- B) Cistadenolimfoma.
- C) Adenoma pleomorfe.
- D) Karcinoma duktale.
- E) Karcinoma mukoepidermoide.

PS)C

Pyetja 1222 V)2

Cilët janë efektet kryesore të rrezatimit jonizues?

- A) Somatike
 - B) Gjenetike
 - C) Somatike dhe gjenetike
 - D) Konstipacioni
 - E) Pakësimi i eritrosedimentit
- PS)C

Pyetja 1223 V)1

Cilat teste laboratorikë janë të pritshme në diagnozën e pankreatitit akut?

- A) Bilirubinemia
 - B) Fosfataza alkaline
 - C) Amilaza dhe lipaza
 - D) Urobilinogeni
 - E) Pankreozimia
- PS)C

Pyetja 1224 V)2

Vdekja cerebrale nënkupton

- A) Gjëndje vegetative persistente.
 - B) EEG izoeletrike.
 - C) Glasgow Coma Scale e barabartë me 3.
 - D) Prania e Babinski bilaterale.
 - E) Koma të zgjatur.
- PS)B

Pyetja 1225 V)3

Në komën uremike është i pranishëm çrregullimi i

- A) Të vjellave.
 - B) Hiperglicemisë.
 - C) Urobilinurisë.
 - D) Poliglobulisë.
 - E) Dhëmbjes abdominale.
- PS)A

Pyetja 1226 V)2

Lezionet e morbus celiake takohen në nivel

- A) Të stomakut.

- B) Vetëm të jejunumit.
 - C) Të duodenit dhe jejunumit.
 - D) Të kolonit
 - E) Vetëm të duodenit.
- PS)C

Pyetja 1227 V)2

Cili nga aminoacidet e mëposhtëm përmban një grup sulfhidrik?

- A) Cisteina
 - B) Asidi aspartik
 - C) Alanina
 - D) Prolina
 - E) Tirozina
- PS)A

Pyetja 1228 V)1

Rritja e perimetrit kranial mund të jetë një shenjë e

- A) Spasticitetit.
 - B) Epilepsisë.
 - C) Vuajtjes cerebrale
 - D) Hidrocefalisë.
 - E) Sëmundjeve neuromuskulare.
- PS)D

Pyetja 1229 V)1

Koha e protrombinës influencohet nga

- A) Pakësimi i numrit të trombociteve.
 - B) Shtimi i faktorit anti-heparinik.
 - C) Mungesa e faktorit të VII.
 - D) Mungesa e faktorit të VIII.
 - E) Mungesa e faktorit të IX.
- PS)C

Pyetja 1230 V)3

Në lidhje me pneumotoraksin hipertensiv, cili pohim është i gabuar?

- A) Verifikohet kur një sasi ajri futet në hapësirën pleurale në çdo inspirim për të dalë më pas në ekspiracionin e radhës.
- B) Përbën një urgjencë kirurgjikale.

- C) Dhëmbje torakale, polipnea, cianozë, turgor i jugulareve janë shënja tipike edhe pse jo gjithnjë janë të pranishme.
 - D) Inserimi në urgjencë i një ageje me kalibër të madh në kavitetin pleural çon në transformimin e një pneumotoraksi hipertensiv në pneumotoraks jo-hipertensiv, formë më pak e rëndë në planin respirator dhe hemodinamik.
 - E) Shtimi i presioneve intrapleurale provokon kolapsin pulmonar dhe më pas zhvendosjen e mediastinit në anën e kundërt.
- PS)A

Pyetja 1231 V)3

Të gjitha të mëposhtmet klasifikohen si spondiloartropati, përveç

- A) Artritit psoriatik.
 - B) Artritit reaktiv.
 - C) Sëmundjes së reiter.
 - D) Polimialgjisë reumatike.
 - E) Spondilitit ankilozant.
- PS)D

Pyetja 1232 V)2

Kur aktivizohen, secili prej faktorëve të mëposhtëm të koagulimit veprojnë si një serinë-proteazë, përveç

- A) II.
 - B) VII.
 - C) VIII.
 - D) IX.
 - E) XI.
- PS)C

Pyetja 1233 V)1

Në insuficiencën e aortës kemi një aspekt ekokardiografik të

- A) Hipertensionit pulmonar.
 - B) Mungesës së kordave tendinoze.
 - C) Dilatimit atrial të majtë.
 - D) Dilatimit ventrikular të djathtë.
 - E) Flutering të lembos anteriore të valvulës mitrale.
- PS)E

Pyetja 1234 V)1

Hapi i parë për diagnozën e Policitemisë Vera është

- A) Të përcaktohet masa e eritrociteve dhe volumit plazmatik.
- B) Të përcaktohen nivelet serike të eritropoetinës.
- C) Të realizohet një ekografi renale.
- D) Të realizohet një astrupogramë.
- E) Të përcaktohet fosfataza alkaline leukocitare.

PS)A

Pyetja 1235 V)2

Një i ri 25 vjeçar vdes papritmas. Një ekzaminim toksikologjik evidenton nivele të larta të amfetaminës. Cila nga alternativat e mëposhtme është gjetja anatomo-patologjike më e mundëshme?

- A) Infarkti i miokardit.
- B) Miokardit bakterial.
- C) Rupturë e aortës.
- D) Insuficiencë valvulare akute.
- E) Tamponada e zëmrës.

PS)A

Pyetja 1236 V)2

Cili pohim është i saktë?

- A) Ekzistojnë vetëm gjëndje trombofilike kongenitale.
- B) Lupusi eritematoz i diseminuar bashkëshoqërohet gjithnjë me një gjëndje trombofilike.
- C) Lupusi eritematoz shpesh bashkëshoqëron praninë e antikorpeve antifosfolipidike që predispozojnë për trombozë.
- D) Lue përfaqëson një gjëndje trombofilike.
- E) Mutacioni i Leiden është një alterim i proteinës C të koagulimit.

PS)C

Pyetja 1237 V)1

Hiperketonemia vërehet në rrethanën e

- A) Hemikranisë.
- B) Konstipacionit.
- C) Atakut të angina pectoris.
- D) Dispepsisë hipopeptike.
- E) Atrofisë akute të verdhë.

PS)E

Pyetja 1238 V)3

Terapia e pneumonisë jashtë-spitalore

- A) Është pothuajse gjithnjë empirike ose racionale.
- B) Nuk udhëhiqet nga një diagnozë etiologjike.
- C) Udhëhiqet gjithnjë nga një diagnozë etiologjike.
- D) Udhëhiqet nga një ekzaminim radiologjik.
- E) Konsiston në përdorimin e cefalosporinave me spekter të gjerë veprimi.

PS)A

Pyetja 1239 V)2

Cila nga karakteristikat e mëposhtme nuk bën pjesë në sindromën hiperosmolare jo-ketozike?

- A) Glicemia > 600 mg/dl.
- B) Acidet yndyrore plazmatike të rritura.
- C) Shfaqje e mundëshme pas infeksioneve të rënda.
- D) Incidenca e lartë tek personat e moshuar.
- E) Laktatet e ulura.

PS)E

Pyetja 1240 V)1

Sasia totale e gjakut tek njeriu adult është rreth

- A) 2% e peshës trupore.
- B) 4% e peshës trupore.
- C) 8% e peshës trupore.
- D) 10% e peshës trupore.
- E) 15% e peshës trupore.

PS)C

Pyetja 1241 V)2

Në lidhje me pneumotoraksin hipertensiv, të gjitha pohimet janë të gabuara me përjashtim të:

- A) Shoqërohet me hipertension arterial.
- B) Kërkon dekompressionin imediat.
- C) Nuk provokon alteracione të respiracionit.
- D) Shkaktohet nga versamentet pleurale.
- E) Kërkon vendosjen e një sonde nazo-gastrike.

PS)B

Pyetja 1242 V)2

Një komplikacion i rëndë i korigjimit tepër të shpejtë të hipernatremisë është

- A) Edema cerebrale.
- B) Mielinoliza pontine centrale.
- C) Hemorragjia subaraknoidale.

- D) Hemorragjia subdurale.
 - E) Hemorragjia intracerebrale.
- PS)A

Pyetja 1243 V)1

Noradrenalina dhe adrenalina janë

- A) Dy hormone të prodhuara nga shtresa amedulare e surenales.
 - B) Prekursorë të hormonit dopaminë.
 - C) Ndërmjetës metabolikë në sintezën e tirozinës.
 - D) Dy katekolamina me veprim hormonal të prodhuara nga shtresa medulare e surenales.
 - E) Dy polipeptide të përfshirë në katabolizmin e grupeve aminikë.
- PS)D

Pyetja 1244 V)2

Agjenti etiologjik i epiglotitit akut është

- A) Bacili i Plaut-Vincent.
 - B) Mycoplasma pneumonie.
 - C) Pseudomonas aeruginoza.
 - D) Hemofilus influenze.
 - E) Stafilokoku.
- PS)D

Pyetja 1245 V)2

Cila nga këto shenja është patognomonike për glomerulonefritin me lezime minimale?

- A) Proteinuria selektive
 - B) Mikrohematuria
 - C) Hiperazotemia
 - D) Leukocituria
 - E) Cilindruria
- PS)A

Pyetja 1246 V)1

Çfarë është një neoplazi?

- A) Një proliferim i qelizave tumorale.
 - B) Një proliferim i qelizave normale.
 - C) Një proliferim i qelizave tumorale e normale.
 - D) Një proliferim i qelizave hiperplazike.
 - E) Një proliferim i qelizave tumorale beninje.
- PS)A

Pyetja 1247 V)1

Në fenilketonuri vërehet një shtim hematik i

- A) Yriptofanit.
- B) Glicinës.
- C) Leucinës.
- D) Homocisteinës.
- E) Fenilalaninës.

PS)E

Pyetja 1248 V)2

Reaksioni akrozomial

- A) është një fazë e spermatogenezës.
- B) është një fazë e spermiohistogenezës.
- C) është një fazë e oogenezës.
- D) është një fazë e fekondimit.
- E) është një fazë e zhvillimit të embrionit.

PS)D

Pyetja 1249 V)3

Cili nga tipet qelizorë përfaqëson targetin kryesor të veprimit farmakologjik të ciklosporinës dhe të tacrolimus?

- A) Qelizat dentritike
- B) Limfocitet B
- C) Limfocitet T
- D) Makrofaget
- E) Qelizat NK

PS)C

Pyetja 1250 V)2

Cila nga alternativat e mëposhtme është një funksion fiziologjik i rëndësishëm i lëngut biliar?

- A) Konjugimi me toksikët në mënyrë favorizimin e ekskrecionit të tyre.
- B) Lejon eliminimin e produkteve të breakdown të hemoglobinës.
- C) Lehtësimi i absorbimit të yndyrnave ushqimore.
- D) Lejimi i absorbimit të vit B12.
- E) Mbajtja e një pH të përshtatshëm intestinal.

PS)C

Pyetja 1251 V)1

Nga e kanë origjinën arteriet koronariene?

- A) Nga aorta.
- B) Nga arteria pulmonare.
- C) Nga arteria subklavia.
- D) Nga sinusi koronarien.
- E) Nga ventrikuli i majtë.

PS)A

Pyetja 1252 V)2

Diagnoza e abscesit subfrenik saktësohet më tepër me

- A) Pneumoperitoneum.
- B) Radiografi direkte të abdomenit.
- C) CT skaner.
- D) Kolangiografi.
- E) Ekzaminim objektiv.

PS)C

Pyetja 1253 V)3

Cili infeksion kongjenital mund të dyshohet tek një neonat me mikrocefali, kalcifikime cerebrale, korioretinit?

- A) VZV
- B) HSV
- C) Toksoplazmozë
- D) Rubeolë
- E) CMV

PS)C

Pyetja 1254 V)1

Aktiviteti i qendrave respiratore ndikohet më shumë nga

- A) Hiperkapnia.
- B) Hipoksemia.
- C) Lëvizjet e paretit torakal.
- D) Alkalozia.
- E) Acidoza.

PS)A

Pyetja 1255 V)3

Kur përdoret minoxidil në solution 2%?

- A) Infeksione nga Gram-pozitivët
 - B) Psoriaza pustuloze
 - C) Akne vulgaris
 - D) Alopecia androgenica
 - E) Alopecia cikatriciale
- PS)D

Pyetja 1256 V)2

Aldosteroni

- A) Sekretohet nga aparati juxtaglomerular.
 - B) Sekretohet në sasi të madhe kur shtohet përqëndrimi i likidit ekstraqelizor.
 - C) Shton riabsorbimin e fosfatit në nefronin distal.
 - D) Shtivizon riabsorbimin e natriumit në nefronin distal.
 - E) Sekretohet si përgjigje ndaj një hormoni hipofizar.
- PS)D

Pyetja 1257 V)1

Acidi klavulanik paraqet karakteristikën e

- A) Spektrit të gjerë antibakterial.
 - B) Rezistencës ndaj beta-laktamazës.
 - C) A+B.
 - D) Specifitetit për mikrobet gram pozitive.
 - E) Specifitetit për mikrobet gram negative.
- PS)B

Pyetja 1258 V)1

Tumori renal më i shpeshtë është

- A) Tumori Wilms.
 - B) Karcinoma me qeliza të qarta.
 - C) Adenoma.
 - D) Leiomioma.
 - E) Leiomiosarcoma.
- PS)B

Pyetja 1259 V)1

Përsa i përket astmës bronkiale, cili nga pohimet e mëposhtëm është i gabuar?

- A) Shumë bronke të mesme dhe të vogla janë të mbushura me mukus viskoz.
- B) Membrana bazale në epitelin alveolar është e holluar.

- C) Në ekskrete vërehen spiralet e Curshmann.
 - D) Në rastet tipike hasen kristalet e Charcot-Leiden.
 - E) Karakterizohet nga dispnea, kolla dhe sibilanca në auskultacion.
- PS)B

Pyetja 1260 V)2

Cili nga pohimet e mëposhtëm në lidhje me urinë e zgjatur nuk është i saktë?

- A) Neoglukogjeneza hepatike është veçanërisht aktive dhe e stimuluar nga glukokortikoidet.
 - B) Cikli i Krebsit është i ngadalësuar me pakësim sekondar të sintezës së trupave ketonike.
 - C) Truri adaptohet të përdorë edhe trupat ketonike.
 - D) Përqëndrimi i proteinave plazmatike pakësohet duke provokuar kështu mbajtjen e ujit në inde (edema e urisë).
 - E) Lipoliza është e përshpejtuar.
- PS)B

Pyetja 1261 V)3

Cili është ekzaminimi i zgjedhur për diagnozën e displazisë kongenitale të kofshës?

- A) Ekzaminimi radiografik
 - B) Artrografia
 - C) Rezonanca
 - D) Ekografia
 - E) CT skaner
- PS)D

Pyetja 1262 V)2

Cila nga rrethanat e mëposhtme shkakton hiperkaliemi?

- A) Acidoza
 - B) Hiperkalçemia
 - C) Alkalozë respiratore
 - D) Alkalozë metabolike
 - E) Të vjellat
- PS)A

Pyetja 1263 V)1

Trombocitemia esenciale dhe policitemia vera janë

- A) Sindromë mielo-displazike
- B) Sindromë mieloproliferative kronike
- C) Aplazi medulare

- D) Sëmundje sekondare ndaj inflamacionit kronik
 - E) Shpesh shoqërohen me imunodeficiencë.
- PS)B

Pyetja 1264 V)2

Cila nga alternativat e mëposhtme është një vaskulitis i vazave të vogla me interesim kutan

- A) Arteriti Takayasu
 - B) Poliangiiti mikroskopik
 - C) Sëmundja e Wegener
 - D) Vaskuliti krioglobulinemik
 - E) Dermatomioziti
- PS)D

Pyetja 1265 V)1

Arteria koronare interventrikulare anteriore e merr origjinën e saj

- A) Në vazat marginale obtuze.
 - B) Në vazat marginale akute.
 - C) Në vazat septale.
 - D) Në arterien e nyjes sinusale.
 - E) Në arterien e nyjes atrio-ventrikulare.
- PS)C

Pyetja 1266 V)1

Cila është shënja indirekte e një kalkuli urinar në ekografi?

- A) Formacione ekzogjene
 - B) Hija akustike
 - C) Dilatacion i rrugëve urinare në mënyrë retrograde
 - D) Radio-opaciteti
 - E) Radiotransparenca
- PS)C

Pyetja 1267 V)3

Alterimi karakteristik i ezofagut, në dekursin e sklerozës sistemike është

- A) Devijimi i saj në disa drejtime.
 - B) Evidentimi i divertikutit me traksion.
 - C) Identifikimi i divertikutit me pulsion.
 - D) Hipotonia dhe rigiditet të pareteve dhe dilatimi i tij.
 - E) Zbrazje e vonuar nga spazma kardiale.
- PS)D

Pyetja 1268 V)2

Të gjithë hormonet

- A) Janë steroide që ushtrojnë veprimin e tyre në distancë.
- B) Ndërveprojnë me receptorët e vendosur mbi membranën plazmatike.
- C) Përbëjnë të ashtuquajturit 'mesazheret dytësore' në brendësi të qelizës bersaglio.
- D) Mund të veprojnë në përqëndrime tepër të ulëta.
- E) Induktojnë proliferimin dhe diferencimin qelizor.

PS)D

Pyetja 1269 V)1

Për mashkullin adult, nevoja e përditshme në hekur është

- A) Më e madhe se sa për gratë.
- B) 1 mg.
- C) 10mg.
- D) E njëjtë me gratë.
- E) Në varësi të aktivitetit fizik.

PS)C

Pyetja 1270 V)1

Cilat qeliza janë target i medikamenteve imunosupresore?

- A) Granulocitet
- B) Trombocitet
- C) Limfocitet
- D) Endoteli
- E) Monocitet

PS)C

Pyetja 1271 V)1

Kotrimoksazoli është

- A) Bakteriostatik.
- B) Baktericid)
- C) Bakteriostatik në doza më të larta se 3g/ditë.
- D) Baktericid në doza më të ulëta se 2 g/ditë
- E) Bakteriostatik në doza të ulëta dhe baktericid në doza më të larta se 2g/ditë.

PS)B

Pyetja 1272 V)2

Cili marker tumoral përdoret tek tumoret e diferencuar të tiroides?

- A) CEA-ja
 - B) TPA-ja
 - C) Tireoglobulina.
 - D) Alfa-fetoproteina/
 - E) Ca 125
- PS)C

Pyetja 1273 V)2

Era e bajames së hidhur është karakteristike e intoksikacionit me

- A) Arsenik.
 - B) Cianur.
 - C) Botulizëm.
 - D) Amfetaminë.
 - E) Antidepresivët triciklikë.
- PS)B

Pyetja 1274 V)3

Fraktura crushing e trupit të vertebrës përbën një problem shumë të zakonshëm në osteoporozën e tipit I (post-menopauzale) sepse

- A) Kocka trabekulare absorbohet në mënyrë të preferuar në këtë situatë me turnover të lartë kockor.
 - B) Humbja e përmbajtjes hidrike e diskut rrit forcën e ngarkesës mbi trupat vertebrale.
 - C) Stresi shkaktohet nga rigiditeti relativ i artikulacioneve posteriore artrozike.
 - D) Kërkesat e rritura energjetike i kundërvihen reduktimit të qarkullimit të gjakut në trupat vertebralë
 - E) Trashësia e kockës kortikale që gjëndet në trupin e e vertebrës absorbohet në mënyrë të shpejtë nga reduktimi i estrogenëve
- PS)A

Pyetja 1275 V)2

Atrezia koanale është

- A) Pasojë e akteve kirurgjikale në fossa nazale.
 - B) Një malformacion i porcionit posterior të fossa nazale.
 - C) Një malformacion trakeal.
 - D) Një malformacion i rinofaringut.
 - E) Një patologji kronike e kordave vokale.
- PS)B

Pyetja 1276 V)1

Collum uteri është në raport

- A) Posteriorisht me vezikën.
- B) Posteriorisht me ureteret.
- C) Anteriorisht me kolon sigmoid.
- D) Lateralisht me ureteret.
- E) Lateralisht me tubat uterinë.

PS)D

Pyetja 1277 V)2

Pozitiviteti i cilit test kutan midis këtyre të përmendur evokon diagnozën e sarkoidozës?

- A) Tuberkulina
- B) Kveim
- C) Prick test
- D) Bentoniti
- E) Penicilina

PS)B

Pyetja 1278 V)2

Cili është indikacioni elektiv i trajtimit me diazepam intra-venoz?

- A) Delirium
- B) Absenca temporale
- C) Paraliza periodike
- D) Delirium i xhelozisë
- E) Status (etat de mal) epileptik

PS)E

Pyetja 1279 V)2

Endokarditi shfaqet më shpesh në dekursin e

- A) Infarkt të miokardit.
- B) Hipertensionit arterial.
- C) Valvulopatisë mitrale.
- D) Diabetes mellitus
- E) Cor pulmonare kronike.

PS)C

Pyetja 1280 V)2

Në një skedë vdekjeje, cila nga të dhënat e mëposhtme është më e rëndësishme për vlerësimin e ecurisë së vdekshmërisë sipas shkakut në një popullatë?

- A) Shkaku përfundimtar i vdekjes
- B) Shkaku i ndërmjetëm i vdekjes
- C) Shkaku fillestar i vdekjes.
- D) Vëndi i vdekjes.
- E) Moshë e pacientit.

PS)C

Pyetja 1281 V)1

Cili nga këta hormone prodhohet në zonën fashikulare të gjëndrës surenale?

- A) Aldosteron
- B) Kortizol
- C) Adrenalin
- D) Adrenosteron
- E) Progesteron

PS)B

Pyetja 1282 V)2

Në intoksikacionin nga monoksidi i karbonit, cila nga këto alteracione kutane është tipike?

- A) Cianoza labiale dhe ungule
- B) Lëkurë e zbehtë dhe djersitje
- C) Ikter
- D) Lëkura e kuqe-qershi
- E) Mavijosje kutane difuze

PS)D

Pyetja 1283 V)1

Çfarë mund të shkaktojë tek gjiri një cirrozë hepatike?

- A) Ekztazi të duktuseve
- B) Mastit akut
- C) Gjinekomasti
- D) Hiperpigmentim alveolar
- E) Fibroadenomë

PS)C

Pyetja 1284 V)2

'Virilizmi' mund të shoqërohet me gjëndjen e

- A) Miksedemës.
- B) Hipopituitarizmit.
- C) Hipertirozinemisë.
- D) Hiperplazisë.
- E) Hiperplazisë të korteksit surenal.

PS)E

Pyetja 1285 V)1

Policitemia nënkupton

- A) Shtim të numrit të eritrociteve në gjakun qarkullues.
- B) Shtim të numrit të trombociteve në gjak.
- C) Prani të shumë formacioneve cistike në një organ visceral.
- D) Shtim të të gjithë komponentëve korpuskulare të gjakut në një organ
- E) Shtim të dimensioneve të komponentëve korpuskularë të gjakut.

PS)A

Pyetja 1286 V)1

Fosfokreatina përdoret në muskul

- A) Si rezervë energjie për fosforilimin e glukozës.
- B) Si rezervë energjie për fosforilimin e ADP-së.
- C) Si depozitë fosfati inorganik.
- D) Për transferimin në veshka të fosfatit të tepërt.
- E) Për rregullimin e kontraktimit.

PS)B

Pyetja 1287 V)1

Me cilën nga këto teknika radiologjike nuk është e mundur të vizualizohet ureteri?

- A) Urografia
- B) Tomografia e kompiuterizuar
- C) Urografia me rezonancë magnetike
- D) Radiografia direkte e abdomenit
- E) Pielografia transnefrostopomike descendente

PS)D

Pyetja 1288 V)1

Cila simptomë nuk karakterizon depresionin?

- A) Ngadalësimi i proceseve ideore
- B) Përmbajtje ideore të trishtuara, të dhëmbëshme dhe vetë-akuzimit
- C) Ndjenja trishtimi

- D) Ngadalësimi i lidhjeve asociative
 - E) Ngadalësimi psikomotor
- PS)D

Pyetja 1289 V)2

Në terapinë e KID akute hemorragjike, trajtimi i zgjedhjes së parë është

- A) Trombina intra-venoze
 - B) Col fibrine
 - C) Koncentrate eritrocitare
 - D) Plazmë e freskët e ngrirë
 - E) Heparina
- PS)D

Pyetja 1290 V)1

Anemia megaloblastike mund të shkaktohet nga të gjitha arësyet e mëposhtme, përveç

- A) Mungesës së vitaminës B12.
 - B) Mungesës së faktorit intrinsek të Castle
 - C) Mungesës së transferinës
 - D) Infestimi nga botriocefalus
 - E) Sprue tropikale
- PS)C

Pyetja 1291 V)3

Një nënpunës 43 vjeçar, njihet prej kohësh si HbsAg pozitiv, por me transaminaza normale. Në javët e fundit, ankon për dobësi, ethe, mialgji/artralgi. Ekzaminimet laboratorike evidentojnë një rritje të dukëshme të transaminazave. Laboratori ju informon

- A) Riaktivizim të hepatitit B.
 - B) Faza e serokonversionit HbeAg/antiHBe.
 - C) Co-infeksion HCV.
 - D) Mbi-infeksion HDV.
 - E) Co-infeksion HDV.
- PS)A

Pyetja 1292 V)2

Diagnoza diferenciale midis adenomës folikulare dhe karcinomës folikulare të tiroides bazohet në cilin parametër?

- A) Atipia citologjike
- B) Prania e qelizave gjigande
- C) Prania e papilave
- D) Sasia e koloidit në folikuj

E) Infiltrimi kapsular e vaskular

PS)E

Pyetja 1293 V)2

Tek një pacient me ascit që është formuar si pasojë e një hipertensioni portal do të vërehet

A) Rritje të amilazës në ascit.

B) Diferenca midis albuminës serike dhe asaj ascitike $>11\text{g/l}$.

C) Kolesterolin në likuidin ascitik është më i madh se kolesterolin serik.

D) Prani të qelizave atipike në ascit.

E) Prani të eritrociteve në ascit $>100.000\text{mm}^3$.

PS)B

Pyetja 1294 V)1

Cili është trajtimi më i dobishëm në zhbllokimin e rrugëve ajrore tek një pacient i prekur nga fibroza cistike?

A) Drenazhi postural

B) Antibiotikët

C) Bronkodilatatorët

D) Antikolinergjikët

E) Kortikosteroidet

PS)A

Pyetja 1295 V)2

Një refluks pozitiv hepato-jugular, i provokuar duke shtypur kuadrantin abdominal superior të djathtë tregon

A) Insuficiencë kongjестive.

B) Obstruksion në vena cava superior.

C) Obstruksion i vena cava inferior.

D) Obstruksion i vena porta.

E) Variant i normës.

PS)A

Pyetja 1296 V)2

Bleomicina është aktive para së gjithash

A) Në karcinomën skuamocelulare.

B) Në hepatitin viral.

C) Në lupus eritematoz të diseminuar.

D) Në tifon ekzantematike.

E) Në sklerozën multiple.

PS)A

Pyetja 1297 V)1

Cila nga anemitë hemolitike i detyrohet një defekti kongenital të një enzime eritrocitare (G6PDH) ?

- A) Favizmi
- B) Sferocitoza
- C) Eliptocitoza
- D) Stomatocitoza
- E) Hemoglobinuria paroksistike

PS)A

Pyetja 1298 V)1

Një konstipacion është simptom jo i rrallë i

- A) Hipogonadizmit.
- B) Timomës.
- C) Hipoparatiroidizmit.
- D) Hiperparatiroidizmit.
- E) Feokromacitomës.

PS)D

Pyetja 1299 V)2

"Calvaria si furçë" vërehet në dekursin e

- A) Plasmocitomës.
- B) Metastazave kockore të karcinomës.
- C) Anemisë falciforme.
- D) Morbus Cooley.
- E) Anemisë diseritropoietike.

PS)D

Pyetja 1300 V)1

Në plazmë, hekuri transportohet nga cila proteinë?

- A) Transferina
- B) Hemoglobina
- C) Ceruloplazmina
- D) Albumina
- E) Haptoglobina

PS)A

Pyetja 1301 V)2

Arteriopatia obliterante karotidiene studiohet në radhë të parë me

- A) Angiografi.
- B) Radiografi direkte e indeve të buta.
- C) Angio-RM.
- D) Angio-CT skaner.
- E) Echo-Doppler me ngjyra.

PS)E

Pyetja 1302 V)1

Si quhet një ngritje solide dhe e shpejtë e lëkurës?

- A) Bula
- B) Njolla
- C) Urtikarie
- D) Nodul
- E) Papula

PS)C

Pyetja 1303 V)2

Në prani të cilit prej neoformacioneve mediastinale të mëposhtme mund të bashkëshoqërohet një simptomatologji miastenike?

- A) Limfoma
- B) Timoma
- C) Karcinoidi
- D) Sëmundja e Castleman
- E) Strumë zhytëse

PS)B

Pyetja 1304 V)1

Në edemën pulmonare akute, kuadri klinik karakterizohet nga të gjitha simptomat e mëposhtme përveç

- A) Sibilancës.
- B) Dispnesë grave.
- C) Ralet krepitante.
- D) Ekspektorant shkumoz me strie gjaku.
- E) Ndjenjës së vdekjes imediate.

PS)A

Pyetja 1305 V)1

Cilat janë karakteristikat klinike më të zakonshme në akromegali?

- A) Visceromegalia, ulje e volumit të ekstremiteteve akrale, obezitet tronkularë
- B) Visceromegalia, rritje volumetrike e ekstremiteteve akrale, fascies leonina
- C) Poliuria e polidipsia
- D) Gjinekomastia
- E) Struma difuze

PS)B

Pyetja 1306 V)1

Me oliguri të adultit nënkuptojmë

- A) Një diurezë 24-orëshe < 1000 ml.
- B) Një diurezë 24-orëshe < 800 ml.
- C) Një diurezë 24-orëshe < 500 ml.
- D) Një diurezë 24-orëshe < 300 ml.
- E) Një diurezë 24-orëshe < 100 ml.

PS)C

Pyetja 1307 V)1

Në cilën zonë të prostatës e merr më shpesh origjinën karcinoma e prostatës?

- A) Zona subkapsulare periferike
- B) Zona intermediale
- C) Zona tranzicionale
- D) Zona periuretrale
- E) Verumontanum

PS)A

Pyetja 1308 V)1

Në dhënien e certifikates mjekësore duhet vlerësuar e vërtetuar

- A) Sugjerimi i pacientit.
- B) Elementët që i sjellin përfitim pacientit.
- C) Të dhënat klinike të konstatuara.
- D) Të dhënat klinike që nuk përbëjnë rrezik për mjekun.
- E) Të dhënat klinike që nuk përbëjnë rrezik për pacientin.

PS)C

Pyetja 1309 V)1

Me flegmonë nënkuptojmë

- A) Një inflamacion supurativ të disa apareteve pilo-sebace.
- B) Një inflamacion akut purulent të gishtave.
- C) Një inflamacion eksudativ purulent difuz në indet konektiv.
- D) Një mbledhje pusi në një kavitet të neoformuar.
- E) Një inflamacion akut supurativ të gjëndrave sudoripare.

PS)C

Pyetja 1310 V)2

Shkaku më i shpeshtë i vdekjes tek gratë që manifestojnë eklampsi është

- A) Ruptura e mëlçisë.
- B) Insuficenca renale akute.
- C) Hemorragjia cerebrale.
- D) Embolia pulmonare.
- E) Shoku septik.

PS)C

Pyetja 1311 V)2

Në diagnozën e apendisitit akut më e rëndësishmja është

- A) Ekografia abdominale.
- B) Skaneri
- C) Radiografia e traktit tretës.
- D) Klizma opake.
- E) Anamneza e ekzaminimit objektiv.

PS)E

Pyetja 1312 V)2

Cila prej sëmundjeve nuk paraqet 'vitiligo' si manifestim?

- A) Tiroiditi
- B) Morbus Addison
- C) Anemia pernicioze
- D) Diabeti mellitus
- E) Diabeti brun (hemokromatoza)

PS)E

Pyetja 1313 V)3

Nga bashkimi i nervit petroz superficial major me nervin petroz të thellë merr origjinë nervi

- A) Staped.
- B) Aurikulari posterior.
- C) Facial.

- D) Vidian.
 - E) Petroz superficial minor.
- PS)D

Pyetja 1314 V)2

Cili nga preparatet e mëposhtëm mund të konsiderohet si zgjedhje e parë në terapinë ambulatorë të një pacienti me insuficiencë kardiale?

- A) Dobutamina
 - B) Amrinoni
 - C) Enalapriili
 - D) Digitozina
 - E) Nitroprusidi i natriumit
- PS)C

Pyetja 1315 V)2

Antibioterapia në bronkopneumopatinë kronike obstruktive vendoset

- A) Gjithmonë.
 - B) Asnjëherë.
 - C) Në riakutizim të simptomave respiratore të shoqëruara me volum të shtuar e purulent të espektoratit.
 - D) Gjithmonë, tek subjekte me moshë më të madhe se 35 vjeç.
 - E) Gjithmonë, tek subjekte me moshë më të vogël se 50 vjeç.
- PS)C

Pyetja 1316 V)2

Në ekzaminimin hemokromocitometrik, parametri RDW (Red Cell Distribution Width)

- A) Është një matës i volumit eritrocitar total dhe shërben për diagnozën e çrregullimeve të sintezës së hemoglobinës.
 - B) Është një matës i shpërndarjes së volumit të eritrociteve dhe shërben për diagnozën diferenciale të anemive.
 - C) Është një matës i volumit eritrocitar total dhe shërben për diagnozën diferenciale të anemive.
 - D) Tregon përqindjen e blasteve mieloid në qarkullim.
 - E) Është një matës i përmbajtjes mesatare të hemoglobinës së eritrociteve.
- PS)B

Pyetja 1317 V)1

Cili ngjyrim përdoret zakonisht për identifikimin e shpejtë të Mycobacterium tuberculosis?

- A) Gram-i

- B) Hematoksilina
 - C) Gimsa
 - D) Ziehl-nielsen
 - E) Papanicolau
- PS)D

Pyetja 1318 V)2

Cili nerv mund të kompromentohet në një rast me mizerim të dorës që përfshin sipërfaqen palmare të gishtit të 1-rë, 2-të, e 3-të i shoqëruar me një dobësi të muskujve të eminencia tenar?

- A) Musculo-cutan
 - B) Ulnaris
 - C) Radialis
 - D) Median
 - E) Coraco-brachialis
- PS)D

Pyetja 1319 V)1

Hematokriti është raporti midis

- A) Albuminës e rruazave.
 - B) Rruazave të bardha e të kuqe.
 - C) Trombociteve e rruazave të kuqe.
 - D) Plazmës e rruazave të bardha.
 - E) Plazmës e rruazave të kuqe.
- PS)E

Pyetja 1320 V)1

Cili nga faktorët e mëposhtëm favorizon më tepër drejt infeksioneve fungine invazive?

- A) Deficiti i komplementit
 - B) Neutropenia e zgjatur
 - C) Lezionet kutane
 - D) Hipogamaglobulinemia
 - E) Limfopenia
- PS)B

Pyetja 1321 V)1

Shintigrafia pulmonare e perfuzionit

- A) Është e nevojshme për diagnozën, por jo për stadifikimin prognostik të embolisë pulmonare.

- B) Nuk mund të japë vlera kuantitative të mungesës së perfuzionit në emboline pulmonare.
 - C) Është i nevojshëm për diagnozën dhe për kuantifikimin e difektit të perfuzionit në embolinë pulmonare
 - D) Nuk kryhet kurrë përballë një dyshimi për emboli pulmonare.
 - E) Është i panevojshëm në dyshimin e një embolie pulmonare.
- PS)C

Pyetja 1322 V)2

Në patologjinë herniare, së bashku me dhëmbjen, cila është shënja më e rëndësishme dhe më e shpejtë për të vendosur një diagnozë të strangulacionit herniar dhe hospitalizimin konsequent?

- A) Të vjellat
 - B) Mbyllja e alvit për feçe e gazra
 - C) Pamundësi për modifikim të tumefaksionit herniar
 - D) Temperatura
 - E) Hematemeza
- PS)C

Pyetja 1323 V)2

Plagët e abdomenit quhen pernetruese nëse

- A) Shoqërohen me lezione të organeve abdominale.
 - B) Nuk arrijnë limitin peritoneal.
 - C) Nëse provokohen nga armë me majë të mprehtë.
 - D) Shoqërohen me hemorragji abundante.
 - E) Vendosin në komunikim kavitetin peritoneal me ambientin e jashtëm.
- PS)E

Pyetja 1324 V)1

Cila është koha ideale për të riperfuzionuar arterien koronare pas një infarkti miokardi akut?

- A) 0-3 orë nga dhëmbja
 - B) 4-6 orë nga dhëmbja
 - C) 6-8 orë nga dhëmbja
 - D) 8-12 orë nga dhëmbja
 - E) >12 orë nga dhëmbja
- PS)A

Pyetja 1325 V)2

Cila nga ekzaminimet laboratorike nevojitet për të vlerësuar aktivitetin inflamator në hepatitin kronik?

- A) Dozimi i imunoglobulinave serike
- B) Dozimi i albuminemisë
- C) Dozimi i bilirubinemisë
- D) Dozimi i fosfatazemisë alkaline.
- E) Gama-GT

PS)A

Pyetja 1326 V)2

Në fazën e refraktaritetit absolut, zemra është

- A) E eksituar.
- B) Pjesërisht e ekzitueshme.
- C) E paekzitueshme.
- D) Në fazë diastolike.
- E) Në fazë sistolike.

PS)C

Pyetja 1327 V)2

Cili nga rezultatet e mëposhtëm tregon një anemi me rigjenerim të dobët?

- A) Volumi korpuskolar mesatar (MCV) normal.
- B) Shpërndarje e shtuar e rruazave të kuqe (RDW).
- C) Numër i ulët i retikulociteve.
- D) Nivelet e ulura të hemoglobinës.
- E) Sideremi e rritur.

PS)C

Pyetja 1328 V)2

Nodujt që hasen në evolucionin e artrozave quhen

- A) Nodujt e Heberdenit.
- B) Nodujt e Oslerit.
- C) Nodujt e Schmorlit.
- D) Noduj subkutanë.
- E) Noduj reumatoidë.

PS)A

Pyetja 1329 V)2

Cila nga pohimet e mëposhtëm në lidhje me kloramfenikolin është i saktë

- A) Ka efekt baktericid.
- B) Efekti i tij potencohet nga penicilina.

- C) Në doza të larta mund të bllokojë sintezën e proteinave edhe në qelizat e palcës kockore në mamiferë.
D) Inaktivizohet nga beta-laktamazat e baktereve.
E) Efekti i tij është kryesisht në bakteret Gram-pozitive.
PS)C

Pyetja 1330 V)1

Diagnoza e hiperparatiroidizmit primitiv bazohet në gjetjen e

- A) PTH i paprekur (PTHi) i lartë, Kalcemia e ulur, Fosforemia e ngritur.
B) Kalcemia e rritur, Fosforemia e rritur, PTHi e padozueshme.
C) PTHi e rritur, Kalcemia e rritur.
D) Kalçemia e rritur, fosfataza alkaline e rritur.
E) Kalçemia e rritur me hiperakumulim në shintigrafi kockore
PS)C

Pyetja 1331 V)1

Cila nga simptomat nuk gjëndet në intoksikimin akut nga morfina?

- A) Bradipnea
B) Pupilat majë gjilpërë
C) Oliguria
D) Hiperpireksia
E) Flashkësi muskulare
PS)D

Pyetja 1332 V)2

Çfarë e karakterizon sindromën karcinoide?

- A) Konstipacioni
B) Bradikardia
C) Flushing
D) Hematemesa
E) Poliuria
PS)C

Pyetja 1333 V)1

Cila patologji favorizohet nga mutacioni inaktivizues i gjenit BRCA1?

- A) Bronkiti kronik
B) Neoplazia e gjirit
C) Neoplazitë hepatike
D) Aplazia medulare

E) Emfizema
PS)B

Pyetja 1334 V)3

Një grua e re, operuar (heqje) për një strumë voluminoze, shfaq tri javë më pas kriza tetanike në fytyrë. Cili nga këta komplikime mund të ketë ndodhur?

A) Dëmtimi i nervit rikurrent
B) Hipoparatiroidizmi iatrogjen
C) Nevralgjia faciale
D) Hipotiroidizmi
E) Kondromalacia trakeale
PS)B

Pyetja 1335 V)2

Lëkura e fytyrës (shpesh edhe e anësive, abdomenit etj.) me aspekt druri haset në patologjinë e

A) Poliartritit kronik primar.
B) Dermatomiozitit.
C) Sklerodermisë.
D) Diskoidit fiks.
E) Lupusit eritematoz sistemik.
PS)C

Pyetja 1336 V)1

Në cilën prej situatave të mëposhtme mund të haset hiperkolesterolemia?

A) Hipotiroidizmi
B) Morbus Addison
C) Hepatiti kronik pa kolestazë
D) Koliti ulceroz
E) Morbus Crohn
PS)A

Pyetja 1337 V)2

Cili nga pohimet në lidhje me limfomën Burkitt është i gabuar?

A) Përhapje endemike në Afrikë.
B) Prek kryesisht fëmijët.
C) Është një limfomë me limfocite T.
D) Fillimi është i lidhur me lokalizimin ektranodal.
E) Ka karakteristike praninë e translokacionit t(8:14)

PS)C

Pyetja 1338 V)1

Tumori beninj më i shpeshtë i gjirit është

- A) Fibroadenoma.
- B) Lipoma.
- C) Hemangioma.
- D) Papilloma subareolare.
- E) Histiocitoma fibroze.

PS)A

Pyetja 1339 V)2

Intoksikimi nga kripërat e litiumit përmirësohet nga

- A) Urea, kloruri i natriumit, acetazolamide, hemodializa.
- B) Neuroleptikët.
- C) Ansiolitikët.
- D) Ujë me doza abundante.
- E) Hepatoprotektore.

PS)A

Pyetja 1340 V)2

Pacienti me rektorragji diskrete post alvi dhe tenezëm rektale. Cili është ekzaminimi i linjës së parë?

- A) Eksplorim rektal dixhital dhe ano-rektoskopi
- B) Pankolonoskopia
- C) Klizëm opake me dopio kontrast
- D) Ekzaminim kimik e parazitologjik i feçeve
- E) Analizë për gjak okult në feçe

PS)A

Pyetja 1341 V)1

Cila nga simptomat/shënjat e mëposhtme nuk bën pjesë në kuadrin e hiperkortizolemisë?

- A) Obeziteti centripet
- B) Facies lunaris
- C) Hipotrofia muskulare
- D) Reduktim i tolerancës glucidike/diabeti mellitus
- E) Hipotensioni arterioz

PS)E

Pyetja 1342 V)1

Si mund të vlerësohet temperatura?

- A) Zakonisht është e rrezikshme.
- B) Është gjithmonë e rrezikshme.
- C) Është gjithmonë e parrezikshme
- D) Duhet luftuar gjithmonë me antipiretikë.
- E) Është një komponent i rëndësishëm i mekanizmit mbrojtës të organizmit.

PS)E

Pyetja 1343 V)2

Ateroskleroza e arterieve të vogla ndodh zakonisht tek

- A) Hipertensivët.
- B) Dislipidemikët.
- C) Diabetikët dhe duhan-pirësit.
- D) Obezët.
- E) Sedentarët.

PS)C

Pyetja 1344 V)1

Nuk mund të jetë shkak i cirrozës hepatike

- A) Infeksioni nga virusi A.
- B) Infeksioni nga virusi C.
- C) Inflamacioni kronik i rrugëve biliare.
- D) Hemokromatoza.

PS)A

Pyetja 1345 V)1

Cila lëvizje e pavullnetëshme është karakteristike në sëmundjen e Parkinsonit?

- A) Ateoza
- B) Klonitë
- C) Krizat okulocefalogjire
- D) Distonitë
- E) Tremor

PS)E

Pyetja 1346 V)2

Shfaqja e hirsutizmit tek një femër 20 vjeçe shkaktohet nga

- A) Hiperplazia kongenitale e deficitit të 21-hidroksilazës me shfaqje të vonshme.
- B) Neoplazia e mbiveshkores.
- C) Marrja e pilulës estroprogesteronike.
- D) Policistoza ovarike.
- E) Marrja e androgenëve.

PS)D

Pyetja 1347 V)2

Infeksioni i gjëndrave sudoripare apokrine quhet

- A) Periporite infantil.
- B) Hidrosadenitë.
- C) Eritasma.
- D) Sikoza.
- E) Furunkul.

PS)B

Pyetja 1348 V)1

Glukoza e filtruar nga glomeruli ri-absorbohet në

- A) Segmentin e trashë të ansës së Henles.
- B) Tubulin kontort proksimal.
- C) Degën deshendente të ansës së Henles.
- D) Degës ashendente të ansës së Henles.
- E) Tubulin kontort distal.

PS)B

Pyetja 1349 V)2

Për vlerësimin e kapacitetit të përqëndrimit renal, përcaktimi bëhet nëpërmjet

- A) Peshës specifike urinare.
- B) Proteinurisë.
- C) Ozmolaritetit urinar.
- D) Elektrolitëve në gjak
- E) PH urinar.

PS)C

Pyetja 1350 V)1

Një imunodeficiencë primitive manifestohet zakonisht me

- A) Infeksione të rënda virale si varicela-zoster e herpes simplex.
- B) Infeksione respiratore të shpeshta e të rënda.
- C) Kandidoza muko-kutane.

- D) Anergjia kutane.
 - E) Infeksione fulminante nga Epstein-Barr.
- PS)C

Pyetja 1351 V)3

Hemoglobina rregullohet nga efektorë allosterikë, nga të cilët 2, 3-difosfoglicerati. Cili është efekti fiziologjik i këtij të fundit në funksionin e hemoglobinës?

- A) Favorizim i lëshimit të oksigjenit në nivel të indeve periferike.
- B) Ndalim i formimit të bikarbonatit në nivel periferik.
- C) Ndalim i formimit të methemoglobinës.
- D) Të bëjë hemoglobinën fetale më pak të disponueshme për oksigjenin.
- E) Të reduktojë degradimin e hemoglobinës.

PS)A

Pyetja 1352 V)1

Gjatë periudhës embrionale, hemopoeza observohet fillimisht në

- A) Në mëlçi.
- B) Në shpnetkë.
- C) Në palcën kockore.
- D) Në sakusin vitelin.
- E) Në bursën e Fabricios.

PS)D

Pyetja 1353 V)1

Artikulationi i cili ka luksacion më të shpeshtë është

- A) Kofsha.
- B) Gjuri.
- C) Kavalja.
- D) Shpatulla.
- E) Radiokarpal.

PS)D

Pyetja 1354 V)1

Cili nga variantet e mëposhtëme është vendimi më i mirë për terapinë afatgjatë në anginën e Prinzmetalit?

- A) Kaptopril
- B) Aspirina
- C) Propranololi
- D) Nifedipina

E) Angioplastika koronare perkutane transluminale (PTCA)
PS)D

Pyetja 1355 V)1

Në obezitetet indeksi i masës trupore (BMI) është

- A) >30.
- B) >10.
- C) >20.
- D) >25.
- E) >40.

PS)A

Pyetja 1356 V)1

Në ekzaminimin e fundus oculi shihet stazë papilare në rastin e

- A) Cefalesë nga neuralgjia e nervave kranialë.
- B) Hemikranisë ofalmoplegjike.
- C) Cefalesë nga intoksikimi alkoolik.
- D) Cefalesë nga artriti temporal.
- E) Cefalesë nga hipertensioni intrakranial.

PS)E

Pyetja 1357 V)1

Cila nga sëmundjet e mëposhtme konsiderohet një zoonozë?

- A) Askaridioza
- B) Ankilostomiaza
- C) Amebiaza
- D) Toksoplasmoza
- E) Enterobiaza

PS)D

Pyetja 1358 V)2

Krepitancat pulmonare indux e redux shihen në evolucionin e

- A) Pneumonisë lobare.
- B) Bronkitit azmatik.
- C) Fibrozës pulmonare.
- D) Pleuritit eksudativ.
- E) Pleuritit të thatë.

PS)A

Pyetja 1359 V)2

Insuficienca kardiake kongjестive shoqërohet me aktivizimin e shumë sistemeve neuro-hormonale dhe në të njëjtën kohë nuk ka hiperaktivizim të

- A) Vazopresinës.
- B) Bradikininës.
- C) Hormonit natriuretik.
- D) TSH-së.
- E) Sistemit renin-angiotensin.

PS)B

Pyetja 1360 V)2

Në radiografi, gjetja e "kranium me vrima çifte" është tipik për

- A) Mikrociteminë.
- B) Osteoporozën.
- C) Makroglobulineminë e Waldestrom.
- D) Plasmocitomën.
- E) Metastazën kockore nga mikrocitoma.

PS)D

Pyetja 1361 V)1

Kistët renale janë

- A) Radiotransparente.
- B) Jo ekogjene në ekografi.
- C) Hipodense në CT.
- D) Hiperintense në sekuencën T1 të MRI-së.
- E) Hiperintense në shintigrafi.

PS)B

Pyetja 1362 V)2

Aspirimi citologjik i një noduli tiroidien është i besueshëm në diagnozën e neoplazisë malinje, përveç rastit të karcinomës

- A) Papillifere.
- B) Folikulare.
- C) Medullare.
- D) Me qelizat e Hurtle.
- E) Anaplazike.

PS)B

Pyetja 1363 V)1

Potenciali i veprimit në fibrën nervore

- A) Gjenerohet me hapjen e një kanali selektivisht permeabël ndaj anioneve.
- B) Shkakton një ulje të ndjeshme të konduktancës elektrike të membranës.
- C) Ka shpejtësi konstante pavarësisht kalibrit aksonal.
- D) Gjenerohet vetëm kur potenciali i membranës ulet dhe arrin një vlerë të caktuar.
- E) Zgjat mesatarisht 5-8 msek.

PS)D

Pyetja 1364 V)1

Tek femrat, incidenca më e lartë e metastazave kockore ndodh në karcinomën e

- A) Gjirit.
- B) Endometritit.
- C) Vezores.
- D) Qafës së mitrës.
- E) E kolonit.

PS)A

Pyetja 1365 V)2

Cili nga grupet e gjeneve të histokompatibilitetit përmban allele të lidhur ngushtë me predispozicionin ose refraktaritetin e diabetit mellitus tipi I?

- A) HLA-A
- B) HLA-B
- C) HLA-DP
- D) HLA-DN
- E) HLA-DR

PS)E

Pyetja 1366 V)1

Flitet për hipovolemi relative kur ka

- A) Ulje të fraksionit të ejeksonit.
- B) Shtim të kthimit venoz.
- C) Kapacitet vazal të shtuar në kushte mase normale
- D) Reduktim i kapacitetit vazal me masë qarkulluese normale
- E) Prani eksudatesh intra kaviteteve të sekuestruar

PS)C

Pyetja 1367 V)2

Muskujt kriko-aritenoid lateralë e inter-aritenoide shkaktojnë

- A) Aduksionin e kordave vokale.
- B) Abduksionin e kordave vokale.
- C) Rritjen e tensionit të kordave vokale.
- D) Ngritjen e larinksit.
- E) Uljen e larinksit.

PS)A

Pyetja 1368 V)1

Cila është rruga kryesore e eliminimit nga organizmi i kontrasteve të iodizuar?

- A) Hepatike
- B) Renale
- C) Kutane
- D) Rektale
- E) Salivare

PS)B

Pyetja 1369 V)1

Cilin veprim respirator kryejnë muskujt abdominalë?

- A) Aksion inspirator
- B) Asnjë veprim
- C) Rritjen e presionit intrapleural
- D) Aksion ekspirator
- E) A dhe C janë të sakta

PS)D

Pyetja 1370 V)2

Simptomat e mëposhtme janë efekte kolaterale të zakonshme në përdorimin e benzodiazepinave, përveç

- A) Cefalesë.
- B) Inkoordinimit motor.
- C) Vertigos.
- D) Amnezia anterograde
- E) Konstipacionit.

PS)E

Pyetja 1371 V)3

Tek qelizat eukariote, pjesa më e madhe e enzimave të ciklit të Krebsit janë të lokalizuara në

- A) Citozol.

- B) Aparatin e Golxhit.
 - C) Ribozomë.
 - D) Matriksin mitokondrial.
 - E) Membranën e jashtme mitokondriale.
- PS)D

Pyetja 1372 V)1

Shkaku më i shpeshtë i dështimit të kontraceptivëve oralë, që ka si rezultat një shtatëzani të padëshiruar është

- A) Ovulim në mes të ciklit.
 - B) Frekuenca e raporteve seksuale.
 - C) Përdorimi jo i saktë i kontraceptiveve oralë.
 - D) Malabsorbiment gastrointestinal.
 - E) Prodhim i antitropave.
- PS)C

Pyetja 1373 V)2

Cili fenotip HLA ndeshet më shpesh në sindromën e Reiter?

- A) B16
 - B) B17
 - C) B5
 - D) B27
 - E) B13
- PS)D

Pyetja 1374 V)1

Në cilën ditë, hormoni LH arrin nivelin më të lartë tek një grua që ka një cikël menstrual 30 ditësh?

- A) Ditën e 12-të
 - B) Ditën e 14-të
 - C) Ditën e 16-të
 - D) Ditën e 18-të
 - E) Ditën e 27-të
- PS)C

Pyetja 1375 V)2

Tek pacientët e prekur nga karcinoma rektale

- A) Hemorragjia rektale është e shpeshtë.
- B) Radioterapia adjuvante e kimioterapia nuk përmirësojnë jetëgjatësinë.

- C) Vëndi më i shpeshtë i metastazave është truri.
 - D) Recidiva lokale nuk përbën problem.
 - E) Është e pranishme splenomegalia.
- PS)A

Pyetja 1376 V)3

Cila nga sëmundjet dermatologjike shoqërohet më shpesh me celiakinë?

- A) Dermatiti herpetiform
 - B) Psoriaza
 - C) Pemfigoidi
 - D) Pemfigo
 - E) Urtikaria
- PS)A

Pyetja 1377 V)2

Neuralgjia trigeminale esenciale karakterizohet nga

- A) Kriza të dhëmbëshme akute unilaterale.
 - B) Kriza të dhëmbëshme akute bilaterale.
 - C) Kriza të dhëmbëshme kronike bilaterale.
 - D) Kriza parestezike bilaterale.
 - E) Kriza të dhëmbëshme djegëse bilaterale.
- PS)A

Pyetja 1378 V)2

Një nga komplikimet më të shpeshta të sëmundjes divertikulare të kolonit është

- A) Hemorragjia.
 - B) Okluzioni intestinal.
 - C) Fistula enterokutane.
 - D) Fistula anale.
 - E) Koliti ishemik.
- PS)A

Pyetja 1379 V)2

Në astmën bronkiale, nga çfarë varet ulja e fluksit ekspirator maksimal?

- A) Rritje e kompliancës
- B) Rritje e konduktancës
- C) Ulje e rrezistencës
- D) Rritje e rrezistencës
- E) A-ja e D-ja janë të sakta.

PS)D

Pyetja 1380 V)1

Hemoglobina

- A) Është mesatarisht më e lartë tek meshkujt se tek femrat.
- B) Rritet në rast makrocitoze.
- C) Bën pjesë tek proteinat e fazës akute.
- D) Ka vlera normale 12-17 mg/dl.
- E) Është në gjëndje të transportojë 10 molekula oksigjen për molekulë.

PS)A

Pyetja 1381 V)2

Endokarditi infektiv tek subjektet toksikodependente shkaktohet më shpesh nga

- A) Streptokoku fekal.
- B) Stafilokoku aureus.
- C) Kandida albicans.
- D) Serratia marcescens.
- E) Streptokoku viridans.

PS)B

Pyetja 1382 V)2

Në rastin e diagnozës prenatale të renit multikistik, cila nga manovrat e mëposhtme është e saktë?

- A) Kontroll ekografik të shtatzanisë e sectio cesareo në term fiziologjik.
- B) Kontroll ekografik të shtatzanisë e sectio cesareo përpara termit fiziologjik (sapo të ketë arritur maturitetin pulmonar)
- C) Kontroll ekografik të shtatzanisë e lindje normale në term.
- D) Kontroll ekografik të shtatzanisë e seksio cesareo në muajin e shtatë.
- E) Kontroll ekografik të shtatzanisë dhe induktim të lindjes normale sapo të arrihet.

Maturiteti pulmonar

PS)C

Pyetja 1383 V)1

Probabiliteti që një fëmijë i një pacienti me "hemofili grave" të ketë hemofili është

- A) 0%.
- B) 25%.
- C) 50%.
- D) 75%.
- E) 100%.

PS)A

Pyetja 1384 V)2

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është e pranishme në embolinë pulmonare masive?

- A) Dispnea severe e cinozë
- B) Dhëmbje e tipit anginoz
- C) Deficit i furnizimit cerebral
- D) Edemë në formë manteli
- E) Turgor i venave jugulare

PS)D

Pyetja 1385 V)1

Diabeti në distancë dëmton sistemin nervor, duke shkaktuar kryesisht

- A) Kriza epileptike.
- B) Rritje të frekuencës së tumoreve.
- C) Degjenerim të qelizave të kornu anterior.
- D) Neuropati periferike.
- E) Prekje të sensibilitetit të thellë.

PS)D

Pyetja 1386 V)2

Në rast perforimi të uterusit gjatë një ekzaminimi të kavitetit uterin duhet

- A) Ndërprerë interventi.
- B) Të fillohet një trajtim me antibiotikë.
- C) Të kryhet një laparotomi eksplorative.
- D) Suturimi i dëmtimit.
- E) A+B

PS)E

Pyetja 1387 V)2

Temperaturë intermitente e tipit ondulant shihet shpesh në sëmundjen e

- A) Pertusit.
- B) Tifos abdominale
- C) Difterisë
- D) Brucelozës.
- E) Sepsit puerperal.

PS)D

Pyetja 1388 V)3

Trajtimi më i mirë i metastazave hepatike solitare të karcinomës së kolonit është

- A) Radioterapia.
- B) Kimioterapia.
- C) Kimioterapia nëpërmjet arteries hepatike.
- D) Krioterapia.
- E) Rezekcioni kirurgjikal.

PS)E

Pyetja 1389 V)2

Prekursori i Prostaglandinave është

- A) Acidi arakidonik.
- B) Acidi linoleik.
- C) Acidi palmitik.
- D) Acidi stearik.
- E) Acidi laktik.

PS)A

Pyetja 1390 V)1

Cili është hormoni tiroidien fiziologjikisht më aktiv?

- A) Tireoglobulina
- B) Monoiodotirozina
- C) Diiodotirozina
- D) Triiodotirozina
- E) Tiroxina

PS)D

Pyetja 1391 V)1

Koka dhe pjesa mediale e colli femuri janë të vaskularizuara nga

- A) Arteria femorale komune.
- B) Arteria circumflekse.
- C) Arteria pudente.
- D) Arteria obturatore.
- E) Arteria gluteale.

PS)B

Pyetja 1392 V)2

Cili nga pohimet e mëposhtëm është i saktë kur bëhet fjalë për një pacient me hiperkalçemi nga sarkoidoza?

- A) Radiografia torakale është gjithmonë normale.
- B) Përthithja intestinale e Ca është e rritur.
- C) Eliminimi urinar i Ca është normal.
- D) Niveli i PTH serik është i rritur.
- E) Është shpesh e pranishme hipogamaglobulinemia.

PS)B

Pyetja 1393 V)1

Cila nga vlerat e presionit arterial konsiderohet si limiti superior normal në një subjekt 40 vjeç?

- A) 150/90
- B) 130/70
- C) 140/90
- D) 160/100
- E) 150/100

PS)C

Pyetja 1394 V)2

Një efekt kolateral veçanërisht i rrezikshëm i kloramfenikolit është

- A) Proteinuria.
- B) Ikteri kolostatik.
- C) Agranulocitoza.
- D) Diabeti.
- E) Anemia hemolitike.

PS)C

Pyetja 1395 V)1

Nëse vlerat e hormoneve FT3 dhe FT4 të tiroides janë të rritura, ndërsa vlera e TSH është e ulur (frenuar), mund të jemi në prani të

- A) Infarkt të miokardit.
- B) Metastazave kockore.
- C) Osteomielitit.
- D) Morbus Basedow.
- E) Morbus Alzheimer.

PS)D

Pyetja 1396 V)2

Përdorimi kronik i etanolit shoqërohet me shpeshtësi të rritur të

- A) Kolestazës.

- B) Steatozës.
- C) Hemokromatozës.
- D) Hipertrofisë së retikulumit endoplazmatik.
- E) Nekrozës koagulative.

PS)B

Pyetja 1397 V)1

Cili nga parametrat e mëposhtëm serologjikë duhet monitoruar gjatë terapisë me heparinë?

- A) APTT
- B) PT (koha e protrombinës)
- C) INR (International Normalised Ratio)
- D) Numri i trombociteve
- E) A+D

PS)E

Pyetja 1398 V)2

Cili nga pohimet e mëposhtëm që lidhet me insiprimin gjatë maksimumit të provës ushtrimore është i gabuar?

- A) Diafragma zbret më shumë se 3 cm.
- B) Diametri anësor i toraksit rritet.
- C) Muskujt interkostal të jashtëm kontrahohen.
- D) Muskuli sternokleidomastoid kontrahohet.
- E) Presioni intraabdominal reduktohet.

PS)E

Pyetja 1399 V)1

Shkaku më i zakonshëm jo neoplazik i hipopituitarizmit tek të rriturit është

- A) Trauma kraniale.
- B) Infamacioni.
- C) Idiopatike.
- D) Sindroma Sheehan.
- E) Amiloidoza.

PS)D

Pyetja 1400 V)1

Për të penetruar me një age në kavitetin pleurik përgjatë vijës medio-aksilare, kalohet përmes të gjithë strukturave të mëposhtme, përveç

- A) Muskulit interkostal të brendëshëm.
- B) Muskulit ngritës të brinjëve .

- C) muskulit interkostal të jashtëm.
 - D) Pleurës parietale.
 - E) Fascies endotorakale.
- PS)B

Pyetja 1401 V)2

Mohimi i lëshimit të raportit mjekësor është legjitim vetëm nëse

- A) Personi i asistuar mund të ekspozohet ndaj proçedimit penal.
 - B) Personi i asistuar mund të ekspozohet ndaj proçedimit civil.
 - C) Mjeku mund të ekspozohet ndaj proçedimit penal.
 - D) Mjeku mund të ekspozohet ndaj proçedimit civil.
 - E) Asnjëherë.
- PS)A

Pyetja 1402 V)1

Çfarë kemi parasysh kur themi "kohë dyfishimi" (doubling time)?

- A) Koha që i duhet një lezioni nodular për të dyfishuar vëllimin e tij.
 - B) Koha që i duhet një lezioni nodular për të dyfishuar diametrin e tij.
 - C) Koha që i duhet një lezioni nodular për të dyfishuar vëllimin dhe diametrin e tij.
 - D) Koha që i duhet një lezioni nodular për të dhënë metastaza në distancë.
 - E) Koha që i duhet një lezioni nodular për të dyfishuar perimetrin e tij.
- PS)A

Pyetja 1403 V)2

Cili nga pohimet e mëposhtëm është i gabuar?

- A) Citologjia eksfoliative përdoret si screening për karcinomën e qafës së mitrës.
 - B) Citologjia eksfoliative mund të përdoret për diagnozën e karcinomës bronkiale.
 - C) Citologjia eksfoliative përdoret mbi qelizat e përftuara përmes aspirimit me age të hollë (FNA)
 - D) Citologjia eksfoliative ndonjëherë përdoret për diagnozën e sëmundjeve mezoteliale.
 - E) Citologjia eksfoliative mund të përdoret për të studiuar sëmundjet e majës së gjirit
- PS)C

Pyetja 1404 V)1

Lokalizimi më i shpeshtë i një enteriti segmentar është

- A) Ileumi.
- B) Koloni.
- C) Stomaku.
- D) Rektumi.

E) Ezofagu.

PS)A

Pyetja 1405 V)1

Simptoma kryesore e pacientit me akalazi është

A) Apiroza.

B) Dhëmbja epigastrike.

C) Dhëmbja gjate gëlltitjes .

D) Refluksi acid.

E) Disfagia.

PS)E

Pyetja 1406 V)1

Hiperaktiviteti bronkial

A) Shoqërohet gjithmonë me astmë bronkiale të diagnostikuar.

B) Mund të evidentohet edhe tek pacientët asimptomatikë.

C) Zakonisht evidentohet me inhalimin e atropinës.

D) Zakonisht evidentohet me inhalimin e salbutamolit.

E) Theksohet nga inhalimi i antikolinergjikëve si p.sh ipratropium bromur.

PS)B

Pyetja 1407 V)2

Cili nga pohimet e mëposhtëm lidhur me amilazën është i gabuar?

A) Gjatë insuficiencës renale kronike, niveli urinar i amilazës është i ulur.

B) Makroamilazemia ndeshet zakonisht gjatë pankreatitit akut.

C) Në prani të makroamilazemisë, nivelet plazmatike të amilazës janë të rritura.

D) Në subjektin normal, rreth 50% e amilazës së pranishme në plazëm është e tipit salivar.

E) Gjatë pankreatitit, rritja e amilazave shoqërohet shpesh nga rritje e njëkohshme e lipazave.

PS)A

Pyetja 1408 V)1

Cila nga karakteristikat e mëposhtme nuk i përket barnave gjenerikë?

A) Prodhohen nga industria.

B) Janë të dobishëm në patologji të shumta, pasi nuk janë specifik.

C) Janë bioekuivalentë krahasuar me barin referencë.

D) Nuk mbrohen nga patentat.

E) Zakonisht kushtojnë më pak krahasuar me barin referencë.

PS)B

Pyetja 1409 V)2

Cili element patogjenetik i mëposhtëm nuk është tipik i astmës bronkiale?

- A) Bronkospazma
- B) Mbiprodhimi i mukusit
- C) Edema e mukozës bronkiale
- D) Infeksion i mukozës bronkiale
- E) Granuloma eozinofile

PS)E

Pyetja 1410 V)2

Cili nga pohimet e mëposhtëm lidhur me anti inflamatorët jo steroidal është i vërtetë?

- A) Frenojnë agregimin e trombociteve pasi ulin nivelet plazmatike të Ca^{++} .
- B) Aspirina frenon agregimin e trombociteve pasi frenon ciklooksigenazën.
- C) Rikthimi i trombociteve në funksionin e tyre normal kërkon të paktën 3 javë kohë pas ndërprerjes së administrimit të aspirinës.
- D) Doza antiagregante e aspirinës është 20 mg/kg në ditë.
- E) Të gjithë barnat anti inflamatore josteroidale frenojnë në mënyrë të pakthyeshme agregimin e trombociteve.

PS)B

Pyetja 1411 V)1

Metotreksati është një bar antiblastik i grupit të

- A) Alkilanteve.
- B) Antimetaboliteve.
- C) Antibiotikëve.
- D) Helmeve.
- E) Alkaloideve të vinkës.

PS)B

Pyetja 1412 V)2

Cila alternativë është e saktë kur një i porsalindur prematur ka vështirësi të frymëmarrjes?

- A) Nuk janë zhvilluar ende plotësisht pneumocitet e tipit 1.
- B) Trakea nuk është ende plotësisht e hapur (e përshkueshme).
- C) Nuk është akoma i plotë mikroqarkullimi alveolar.
- D) Nuk janë zhvilluar ende plotësisht pneumocitet e tipit 2.
- E) Nuk janë zhvilluar ende plotësisht terminacionet nervore zonale.

PS)D

Pyetja 1413 V)3

Fibroma jo osifikante :

- A) Zhvillohet nga periosti
 - B) Migron kur është neoplastike
 - C) Ka kufij sklerotik
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 1414 V)3

Lezionet me qeliza gjigande prekin :

- A) Regjionin mandibular posterior
 - B) Femrat nën 24 vjeç
 - C) Prekin ose pllaken kortikale vestibulare ose linguale
 - D) Të gjitha të vërteta
- PS)B

Pyetja 1415 V)3

Lezionet me qeliza gjigande përfshijnë :

- A) Osteosarkomën dhe tumorin Braun
 - B) Sëmundjen Paget dhe kerrubizmin
 - C) Kist kockor aneurizmal ,fibroma dhe displazia fibroze
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 1416 V)3

Sëmundja Paget :

- A) Nuk është asnjëherë malinje
 - B) Prek kryesisht femrat
 - C) Zhvendos dhëmbët
 - D) Trajtohet me rezeksion
- PS)C

Pyetja 1417 V)3

Tumori Braun :

- A) Shenjat e para janë dhimbja e lamina dura dhe rezorbimi i rrënjëve të dhëmbëve
- B) Shenja e parë është prekja e gingivave
- C) Duhet të ekscizohet

D) Histopatologjia është specifike dhe diagnostike
PS)B

Pyetja 1418 V)3

Kerrubizmi:

A) Është autozomal dominant
B) Prek më shpesh meshkujt
C) Fillon në njërin anë pastaj përfshin tjetrën
D) Të gjitha sëbashku
PS)D

Pyetja 1419 V)3

Përmasa e heparit mund të matet me anë të :

A) Inspeksionit
B) Palpacionit
C) Perkusionit
D) Askultacionit
PS)C

Pyetja 1420 V)3

Shenja normale e Babinskit është :

A) Dorsi fleksion i gishtit të madh të këmbës
B) Dorsi fleksion i thembrës
C) Fleksioni plantar i gishtit të madh të këmbës
D) Hapja e gishtave të këmbës
PS)C

Pyetja 1421 V)3

Pyetje më e rëndësishme gjatë vlerësimit preoperator të funksionit respirator të një pacienti është:

A) Dispnea
B) Zhurmë fërshëlljese
C) Toleranca ndaj sforcos fizike
D) Asnjera prej tyre
PS)C

Pyetja 1422 V)3

Masat pre operatorë për një pacient me histori angina pectoris përfshijnë :

- A) Nitroglicerinë profilaktike
- B) Operim në pozicion ulur
- C) Maskë O2 dhe sedativë
- D) Të gjitha sëbashku

PS)D

Pyetja 1423 V)3

Toleranca ndaj procedurave anestetike dhe kirurgjikale është më e mirë në :

- A) Aneminë akute
- B) Aneminë kronike
- C) Anemi si pasojë e fibrozës së palcës
- D) Anemia Sickle Cell

PS)B

Pyetja 1424 V)3

Tabloja klinike e alergjisë së vërtetë është :

- A) Rashi kutan
- B) Vështirësi në frymëmarrje
- C) Edema asimetrike
- D) Të gjitha sëbashku

PS)D

Pyetja 1425 V)3

PTT normale është :

- A) 12-14 sek
- B) 25-45 sek
- C) 3-5 min
- D) 1-3 min

PS)B

Pyetja 1426 V)3

Numri i përgjithshëm i leukociteve rritet në :

- A) Uremi
- B) Steroide
- C) Hemoragji
- D) Te gjitha sebashku

PS)D

Pyetja 1427 V)3

Përdorimi i kortizonikëve redukton numrin e :

- A) Euzinofileve dhe bazofileve
 - B) Limfociteve
 - C) Eritrociteve
 - D) A dhe B
- PS)D

Pyetja 1428 V)3

Numri i trombociteve rritet pas:

- A) Anemisë me mungesë hekuri
 - B) R.A
 - C) Splenektomi
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 1429 V)3

Numri i monociteve rritet në :

- A) TB
 - B) Sëmundje kolagjenoze
 - C) SABE
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 1430 V)3

Dehidratimi mund të shkaktojë :

- A) Përqëndrim elektrolitësh
 - B) Mungesë të elektroliteve
 - C) Djersitje
 - D) Ulje të sheqerit në gjak
- PS)A

Pyetja 1431 V)3

Glukoza në gjak rritet në :

- A) Stres ,Diabet ,Shtazani
- B) Hipertiroidizëm,Sëmundja Kushing,Pankreatid
- C) Të gjitha të mësipërmet

D) Asnjëra nga të mësipërmet
PS)C

Pyetja 1432 V)3

Shenja e parë e disfunksionit renal shfaqet në :

A) Kreatinemi
B) Azotemi
C) Analiza e urinës komplet
D) Enët e gjakut në retinë
PS)C

Pyetja 1433 V)3

Niveli i glukozës në 3-4 muajt paraardhës mund të përcaktohet me anë të :

A) Mioglobinës
B) Hemoglobinës së glukozuar
C) ESR
D) Analiza 24 orëshe e urinës
PS)B

Pyetja 1434 V)3

Mamografia:

A) Tregon leziona të barabarta ose më të vogla se 2 mm
B) Tregon leziona të barabarta ose më të vogla se 5 mm
C) Nuk i zbulon 20-22 % të lezioneve
D) Duhet të përsëritet
PS)B

Pyetja 1435 V)3

Kolesteroli në serum rritet në :

A) Hiperlipidemi
B) Pankreatit
C) Diabet
D) Të gjitha sëbashku
PS)D

Pyetja 1436 V)3

Rritja e kalciumit në serum gjendet në :

- A) Hiperparatiroidizëm dhe hipervitaminoza D
 - B) Metastazat kockore dhe mieloma multiple
 - C) Semundja Paget dhe sairroidozat
 - D) Të gjitha sëbashku
- PS)D

Pyetja 1437 V)3

Koha e hemoragjisë është një matje për :

- A) Spazmën vaskulare
 - B) Formimin e tapës platelet
 - C) Koagulimin
 - D) Sasinë e platelet
- PS)B

Pyetja 1438 V)3

Trupat e huaj radioopake në sinus mund të jenë :

- A) Llastik
 - B) Xham
 - C) Zhavorr
 - D) Të gjitha të mësipërmit
- PS)D

Pyetja 1439 V)3

Materialet e oksid zink eugenolit kanë acetat zinku:

- A) 1%
 - B) 15%
 - C) 19%
 - D) 35%
- PS)C

Pyetja 1440 V)3

Përdorimi i gipsit është:

- A) Material mase për protezat parciaie
 - B) Material mase e imët
 - C) Material mase për shinat në paradontozë
 - D) Material mase për protezat totale
- PS)D

Pyetja 1441 V)3

Adezivi i UFI Gel P është:

- A) Celuloid
 - B) Butanon
 - C) Platin
 - D) Salal
- PS)B

Pyetja 1442 V)3

Bazis Plate ka në përberje dyllra mikrokristaline:

- A) 2.5%
 - B) 3%
 - C) 12%
 - D) 67.5%
- PS)A

Pyetja 1443 V)3

Për galvanizimin e protezave metalike dentare përdoret:

- A) Kripa trefishe e cianurit të kaliumit
 - B) Kripa e kallajit
 - C) Hekzacianuri i platinit
 - D) Kripa e Nikelit
- PS)A

Pyetja 1444 V)3

Çfarë vetie është kur oksidi zhvillohet dhe është i qëndrueshëm :

- A) Vetë fizike
 - B) Vetë biologjike
 - C) Vetë kimike
 - D) Vetë mekanike
- PS)C

Pyetja 1445 V)3

Kujt metal i mungon qëndrueshmërinë:

- A) Plumbit
- B) Zinkut
- C) Kromit
- D)

Kallajit
PS)C

Pyetja 1446 V)3

Kujt metali i përket Fortësia 1 kg/mm²:

- A) Kadmiumit
 - B) Plumbit
 - C) Bismuthit
 - D) Kallajit
- PS)B

Pyetja 1447 V)3

Sa është kufiri i elasticitetit të materialeve:

- A) 0.005 - 0.018 %
 - B) 0.5 - 0.18 %
 - C) 0.05 - 0.18 %
 - D) 0.0005 - 0.0018 %
- PS)A

Pyetja 1448 V)3

Cili metal ka temperaturën e shkrirjes 320 grade Celsius:

- A) Argjendi
 - B) Zinku
 - C) Kallaji
 - D) Kadmiumi
- PS)D

Pyetja 1449 V)3

Cilit metal i takon temperatura e vlimit 778 grade Celsius :

- A) Zinkut
 - B) Bakrit
 - C) Argjendit
 - D) Kadmiumit
- PS)D

Pyetja 1450 V)3

Kujt koncepti i referohet karakteristikës që shoqërohet me ngjyrën e objektit:

- A) Ngjyrës
 - B) Vlerës
 - C) Nuancës
 - D) Pastërtisë
- PS)C

Pyetja 1451 V)3

Kujt koncepti i referohet rrezet predominuese ne syrin e njeriut:

- A) Ngjyrës
 - B) Vlerës
 - C) Nuancës
 - D) Ndërtimit strukturor
- PS)A

Pyetja 1452

V)3

Çfare Densitetit kanë keramikat feldshpatike:

- A) 1.7 - 2 gr/cm³
 - B) 2.14 gr/cm³
 - C) 2.4 gr/cm³
 - D) 2.97 gr/cm³
- PS)C

Pyetja 1453 V)3

Nga çfarë përbëhet gipsi i llojit të tretë:

- A) Hemihidrat sulfat kalçiumi
 - B) Alfa hemihidrat sulfat kalçiumi
 - C) Alfa hemihidrat i modifikuar sulfat kalçiumi
 - D) Beta hemihidrat sulfat kalçiumi
- PS)B

Pyetja 1454 V)3

Nga çfarë përbëhet gipsi i llojit të katërt:

- A) Beta hemihidrat sulfat kalçiumi
- B) Alfa hemihidrat sulfat kalçiumi
- C) Hemihidrat sulfat kalçiumi
- D) Alfa hemihidrat i modifikuar

PS)D

Pyetja 1455 V)3

Çfarë koeficienti Bymimi ka allçia Begstone:

- A) 0.09 %
- B) 0.9 %
- C) 0.19 %
- D) 0.15 %

PS)A

Pyetja 1456 V)3

Nëpërmjet kujt reaksioni formohet eugenati i Zinkut në Materialet e masës oksid zink eugenol:

- A) Nëpërmjet reaksionit të oksid zinkut me ujin e pastës së katalizatorit
- B) Nëpërmjet reaksionit të hidroksidit të zinkut me eugenolit
- C) Nëpërmjet reaksionit të oksidit të zinkut me acetat zinkun
- D) Nëpërmjet reaksionit të oksidit të zinkut me Balsam Peruan

PS)B

Pyetja 1457 V)3

Për çfarë përdoren materialet e kompozicionit të nëngrupit të dytë:

- A) Masë funksionale protezë totale
- B) Masë funksionale protezë parciale
- C) Masë për koronat xhaket
- D) Masë për urat fikse

PS)C

Pyetja 1458 V)3

Cila veti e rëndësishme i takon materialit hidrokoloide reversibël:

- A) Të derdhet lehtësisht
- B) Të hiqet lehtësisht nga gipsi
- C) Të mos tkurret
- D) Temperature e kalimit nga gjendja sol në xhel të jetë sa më e afërt me temperaturën e trupit

PS)D

Pyetja 1459 V)3

Për sa kohë ruhet materiali i Agar- agarit në vaskën e ruajtjes :

- A) Për 5 ditë
- B) Për 7 ditë
- C) Për 10 ditë
- D) Për 12 ditë

PS)A

Pyetja 1460 V)3

Cili është materiali dublues:

- A) Stenti
- B) Oksid zink eugenolit
- C) Elastomeret
- D) Kerri jeshil

PS)C

Pyetja 1461 V)3

Cili lloj alginati është i tretshëm në ujë:

- A) Alginat mangani
- B) Alginat joduri
- C) Alginat kalçiumi
- D) Alginat manganiumi

PS)D

Pyetja 1462 V)2

Çfarë lloj okluzioni është okluzioni i hapur :

- A) fiziologjik
- B) patologjik
- C) pat-fiziologjik
- D) fiz-patologjik

PS)B

Pyetja 1463 V)2

Okluzioni i kryqëzuar është:

- A) fiziologjik
- B) pat-fiziologjik
- C) patologjike
- D) fiz-patologjike

PS)C

Pyetja 1464 V)2

Si janë të kthyera sipërfaqet përtypëse të dhëmballëve poshtë sipas kurbës së Ėilsonit:

- A) Janë të kthyera brenda - lartë
 - B) Janë të kthyera jashtë - lartë
 - C) Janë të kthyera lartë - poshtë
 - D) Janë të kthyera lartë dhë brenda
- PS)D

Pyetja 1465 V)2

Sa sisteme kodifikimi të dhëmbëve janë:

- A) 5 sisteme
 - B) 4 sisteme
 - C) 3 sisteme
 - D) 6 sisteme
- PS)A

Pyetja 1466 V)1

Çfarë sistemi kodifikimi për dhëmbët e qumështit përfaqëson formula ABCDE FGHIJ:

- A) European
 - B) Universal
 - C) Palmer
 - D) Chevron
- PS)B

Pyetja 1467 V)1

Çfarë sistem kodifikimi për dhëmbët e qumështit përfaqëson formula EDCBA ABCDE:

- A) European
 - B) FDI
 - C) Palmer
 - D) Universal
- PS)C

Pyetja 1468 V)1

Çfarë sistem kodifikimi për dhëmbët e qumështit përfaqëson formula 55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 :

- A) European
 - B) Shevron
 - C) Universal
 - D) FDI
- PS)D

Pyetja 1469 V)1

Në çfarë moshe erupton Incizivi qendror maxilar i qumështit

- A) 10 (8-12) muaj
 - B) 11 (9-13) muaj
 - C) 19 (16-22)muaj
 - D) 16 (13-19)muaj
- PS)A

Pyetja 1470 V)1

Në çfarë moshe erupton Incizivi lateral mandibular i qumështit:

- A) 8 (6-10) muaj
 - B) 13 (10-16) muaj
 - C) 20 (17-23) muaj
 - D) 16 (14-18) muaj
- PS)B

Pyetja 1471 V)1

Në çfarë moshe erupton Incizivi qendror mandibular i qumështit:

- A) 20 (17-23) muaj
 - B) 16 (14-18) muaj
 - C) 13 (10-16) muaj
 - D) 24 (23-31) muaj
- PS)C

Pyetja 1472 V)1

Në çfarë moshe erupton Molari i dytë maxilar i qumështit:

- A) 14 (13-16) muaj
 - B) 19 (16-22) muaj
 - C) 16 (13-19) muaj
 - D) 29 (25-33) muaj
- PS)D

Pyetja 1473 V)1

Në çfarë moshe erupton Molari i parë mandibular i qumështit:

- A) 8 (6-10) muaj
- B) 16 (14-18) muaj
- C) 20 (17-23) muaj
- D) 13 (10-16) muaj

PS)B

Pyetja 1474 V)1

Në çfarë moshe erupton Molari i parë maxilar i qumështit:

- A) 16 (13-19) muaj
- B) 19 (16-22) muaj
- C) 20 (25-33) muaj
- D) 11 (9-13) muaj

PS)A

Pyetja 1475 V)1

Çfarë rëndësie kanë dhëmbët e qumështit:

- A) Në ngjyrën e dhëmbëve
- B) Në formimin e kockave dhe nofullave
- C) Në pamjen e fytyrës
- D) Në madhësinë e gojës

PS)B

Pyetja 1476 V)1

Çfarë rëndësie kanë dhëmbët e qumështit:

- A) Në ngjyrën e dhëmbëve
- B) Në pamjen e fytyrës
- C) Në zhvillimin e muskujve
- D) Në madhësinë e kavitetit oral

PS)C

Pyetja 1477 V)1

Çfarë rëndësie kanë dhëmbët e qumështit:

- A) Në ngjyrën e dhëmbëve
- B) Në pamjen e fytyrës
- C) Në madhësinë e kavitetit oral
- D) Në pozicionimin normal të dhëmbëve të përhershëm

PS)D

Pyetja 1478 V)1

Çfarë rëndësie kanë dhëmbët e qumështit:

- A) Në renditjen e dhëmbëve në harkadë dhe në okluzion
- B) Në ngjyrën e dhëmbëve
- C) Në madhësinë e kavitetit oral
- D) Në pamjen e fytyrës

PS)A

Pyetja 1479 V)1

Si paraqitet zmalti në dhëmbët e qumështit:

- A) I trashë jo i thelluar
- B) I hollë me një thellësi të qëndrueshme
- C) I moderuar jo i qëndrueshëm
- D) I thepisur i qëndrueshëm

PS)B

Pyetja 1480 V)1

Cili nga dhëmbët e qumështit është më i madh:

- A) Kanini
- B) Molari i parë
- C) Molari i dytë
- D) Incizivi lateral

PS)C

Pyetja 1481 V)1

Çfarë kanë dhomat e pulpës dhe pulpa ndërmjet tyre në dhëmbët e qumështit:

- A) Zmalt
- B) Cement
- C) Zmalt-cement
- D) Dentinë

PS)D

Pyetja 1482 V)3

Cili është pohimi i vërtetë:

- A) Lezioni herpetik I thjeshte ka vetëm një vezikul,ndërsa gingivostomatiti ka shumë vezikula
 - B) Lezioni herpetik I thjeshtë shkaktohet nga HSV ndërsa gingivostomatiti nga VZV
 - C) Lezioni herpetik I thjeshtë si dhe gingivostomatitis mund të shkaktohet nga I njëjti virus
 - D) Lezioni herpetik I thjeshte mund të prekë gjithë mukozën ndërsa gingivostomatitis limitohet vetëm në gingiva
- PS)C

Pyetja 1483 V)2

Gingiva e lirë përbëhet nga elementët:

- A) Lingual,palatal,papilla interdental
 - B) Vestibular,lingual/palatal,Papilla interdental
 - C) Vestibular,palatal dhe lingual
 - D) Papilla interdental dhe gingiva e ngjitur
- PS)B

Pyetja 1484 V)1

Cili është roli I qelizave të Langerhans në gingivë;

- A) Funksion sensorial
 - B) Funksion imunitar
 - C) Ndjeshmëri temperature
 - D) Funksion pigmentues
- PS)B

Pyetja 1485 V)2

Funksioni formues I ligamentit periodontal konsiston në aktivitetin e:

- A) Cementoblasteve,fibroblasteve,osteoblasteve
 - B) Amortizimin e forcave,osteklasteve,dhe ankorimin e dhëmbëve
 - C) Cementoklasteve,osteoklasteve dhe ankorimin e dhëmbit
 - D) Nuk ka funksion formues por vetëm mbështetës dhe amortizues te strukturës dhëmbore
- PS)A

Pyetja 1486 V)3

Pllaka subgingivale jo-aderente ka në përbërje:

- A) Kryesisht baktere Gram –,të lëvizshëm ose jo,spiroketa etj.
- B) Kryesisht baktere Gram +
- C) Pothuajse njësoj Gram+ dhe Gram –
- D) Fillimisht Gram – e më pas tejkalohen nga Gram +,filament etj.

PS)A

Pyetja 1487 V)3

Cilët prej faktorëve më poshtë nuk ndikon në sëmundjen gingivare:

- A) Shtatëzania
- B) Cikli menstrual
- C) Valvulopatitë
- D) Diabeti mellitus

PS)C

Pyetja 1488 V)2

Periodontiti Agresiv :

- A) Prek persona të rinj në dekadën 2 – 3,të shëndetshëm dhe pa probleme sistemike
- B) Prek persona të rinj në dekadën 1 – 2,me probleme sistemike
- C) Prek perosna të rinj në dekadën 3–4–5,jo të shëndetshëm dhe me probleme sistemike
- D) Prek persoa të rinj në dekadën 2- 3,pavarësisht problemeve sistemike që mund të ketë

PS)A

Pyetja 1489 V)1

Si paraqitet në radiografi gingiviti:

- A) Shfaqet me recesion dhe ulje të gingivës
- B) Shfaqet me recesion të kockës dhe ulje të nivelit kockor
- C) Nuk shfaqet
- D) Nuk shfaqet në rastin kur gingiviti është në fillimet e procesit inflamator

PS)C

Pyetja 1490 V)2

Indikacionet për ruajtjen e dhëmbëve të qumështit janë:

- A) Pacienti bashkëpunues
- B) Pranimi i terapise nga prindërit
- C) Agenezi e dhëmbëve permanent
- D) Të treja në konsideratë

PS)D

Pyetja 1491 V)2

Kariesi rampant është karakteristike për :

- A) Dhëmbët e qumështit të moshës 3-5 vjec
- B) Në dhëmbët e sistemit dentar mikst

- C) Në dhëmbët e përhershëm të moshës 15-18 vjeç
 - D) Në moshat mbi 50 vjeç
- PS)A

Pyetja 1492 V)2

Dhoma pulpare e dhëmbëve të qumështit përkundrejt dhëmbëve permanent është:

- A) Është më vogël në të gjithë diametrin e saj
 - B) Është më gjerë në të gjithë diametrin e saj
 - C) Është më e gjerë vetëm në proksimitetin e sipërfaqes okluzale
 - D) Është më vogël vetëm në diametrin mezio – distal
- PS)B

Pyetja 1493 V)2

Për një diagnozë radiologjike të kariesit aproksimal janë përcaktuese :

- A) Rx ortopanomike të arkadave dentare
 - B) 2 Rx endorale bite-ëing
 - C) 2Rx endorale peri-apikale
 - D) 2Rx endorale – okluzale
- PS)B

Pyetja 1494 V)2

Qendra e rrotullimit të një dhëmbi ndodhet:

- A) Në apeks të rrënjës
 - B) Në $\frac{1}{2}$ të rrënjës
 - C) Në qendër të koronës klinike
 - D) Nuk është një pikë fikse, varet nga distanca e forcës nga qendra e rezistencës
- PS)D

Pyetja 1495 V)2

Ngjyra gri e errët në dhëmbët me gangrenë pulpare është shkak nga:

- A) Nga pigmente të absorbuara nga smalti
 - B) Nga transformimi i hemoglobines
 - C) Nga transparencja e dentinës së zbutur
 - D) Produkt i degradimit të metabolizmit bakterial
- PS)B

Pyetja 1496 V)2

Dekstrani që ka një rol primar në formimin e pllakës bakteriale është:

- A) Një polisaharid i sintetizuar nga disa bakterie sporogjene

- B) Një polisaharid i sintetizuar nga disa streptokok në prezencë të saharezës
 - C) Një polisaharid i sintetizuar nga disa stafilokok
 - D) Një polisaharid i sintetizuar nga disa laktobacile
- PS)B

Pyetja 1497 V)2

Formula dentare në vazhdim 55 54 53 52 51 përfaqëson:

- A) Denticionin e qumështit në harkadën superiore të majtë
 - B) Denticionin e qumështit në harkadën superiore të djathtë
 - C) Denticionin e qumështit në harkadën inferiore djathtas
 - D) Denticion permanent në harkadën superiore djathtas
- PS)B

Pyetja 1498 V)3

Cilët janë elementët fiziologjikë të dhëmbit të paformuar për të formuar rrënjët dhe apeksin:

- A) Indi pular
 - B) Indi pulpar dhe indi konjuktiv
 - C) Indi epithelial
 - D) Indi cementoid
- PS)B

Pyetja 1499 V)3

Në dhëmbët permanentë me rrënjë të paformuar në mbulimin indirekt formohet:

- A) Dentinë primare
 - B) Dentinë sekondare
 - C) Dentinë terciare
 - D) Dentinë sklerotike
- PS)C

Pyetja 1500 V)3

Kur përdorim MTA në mbulimin direkt të pulpës formimi i urës dentinare formohet:

- A) 6 javë
 - B) 3javë
 - C) 2javë
 - D) 8javë
- PS)B

Pyetja 1501 V)3

Maturimi i dhëmbit dhe vendosja e lidhjes cemento-dentinare ndodh pas daljes së dhëmbit për:

- A) 2vjet
 - B) 2,5vjet
 - C) 3vjet
 - D) 3,4-4vjet
- PS)D

Pyetja 1502 V)3

Dhëmbët permanent dalin në arkadën dentare pasi rrënjët e tyre janë formuar :

- A) 1/3 e rrënjës
 - B) 1/2 e rrënjës
 - C) 2/3 e rrënjës
 - D) Kur është formuar vetëm korona
- PS)C

Pyetja 1503 V)3

Vendosja e varnisheve ndërmjet kavitetit dhe mbushjes shërben për:

- A) Bën hermetike mbushjen
 - B) Mbron pulpën nga stimujt fizikë dhe kimikë
 - C) Lejon një kavitet të ç'rregullt
 - D) E bën mbushjen më të qëndrueshme
- PS)B

Pyetja 1504 V)3

Koronat e incizëve central permanent janë komplet të mineralizuara:

- A) 1-2vjeç
 - B) 2-3vjeç
 - C) 3-4vjeç
 - D) 6-7vjeç
- PS)D

Pyetja 1505 V)3

Në cilën moshë fillon rezorbimi i molarëve të qumështit:

- A) 3-4vjeç
 - B) 4-5vjeç
 - C) 5-6vjeç
 - D) 6-7vjeç
- PS)D

Pyetja 1506 V)3

Gjuha në formën e manaferrave paraqitet ne fëmije:

- A) Variçel
- B) Skarlatine
- C) Difteria
- D) Fruthi

PS)B

Pyetja 1507 V)3

Sistemi dentar i qumshtit kompletoht në:

- A) 20 muaj
- B) 30 muaj
- C) 40
- D) 50

PS)B

Pyetja 1508 V)3

Lënda inorganike në dhëmbë ka më shumë:

- A) Fluorapatit
- B) Hidroksiapatit
- C) Carbonatapatit
- D) Oktacalçiumfosfat

PS)B

Pyetja 1509 V)3

Koagulimi i pulpes realizohet më shpejt në amputimin vital në dhëmbë me rrënjë të paformuar me :

- A) Ca(OH)_2
- B) ZnO
- C) Yag Lazer
- D) Formokrezol

PS)C

Pyetja 1510 V)3

Një fëmijë 11 vjeç me periodontit kronik të fistulizuar te dhëmbit 85 trajtimi do të jetë:

- A) Amputim vital
- B) Perpunim kanalesh dhe mbushje kanalesh
- C) Ekstraksion
- D) Amputim mortal

PS)C

Pyetja 1511 V)3

Në plotësimin e kartelës në pacient me trauma është e rëndësishme:

- A) Anamneza
- B) Egzaminimi klinik
- C) Matja e vitalitetit dhe Radiografia
- D) Të tri opsionet

PS)D

Pyetja 1512 V)3

Rezorbimi i rrënjes të një dhemb qumshti quhet:

- A) Apektomi
- B) Pulpotomi
- C) Rizaliza
- D) Rezektomi

PS)C

Pyetja 1513 V)3

Cilat nga patologjitë jo dentare është përfshirë në opsionet:

- A) Patologji karioze
- B) Patologji traumatike
- C) Patologji e ATM-së
- D) Patologji pulpo-paradontale

PS)C

Pyetja 1514 V)3

Me cilën nga metodat arrihet mjekimi dentar maximal në fëmijë:

- A) Aneztezi locale
- B) Pa anestezi locale
- C) Maska nazale me Protozit Azoti
- D) Anestezi te përgjithëshme

PS)C

Pyetja 1515 V)3

Metoda interceptive e trajtimit të kariesit në fëmijë realizohet:

- A) Silante
- B) Aplikim i verniceve të fluorit
- C) Pastrimi i pllakës bakteriale

D) Të tre opsione janë të sakta
PS)D

Pyetja 1516 V)3

Çfarë perfaqëson bruksizmi në fëmije:

- A) Një intoksikim farmaceutik
 - B) Një lezion të koletit të dhëbit
 - C) Kërcitje të dhëmbëve
 - D) Hipertrofi gingivare
- PS)C

Pyetja 1517 V) 3

Në trajtimin e kariesit në dhëmbët e qumshtit, cili nga materialet ka mundësi më të pakët për karies sekondar:

- A) Amalgami
 - B) Glassionomeri
 - C) Kompoziti
 - D) Kompomeri
- PS)B

Pyetja 1518 V)3

Kur përdoret Ca(OH)_2 në pulpektomi në trajtimin e dhëmbëve të përhershëm me rrënjë të paformuar :

- A) Kur kanali është boshatisur nga Ca(OH)_2
 - B) Kur niveli i Ca(OH)_2 është në mes të kanalit
 - C) Kur niveli i Ca(OH)_2 është zvogluar me 1/3 apikale
 - D) Kur ka pastë Ca(OH)_2 në të gjitha kanalet
- PS) C

Pyetja 1519 V)3

Tek te rinjte cilet dhembe preken me shume nga paradontiti i lokalizuar

- A) Molarët e parë dhe incizivët permanent
 - B) Lateralët
 - C) Premolarët siper
 - D) Molarët e dytë poshtë
- PS) A

Pyetja 1520 V)3

Frekuenca më e larte në traumat e dhëmbëve të përhershëm te femijet është:

- A) 8-10 vjec
 - B) 8-14 vjec
 - C) 8-11vjec
 - D) 7-16 vjec
- PS) C

Pyetja 1521 V)3

Kanini i qumshtit del në muajt:

- A) 12-15 muaj
 - B) 16-20 muaj
 - C) 17-19 muaj
 - D) 20-25 muaj
- PS)B

Pyetja 1522 V) 3

Hiperemia pulpare është e karakterizuar nga:

- A) Fluks i madh i gjakut arterial
 - B) Një dilatim aktiv të enëve të gjakut
 - C) Qëndrim të gjakut venoz në pulpë
 - D) Një rritje të presionit sistolik
- PS) C

Pyetja 1523 V)2

Opaleshenca është përgjegjse për:

- A) kromën
 - B) intensivët
 - C) aureolën incizale
 - D) karakterizimet
- PS)C

Pyetja 1524 V)1

Cementi qelizor formohet :

- A) Në embriogenezë
 - B) Gjatë gjithë jetës
 - C) Si përgjigje ndaj proçeseve karioze
 - D) Si përgjigje ndaj defekteve kuneiforme
- PS)B

Pyetja 1525 V)2

Për restaurimin e një kaviteti të klasës së VJ në molarë do të zgjidhni :

- A) Kompozit fluid
- B) Glass ionomer cement
- C) Kompozit hibrid
- D) Cement oksifosfat

PS)C

Pyetja 1526 V)1

Kariesi sekondar lokalizohet :

- A) Nën mbushje
- B) Në anët e mbushjes
- C) Në bifurkacion
- D) 1/3 cervikale

PS)B

Pyetja 1527 V)1

Pulpa koronare ka :

- A) Më pak enë gjaku se pulpa radikulare
- B) Më shumë elemente qelizor se pulpa radikulare
- C) Më shumë elementë fibrilar se pulpa radikulare
- D) Më pak makrofage se pulpa radikulare

PS)B

Pyetja 1528 V)1

Cili është shkaku i rënies së hershme të mbushjeve me kompozit?

- A) Karies sekondar
- B) Forma e kavitetit
- C) Acidifikim jo korrekt
- D) Vendosja jo korrekte e shtresës izoluese

PS)C

Pyetja 1529 V)1

Llaqet indikohen në mbushjet me :

- A) Kompozit
- B) Kompomer
- C) Glass ionomer cement
- D) Amalgam

PS)D

Pyetja 1530 V)2

Cili shërben si aktivator te kompozitet?

- A) MMA
- B) Hidrokinonet
- C) Kamforkuinon
- D) Oksigjeni

PS)C

Pyetja 1531 V)2

Cili nga restaurimet e mëposhtëme konsumohet më shumë në sipërfaqe?

- A) Restaurim me Glass ionomer cement
- B) Restaurim me kompozit
- C) Restaurim indirekt (inlej) me kompozit
- D) Restaurim indirekt(inlej) me porcelan

PS)A

Pyetja 1532 V)1

Rënja e dhëmbit e merr fillesën nga :

- A) Cementoblastet
- B) Mbeturinat epiteliale te Malases
- C) Laku cervikal
- D) Odontoblastet

PS)C

Pyetja 1533 V)2

Fuqia e bondimit është me e lartënë bondimin me :

- A) Dentinën primare
- B) Cementin
- C) Dentinën sklerotike
- D) Dentinën sekondare

PS)A

Pyetja 1534 V)2

Cili është promotor i adezionit jon-shkëmbyes te Glass ionomer cementet?

- A) Fluoro alumino silikat glassi
- B) Acidi tartarik

- C) Acidi polialkenoik 10%
 - D) Oksidi i stronciumit
- PS)C

Pyetja 1535 V)1

Koefiçienti i bymimit termik i cilit prej materialeve të mëposhteme i përafrohet më shumë atij të dhëmbit?

- A) Kompozit
 - B) Amalgam
 - C) GIC
 - D) Kompomer
- PS)C

Pyetja 1536 V)1

Sterilizimi me kuarç përdoret për:

- A) Instrumentat e vizites
 - B) Anglin e turbinës
 - C) Medikamentet pluhura
 - D) Instrumentat e kanalit
- PS)C

Pyetja 1537 V)2

Epiteli oral e ka origjinën nga:

- A) Mezenkima
 - B) Qelizat e kreshtes nervore
 - C) Ektoderma
 - D) Membrane bazale.
- PS)C

Pyetja 1538 V)2

Për trajtimin e hipersensitivitetit dentinar cilin nga preparatet e mëposhteme do të përdorni?

- A) Hidroksid kalciumi liner
 - B) Varnish fluori
 - C) Eugenat
 - D) Cement karboksilat
- PS)B

Pyetja 1539 V)2

Cilat qeliza diferencohen të parat:

- A) Preodontoblastet
- B) Preadamantoblastet
- C) Precementoblastet
- D) Mbeturinat epiteliale të Malases

PS)B

Pyetja 1540 V)2

Cilën nga metodat e diagnostikimit për detektimin e kariesit aproksimal do të zgjidhni në një grua shtatzënë ?

- A) Radiografi ne kafshim
- B) Panorameks
- C) DIFOTI
- D) Skaner

PS)C

Pyetja 1541 V)1

Përbërja përfundimtare e pështymes së sekretuar varet nga :

- A) sasia e pështymës
- B) sasia e komponenteve organik
- C) shpejtësia e sekretimit
- D) sasia e bikarbonateve

PS)C

Pyetja 1542 V)2

Në zhvillimin embrional të aparatit dentar cilat formacione formohen të parat :

- A) Proçeset maksilare
- B) Proçeset mandibulare
- C) Burbuqet e dhëmbëve permanentë
- D) Buzët dhe proçesi nazal

PS)B

Pyetja 1543 V)3

Pllaka ose Biofilmi Dentar është:

- A) I ndjeshëm nga agjentët ekzogjen antimikrobial
- B) I ndjeshëm nga antitykotikët
- C) Rezistent ndaj agjentëve ekzogjen antimikrobialë
- D) Reagon ndjeshëm nga ndryshimet e temperaturës

PS)C

Pyetja 1544 V)1

Cila nga alternativat e mëposhtme paraqet një strategji komunitare të parandalimit dentar?

- A) Sondimi periodontal
- B) Shpëlarsit me fluor në shkolla
- C) Profilaksia orale
- D) Imazheria digitale

PS)B

Pyetja 1545 V)2

Pështyma e pa stimuluar prodhohet kryesisht nga:

- A) Gjëndrat e vogla salivare në gjithë kavitetin e gojës
- B) Nga gjëndra parotis
- C) Nga gjëndra submandibulare
- D) Nga gjëndra sublinguale

PS)A

Pyetja 1546 V)2

Cila nga alternativat e mëposhtme është diferenca kryesore klinike dhe diagnostike ndërmjet gingivitit dhe periodontitit?

- A) Thellësia e sulkusit
- B) Thellësia e xhepit
- C) Humbja e lidhjes
- D) Evidenca e inflamacionit gingivar

PS)C

Pyetja 1547 V)2

Për sa kohë është në rrezik për të zhvilluar osteoradio nekrozë pacienti me kancer oral?

- A) 1 vit
- B) 5 vjet
- C) 10 vjet
- D) Gjithë jetën

PS)D

Pyetja 1548 V)1

Mukoziti është një shqetësim për pacientet që kanë një nga llojet e trajtimeve të mëposhtme:

- A) Kirurgji
 - B) Radioterapi dhe Kimioterapi
 - C) Antibiotiko terapi
 - D) Kirurgji dhe antibiotiko terapi
- PS)B

Pyetja 1549 V)2

Zona më e zakonshme ku ndodh carcinoma intraorale e qelizës skuamoze është:

- A) Kreshta alveolare
 - B) Qiellza e butë
 - C) Gjuha
 - D) DysHEMEJA e gojës
- PS)C

Pyetja 1550 V)2

Trauma e denticionit primar e ka pikun në moshën:

- A) 2-3 vjec
 - B) 8-9 vjec
 - C) 9-10 vjec
 - D) 11-12 vjec
- PS)A

Pyetja 1551 V)2

Trauma e denticionit permanent e ka pikun në moshën:

- A) 2-3 vjeç
 - B) 4-5 vjeç
 - C) 9-10 vjeç
 - D) 17-18 vjeç
- PS)C

Pyetja 1552 V)2

Lëvizja e dhëmbëve së bashku me procesin alveolar tregon:

- A) Traumë minimale
 - B) Sëmundjet e avancuar periodontale
 - C) Frakturë të kreshtës alveolare
 - D) Moshën e pacientit
- PS)C

Pyetja 1553 V)1

Në ekzaminim fillestar të traumës dentare nuk përfshihet:

- A) Ekzaminimin e indit të butë dhe të fortë
- B) Testi pulpar
- C) Rrezet X
- D) Vlerësimi neurologjik

PS)B

Pyetja 1554 V)3

Cila nga alternativat e mëposhtme është zgjidhja më e mirë për të ruajtur dhëmbët e avulsuar?

- A) Uji i rubinetit
- B) Uji i shishes
- C) Qumështi
- D) Alkooli

PS)C

Pyetja 1555 V)1

Cili nga komponentët e mëposhtëm nuk është pjesë e barrierave mbrojtëse orale, kundër infeksionit?

- A) Epiteli oral
- B) Pështyma
- C) Zmalti
- D) Okluzioni

PS)D

Pyetja 1556 V)3

Në cilën nga patologjitë e mëposhtme përgjigja imunitare është më përgjegjëse për shkatërrimin e indit sesa patogjenët?

- A) Kariesi dentar
- B) Candida albicans
- C) Sëmundja periodontale
- D) Karcinoma e qelizës skuamoze

PS)C

Pyetja 1557 V)2

Cila nga alternativat e mëposhtme nuk është një funksion i pështymës?

- A) Lubrifikues
- B) Buferik

- C) Prodhon faktorin e nekrozës tumorale (TNF alfa)
 - D) Tretja fillestare e karbohidrateve
- PS)C

Pyetja 1558 V)2

Cila nga imunoglobulinat e mëposhtme lidhet më shumë me shëndetin oral?

- A) IgA
 - B) IgG
 - C) IgE
 - D) IgM
- PS)A

Pyetja 1559 V)3

Cili nga përbërësit e fluorit përputhet mirë me karbonatin e kalciumit të përdorur tek pastat e dhëmbëve?

- A) Monofluor fosfat i natriumit
 - B) Fluoruri i kallajit
 - C) Fluori neutral
 - D) Fosfo fluoruri me acid
- PS)A

Pyetja 1560 V)2

Agjenti antibakterial në pastat e dhëmbëve është:

- A) Nitrati i kaliumit
 - B) Triklosani
 - C) Sulfat zinku
 - D) Pirofosfatet e tretshme
- PS)B

Pyetja 1561 V)3

Cila nga alternativat e mëposhtme është ingredient që inkorporohet tek çamçakezët dhe remineralizon lezionet e hershme karioze dhe që njihet si Recaldent?

- A) Xylitol
 - B) Sorbitol
 - C) Kasein
 - D) CPP-ACP (fosfopeptid kazein-fosfat kalciumi amorf)
- PS)D

Pyetja 1562 V)2

Cila nga procedurat e mëposhtme të higjenës orale personale rekomandohet në fillim?

- A) Shpëlarja çdo ditë me klorheksidinë për 2 muaj
- B) Përdorimi i fillit dentar
- C) Përdorimi i një kunji druri trekëndor
- D) Përdorimi i një pastruesi gjuhe

PS)B

Pyetja 1563 V)1

Cila nga kushtet e mëposhtme ndihmon qëndrueshmërinë e silantit?

- A) Sipërfaqja dhëmbore të jetë e lagësht
- B) Sipërfaqja dhëmbore të jetë e thatë
- C) Sipërfaqja dhëmbore të jetë e lëmuar
- D) Sipërfaqja dhëmbore të jetë e demineralizuar

PS)B

Pyetja 1564 V)2

Rritja e sipërfaqes së kontaktit e cila përmirëson adezionin kërkon përdorimin e materialeve dentare:

- A) Bond
- B) Acid
- C) EDTA
- D) NaOCL

PS)B

Pyetja 1565 V)3

Përdorimi i silantit kundërindikohet në:

- A) Fisura të thella
- B) Fisura të thella me lezime fillestare karioze
- C) Për të përmirësuar integritetin marginal të mbushjeve të klasës së I
- D) Fisura me lezime të thella karioze

PS)D

Pyetja 1566 V)1

Cila nga alternativat më poshtë është zgjedhja më e mirë për një vakt antikariogjenik për një pacient me risk të lartë me karies dentar?

- A) Coca-cola
- B) Djathi

- C) Rrushi i thatë
 - D) Biskotat me sodë buke
- PS)B

Pyetja 1567 V)2

Cilat nga alternativat e mëposhtme është zgjedhja më e rëndësishme për reduktimin e kariesit dentar?

- A) Reduktimi i frekuencës së konsumimit të ushqimeve me sheqer dhe atyre të përpunuara, ngjitëse.
 - B) Shtimi i frutave dhe perimeve në dietën ditore
 - C) Reduktimi i sasisë së yndyrnave
 - D) Shtimi i bulmetit në dietë
- PS)A

Pyetja 1568 V)1

Cila nga alternativat e mëposhtme të suplementeve fluorike është më e mirë për foshnjat, në një zonë që nuk ka ujë të pijshëm të fluorizuar?

- A) Tabletat e tretshme të fluorit 5%
 - B) Aplikimet lokale të fluorit
 - C) Fluori me pika
 - D) Tableta e tretshme e fluorit 25%
- PS)C